# Menu du jour


#### Notions de base d'histologie

- Préparation de coupes d'histologie
- Epithélium, tissu conjonctif, tissu musculaire
- Muqueuses et séreuses
- Glandes exocrines et endocrines

#### Renouvellement tissulaire

- Organismes à fort potentiel de régénération
- Renouvellement tissulaire chez l'humain
- Quelques organes plus en détail: peau, intestin grêle, foie
- Perte d'homéostasie tissulaire psoriasis et cancer
- Mécanismes de contrôle de la taille des tissus

## Cellules, tissus, organes et systèmes



## Histologie


• Etude morphologique des tissus - « anatomie microscopique »

 Permet d'identifier différents types cellulaires et d'étudier la structure de différents tissus


- Histopathologie: diagnostic médical sur des biopsies
  - Maladie inflammatoires ou auto-immunes
  - Cancers
  - Post-mortem: maladies neurodégénératives

## Préparation d'échantillons (1)

1. Fixation du tissu (cross-linking) avec du formaldehyde



- Déshydratation et enrobage pour solidifier le tissu (paraffine, etc.)
- 3. Coupes de 5-15µm d'épaisseur avec un microtome




Leica.com

## Préparation d'échantillons (2)


4. Coloration la plus utilisée: hématoxyline/éosine

Hématoxyline: basique, marque les noyaux en violet Eosine: acide, marque le cytoplasme en rose


5. Montage sur une lame en verre



6. Observation au microscope



# Exemple: peau



http://bio-atlas.psu.edu


Hématoxyline: basique, marque les noyaux en violet Eosine: acide, marque le cytoplasme en rose

## Structures de base

- Epithélium (& mésothélium, endothélium)
- Tissu conjonctif
- Tissu musculaire

## Epithélium

- Une ou plusieurs couches de cellules qui adhérent entre elles par des protéines transmembranaires
- Polarisation (basal versus apical)
- Lame basale



- Pas de vaisseaux sanguins
- Principalement constitué de cellules épithéliales, mais peut aussi contenir d'autres types cellulaires (cellules dendritiques, lymphocytes, macrophages (poumon), mélanocytes)

## Fonctions de l'épithélium

• Barrières entre l'extérieur et l'intérieur du corps: peau, intestin

Absorption: intestin

Echanges gazeux air/sang: poumon

• Echanges de métabolites, sels et eau entre le sang et l'urine: rein

 Réception de messages venant de l'extérieur: cellules auditives, gustatives


## Types d'épithéliums

1. Simple

2. Stratifié

3. Pseudo-stratifié

## Epithélium simple







1. Pavimenteux (aplati)





2. Cuboïde





3. Prismatique

www.histology.leeds.ac.uk

## Epithélium stratifié


- 1. Non kératinisé
- → Exemple: épithelium de l'oesophage



## Epithélium stratifié

2. Kératinisé


→ Exemple: épiderme




## Epithélium pseudo-stratifié

→ Toutes les cellules touchent la lame basale, mais pas toutes les cellules sont en contact avec l'extérieur/cavité.

Exemple: trachée






## Mésothélium et Endothélium

#### Mésothélium: épithélium des organes internes

- → Cavité péritonéale, péricarde, plèvre
- → Epithélium simple pavimenteux

#### Endothélium: épithélium des vaisseaux


- → Vaisseaux sanguins, lymphatiques et du coeur
- → Epithélium simple pavimenteux




## Tissu conjonctif

- → Cellule type = fibroblaste
- → Peu dense en cellules, beaucoup de matrice extracellulaire, sécrétée par les fibroblastes
- → Contient des vaisseaux sanguins, nerfs, vaisseaux lymphatiques

#### Matrice extracellulaire




## Exemple de tissu conjonctif: derme (peau)




## Tissu musculaire

#### → 3 types principaux:



## Muscle lisse


#### Cellule musculaire lisse



Activated smooth muscle cell

https://www.sciencedirect.com/topics/medicineand-dentistry/airway-smooth-muscle-contraction


#### Organisation du muscle lisse




https://www.lifelinecelltech.com/vs mc-inflammatory-response-inatherosclerosis-research/

## Muscle lisse

Exemple: oesophage





## Muscle strié squelettique




Copyright © 2009 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Benjamin Cummings.

## Muscle strié squelettique











## Striations: arrangement actine/myosine



## Muscle strié cardiaque


- Cellules avec un seul noyau
- Reliées par des jonctions et des canaux entre les cellules



## Muqueuse

Epithélium non kératinisé + tissu conjonctif


Exemple: oesophage



## Séreuse

#### Mésothélium + tissu conjonctif


Exemple: plèvre (séreuse entourant les poumons)



## Glandes


Glandes exocrines: sécrétion vers l'extérieur

Exemple: partie exocrine du pancréas, formée d'acini. Sécrétion d'enzymes digestives vers l'intestin grêle.



## Glandes

<u>Glandes endocrines</u>: sécrétion vers la circulation sanguine ou lymphatique Exemple: ilots de Langerhans du pancréas. Sécrétion d'insuline et d'autres hormones.




# Fin de la 1ère partie

# Renouvellement des tissus

## Organismes à fort potentiel de renouvellement

Certains organismes peuvent se régénérer complètement. Exemple: l'hydre



## Organismes à fort potentiel de renouvellement



#### Renouvellement des tissus chez l'humain

 Beaucoup de tissus se renouvellent continuellement tout au long de la vie

- Le renouvellement implique:
  - Mort cellulaire (et leur élimination)
  - Division cellulaire
  - Différentiation cellulaire


Cellules souches → Progéniteurs engagés

- Pathologies humaines liées à une perturbation du renouvellement tissulaire:
  - Perte de renouvellement: ostéoporose, anémie
  - Renouvellement accéléré et incontrôlé: ostéopétrose, tumeurs bénignes, psoriasis, cancer


#### Perturbation de l'homéostasie de l'os

Ostéoblastes (OC): produisent la matrice extracellulaire dure de l'os


Ostéoclastes (OC): macrophages spécialisés qui remodèlent l'os















# Des rythmes très différents de renouvellement en fonction du tissu

#### Tissus à fort renouvellement

peau, épithélium de l'intestin, système hématopoïétique

Tissus à faible renouvellement mais fort potentiel de réparation foie, muscle, os, poumon

Tissus à renouvellement faible ou nul, peu ou pas de réparation cristallin, organe de Corti (oreille interne), système nerveux central (cerveau, moëlle épinière)

# Petite digression: rôle des macrophages tissulaires

- Les macrophages sont constamment présents dans la plupart des tissus
- Ils jouent un rôle clé de « nettoyage » de débris cellulaires et de matrice extracellulaire
- Servent de sentinelles du système immunitaire
- Se spécialisent en fonction du tissu
  - ❖ Intestin: rôle de sentinelle; le seuil d'activation pour alerter le système immunitaire est élevé, sinon ils seraient constamment activés
  - Os: macrophage spécialisé = ostéoclaste, responsable de la résorption osseuse, régulant par exemple la niche des cellules souches hématopoïétiques
  - Cerveau (cellule microgliale): rôle dans la maturation des synapses et la destruction de synapses dysfonctionnelles
  - Poumon: recyclage du surfactant (substance qui diminue la tension de surface des alvéoles)
  - ❖ Moëlle osseuse et rate: élimination des globules rouges trop vieux

## Organes choisis


Peau

Intestin


Foie

# Peau


## Structure de la peau




## Structure de la peau




# Vaisseaux sanguins




#### Glandes sébacées



## Glandes sudoripares




## Terminaisons nerveuses




## Types cellulaires présents dans l'épiderme

- → Cellules souches dans la couche basale, qui permettent un renouvellement constant de la peau (4 semaines)
- → Les cellules se différencient, perdent leur noyau, puis se détachent



#### FOLLICULE PILEUX (poil)



## Renouvellement de la peau


Epiderme: cellules souches de la peau

Derme: peu de renouvellement, pas de cellules souches, réparation imparfaite (fibrose = cicatrice)

Hypoderme: peu de renouvellement, pas de cellules souches


## Renouvellement homéostatique de l'épiderme

Cellules souches de la peau: couche basale de l'épiderme et autour du follicule pilleux



Deconinck et al., Nat Cell Biol 2019


## Renouvellement de l'épiderme blessé





#### Divisions des cellules souches de la peau

Divisions asymétriques

Divisions symétriques, asymétrie de population







#### Niche des cellules souches de la peau

HFSC: Cellule souche du follicule pileux


IFE: Cellule souche interfolliculaire (couche basale de l'épiderme)


Secondary hair germ: cellules souches au fond du follicule pilleux

Mesenchymal cell: fibroblaste

Papille du derme: cellules

mesenchymales






#### Wnt

**W**: wingless → mutation du gène chez la drosophile cause une absence d'aile

**nt**: int1 (integration of mouse mammary tumor virus 1) → cause la formation de tumeurs par surexpression de Wnt

## Signalisation de la voie Wnt/β-catenin




# Intestin grêle

## Intestin grêle




## Intestin grêle



## Microvillosités de l'intestin grêle

→ Augmente encore la surface d'absorption (32 m² en tout)




Microscopie éléctronique

# Fin de la 2<sup>ème</sup> partie

## Homéostasie de l'intestin grêle

- → Cellules souches au fond des cryptes, qui permettent un renouvellement continu (complet en 4-5 jours)
- → Les cellules migrent puis se détachent au somet des villosités




# Homéostasie de l'intestin grêle




#### Niche des cellules souches de l'intestin

EGF WNT3 DLL4 Lactate

ISC: Intestinal stem cell



# Traçage multicolore du destin des cellules souches: confetti mouse





Lgr5: gène exprimé spécifiquement dans les cellules souches

#### Rosa26 locus in Mouse, Chr6


# CAGG promoter pGK Neo' pA nGFP pA vd dJA RFP pA vd dJAW EcoRi Asci Nhei RFP pA vd dJAW Hindlii Paci

#### Cre recombination






# Contribution de différentes cellules souches à l'homéostasie de l'intestin




# Foie


#### Structure du foie




## Structure du foie: lobule hépatiques



## Histologie du foie




#### Zonation du foie



#### Homéostasie du foie

#### Pas de cellules souches!

→ Régénération à partir de cellules adultes (hépatocytes) ou de cellules épithéliales biliaires



BEC: Biliary epithelial cell LPC: Liver progenitor cell

# Renouvellement tissulaire pathologique: exemple dans la peau


### **Psoriasis**






http://www.pathologyoutlines.com/topic/skinnontumorpsoriasis.html






#### Physiopathologie du psoriasis




Gunter et al., Frontiers in Genetics 2019


# Carcinome squameux in situ



# Carcinome squameux invasif




## Carcinome squameux invasif




## Comment les organes contrôlent-ils leur taille ?

Peau: Coordination du timing de division cellulaire et différenciation avec une perte d'adhésion des squames superficielles -> 4 semaines



Intestin: Perte d'adhésion → apoptose des cellules qui sont prises en « sandwich » au sommet des villosités = anoikis



Autres tissus/organes: moins évident...

### Comment les organes contrôlent-ils leur taille ?


→ Découverte de la voie Hippo chez la drosophile




Type sauvage



Perte de fonction de Hippo




Type sauvage



Surexpression de Hippo


Voie de signalisation Hippo



Manmadhan et al., Frontiers in Cell and Developemental Biology 2019

#### Rôle de YAP/TAZ dans l'homéostasie de la peau


YAP/TAZ présent dans les zones prolifératives de la peau



YAP/TAZ KO dans l'épiderme: perte du renouvellement de la peau


Ctr Yap cKO

Surexpression de YAP/TAZ dans l'épiderme: hypertrophie puis cancer



Schlegelmilch et al., Cell 2011

#### Rôle de YAP/TAZ dans l'homéostasie de l'intestin




#### YAP/TAZ et la régénération de tissus: résumé

- → YAP/TAZ est souvent inactif dans les tissus adultes, mais peut s'activer lors de la régénération (en cas de perte importante de tissu)
- → Une suractivation « artificielle » de YAP/TAZ peut résulter en une régénération améliorée (par exemple le cœur chez la souris)
- → Une suractivation « artificielle » de YAP/TAZ peut aussi être dangereuse, résultant parfois en une croissance tissulaire excessive ou même des tumeurs

# YAP/TAZ et le cancer

#### Cellules souches cancéreuses

2 conceptions différentes du cancer: modèle « cellule souches cancéreuses (CSC) » et modèle stochastique



#### Role de YAP/TAZ dans le cancer

