



Ens. A. Lachowska - Analyse I - (n/a)

15 janvier 2018 - durée : 3 heures



n/a

n/a

SCIPER : 999999

Attendez le début de l'épreuve avant de tourner la page. Ce document est imprimé recto-verso, il contient 12 pages, les dernières pouvant être vides. Ne pas dégrafer.


- Posez votre carte d'étudiant sur la table.
- **Aucun** document n'est autorisé.
- L'utilisation d'une **calculatrice** et de tout outil électronique est interdite pendant l'épreuve.
- Pour les questions à **choix multiple**, on comptera :
 - +3 points si la réponse est correcte,
 - 0 point si la question n'est pas répondue ou s'il y a plusieurs croix,
 - 1 point si la réponse est incorrecte.
- Pour les questions de type **vrai-faux**, on comptera :
 - +1 point si la réponse est correcte,
 - 0 point si la question n'est pas répondue ou s'il y a plusieurs croix,
 - 1 point si la réponse est incorrecte.
- Utilisez un **stylo** à encre **noire** ou **bleu foncé** et effacez proprement avec du **correcteur blanc** si nécessaire.
- Si une question est erronée, l'enseignant se réserve le droit de l'annuler.
- Respectez les consignes suivantes pour **marquer vos réponses** :

 oui | ja | sì | yes



non | nein | non | no





Première partie, questions à choix multiple

Pour chaque question mettre une croix dans la case correspondante à la réponse correcte sans faire de ratures. Il n'y a qu'une seule réponse correcte par question.

Question 1 : Soit le nombre complexe $z = e^i + e^{i/3}$. Alors :

☐ $|z| = \sqrt{2}$

☐ $|z| = \sqrt{2 + 2(e^{i/3} + e^{-i/3})}$

☐ $|z| = \sqrt{2 + 2\cos(\frac{2}{3})}$

☐ $|z| = \sqrt{1 + (e^{2i/3} + e^{-2i/3})}$

Question 2 : Soit la fonction $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = \begin{cases} x^3 \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0, \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

Alors :

☐ f est une fois dérivable sur $\mathbb{R}$, mais pas deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$.

☐ f est trois fois dérivable sur $\mathbb{R}$.

☐ f n'est pas dérivable sur $\mathbb{R}$.

☐ f est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$, mais pas trois fois dérivable.

Question 3 : Soit l'intégrale

$$I = \int_0^1 e^{-x} x^2 dx .$$

Alors :

☐ $I = 2 - e^{-1}$

☐ $I = 2 - 5e^{-1}$

☐ $I = e^{-1} - 1$

☐ $I = 2 - 3e^{-1}$

Question 4 : Soit la fonction bijective $f:]0, \infty[\rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = 2 + \text{Log}\left(\frac{2e+x}{x^2}\right) ,$$

et soit f^{-1} la fonction réciproque de f et $y_0 := f(2e)$. Alors :

☐ $(f^{-1})'(y_0) = \frac{3}{4e}$

☐ $(f^{-1})'(y_0) = -\frac{4e}{3}$

☐ $(f^{-1})'(y_0) = -\frac{1}{2e+1}$

☐ $(f^{-1})'(y_0) = 2e+1$



Question 5 : Parmi les trois suites de nombres réels (a_n) définies pour $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$ par

$$a) \quad a_n = \frac{\text{Log}(n^5)}{\text{Log}(5^n)} \qquad b) \quad a_n = \frac{5^n}{n \text{Log}(n)} \qquad c) \quad a_n = \frac{n^5}{(5n)!}$$

déterminer celles qui convergent vers zéro :

- ☐ seulement a) et c)
☐ seulement b) et c)
☐ toutes les trois
☐ seulement a)

Question 6 : Soit $(a_k)_{k \in \mathbb{N}}$ une suite de nombres réels et $s_n = \sum_{k=0}^n a_k$, $n \in \mathbb{N}$, la suite des sommes partielles. Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} s_n = 1$, alors :

- ☐ $\lim_{n \rightarrow +\infty} (s_{2n} - 2s_n) = 0$
☐ $\lim_{n \rightarrow +\infty} (s_{2n} - s_n) = 0$
☐ $\lim_{n \rightarrow +\infty} s_{2n} < 1$
☐ $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 1$

Question 7 : Soit une fonction $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et la suite de nombre réels $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie récursivement par $a_0 = 1$ et $a_n = g(a_{n-1})$ pour $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$. Alors, la suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge pour g définie par :

- ☐ $g(x) = \frac{1}{4}x^2 + 1$
☐ $g(x) = -x^2 + 2x - 2$
☐ $g(x) = x + 1$
☐ $g(x) = 2x - 2$

Question 8 : Soit l'intégrale

$$I = \int_1^{e^3} \frac{\text{Log}(x)}{x \sqrt{(\text{Log}(x))^2 + 1}} dx .$$

Alors :

- ☐ $I = 2(\sqrt{10} - 1)$
☐ $I = \frac{1}{2}(\sqrt{10} - 1)$
☐ $I = \sqrt{10} - 1$
☐ $I = \sqrt{10} + 1$



Question 9 : Soit la fonction $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(e^{\frac{1}{x}})}{e^{\frac{1}{x}}} & \text{si } x \neq 0, \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

Alors :

- ☐ $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = 0$
- ☐ $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$
- ☐ $\lim_{x \rightarrow 0-} f(x) = -\infty$
- ☐ $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = +\infty$

Question 10 : Soit r le rayon de convergence de la série entière S , définie par

$$S = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(k+1)^2}{5^{k+3}} x^k.$$

Alors :

- ☐ $r = 5$
- ☐ $r = \frac{1}{5}$
- ☐ $r = 0$
- ☐ $r = 25$

Question 11 : Soit la fonction $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = \text{Log}(2 \text{Arctg}(3 + 5x^2)).$$

Alors :

- ☐ $f'(x) = \frac{2x}{(5x^4 + 6x^2 + 2) \text{Arctg}(3 + 5x^2)}$
- ☐ $f'(x) = \frac{2x}{(25x^4 + 30x^2 + 10) \text{Arctg}(3 + 5x^2)}$
- ☐ $f'(x) = \text{Log}(2) + \frac{x}{(5x^4 + 6x^2 + 2) \text{Arctg}(3 + 5x^2)}$
- ☐ $f'(x) = \frac{10x}{\text{Arctg}(3 + 5x^2)} (1 + (3 + 5x^2)^2)$



Question 12 : Soit l'intégrale généralisée

$$I = \int_1^{+\infty} \frac{e^x}{e^{2x} - 1} dx .$$

Alors :

- ☐ $I = -\text{Log}(e^2 - 1)$
- ☐ l'intégrale I diverge
- ☐ $I = \frac{1}{2} \text{Log}\left(\frac{e+1}{e-1}\right)$
- ☐ $I = 2 \text{Log}\left(\frac{e-1}{e+1}\right)$

Question 13 : Soit la suite de nombres réels $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par

$$a_n = \frac{\text{Log}(n + e^n)}{n + 1} .$$

Alors :

- ☐ a_n est une suite bornée et $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$
- ☐ a_n est une suite bornée et $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = e$
- ☐ a_n est une suite bornée et $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$
- ☐ a_n est une suite non bornée

Question 14 : Soit la fonction $f: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = \sin(x) e^{-x}$. Alors :


- ☐ f atteint son minimum en $x = \frac{5\pi}{4}$ et son maximum en $x = \frac{\pi}{4}$.
- ☐ f atteint son minimum en $x = 0$ et son maximum en $x = \frac{\pi}{4}$.
- ☐ f atteint son minimum en $x = 0$ en $x = \pi$ et en $x = 2\pi$.
- ☐ f atteint son minimum en $x = \frac{3\pi}{2}$ et son maximum en $x = \frac{\pi}{2}$.

Question 15 : Soit la série numérique S avec paramètre $c \in \mathbb{R}$ définie par

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^{cn}} .$$

Alors :

- ☐ S converge si et seulement si $2 > c > 0$
- ☐ S converge si et seulement si $c \geq 0$
- ☐ S converge si et seulement si $c > 3$
- ☐ S converge si et seulement si $c \geq 1$



Question 16 : Soit la fonction $f:]-\pi, \pi[\setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = \frac{e^{\cos(x)-1} - 1 - x^2}{(\sin(x))^2}.$$

Alors :

☐ $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -\frac{1}{2}$

☐ $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -\frac{3}{2}$

☐ $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -1$

☐ $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$

Question 17 : Soit le sous-ensemble $E \subset \mathbb{R}$,

$$E = \left\{ \sin\left(\frac{\pi n}{4}\right) - \sin\left(\frac{\pi}{4n}\right) : n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \right\}.$$

Alors :

☐ $\inf E = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

☐ $\inf E = -1$

☐ $\inf E = -1 - \sin\left(\frac{\pi}{24}\right)$

☐ $\inf E = 0$

Question 18 : Soit $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + x^3 \varepsilon(x)$ avec $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$ le développement limité d'ordre trois de la fonction $f:]-1, 1[\rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = \sin\left(\frac{x}{1-x}\right)$$

autour de $x = 0$. Alors :

☐ $a_3 = -\frac{1}{6}$

☐ $a_3 = 5$

☐ $a_3 = 1$

☐ $a_3 = \frac{5}{6}$

Question 19 : Soit l'intégrale

$$I = \int_{-2}^0 \frac{1}{\sqrt{1-4x+4x^2}} dx.$$

Alors :

☐ $I = -\frac{1}{2} \operatorname{Arcsin}\left(\frac{2}{\sqrt{5}}\right)$

☐ $I = \frac{1}{2} \operatorname{Log}(5)$

☐ $I = \frac{1}{2} \operatorname{Log}(6 - \sqrt{33})$

☐ $I = -\frac{1}{2} \operatorname{Log}(5)$



Question 20 : Soient $\alpha \in \mathbb{R}$ et $\beta \in \mathbb{R}$ tels que la fonction $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = \begin{cases} (x+1)(x+2) & \text{si } x < 0, \\ \alpha x + \beta & \text{si } x \geq 0, \end{cases}$$

est dérivable sur $\mathbb{R}$. Alors :

☐ $f(-3) + f(1) = 7$

☐ $f(2) = 12$

☐ $f'(2) = 2$

☐ $f(3) = 9$

Question 21 : Soit la fonction $f: [-1, 3] \rightarrow [-1, 3]$ définie par

$$f(x) = \sqrt{|x-1|} + 2x .$$

Alors :

☐ f est injective

☐ f est discontinue en $x = 1$

☐ f est surjective

☐ f est dérivable sur $] -1, 3 [$

Question 22 : Soit la série numérique S définie par

$$S = \sum_{k=1}^{\infty} \left(-\frac{2}{3} \right)^k .$$

Alors :

☐ $S = \frac{2}{5}$

☐ $S = -\frac{2}{5}$

☐ $S = -\frac{3}{5}$

☐ $S = -1$



Deuxième partie, questions du type Vrai ou Faux

Pour chaque question, mettre une croix (sans faire de ratures) dans la case VRAI si l'affirmation est **toujours vraie** ou dans la case FAUX si elle **n'est pas toujours vraie** (c'est-à-dire, si elle est parfois fausse).

Question 23 : L'intégrale $\int_{-\pi}^{\pi} \sin(x^{13}) dx$ vaut zéro.

☐ VRAI ☐ FAUX

Question 24 : Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de nombres réels telle que la suite $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $b_n = \cos(a_n)$ converge. Alors la suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge.

☐ VRAI ☐ FAUX

Question 25 : La fonction $f: \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = \sin\left(\frac{e^x - 1}{x}\right)$ est prolongeable par continuité en $x = 0$.

☐ VRAI ☐ FAUX

Question 26 : Soit $A \subset \mathbb{R}$ un ensemble borné de $\mathbb{R}$ et $c = \sup A$. Alors pour tout $\epsilon > 0$ il existe $x \in A$ tel que $x + \epsilon \geq c$.

☐ VRAI ☐ FAUX

Question 27 : Soit $f: [1, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction telle que $f([1, 2]) =]1, 2[$. Alors f n'est pas continue sur $[1, 2]$.

☐ VRAI ☐ FAUX

Question 28 : Soit $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ une série numérique divergente et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de nombres réels

telle que $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$. Alors la série numérique $\sum_{n=0}^{\infty} a_n b_n$ converge.

☐ VRAI ☐ FAUX

Question 29 : Soient $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$ et $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions continues sur $[a, b]$ et dérivables sur $]a, b[$ telles que $f'(x) \leq g'(x)$ pour tout $x \in]a, b[$. Alors $f(x) \leq g(x)$ pour tout $x \in]a, b[$.

☐ VRAI ☐ FAUX



Question 30 : Soit $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable en $x_0 \in \mathbb{R}$. Alors

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0) - f(x_0 - 2h)}{h} = 2f'(x_0).$$

☐

VRAI

☐

FAUX

Question 31 : Soit $A \subset \mathbb{R}$ et $B \subset \mathbb{R}$ deux sous-ensembles bornés de $\mathbb{R}$ tels que $A \cap B \neq \emptyset$ (ensemble vide). Alors $\inf A \leq \inf A \cap B$.

☐

VRAI

☐

FAUX

Question 32 : Soit $f:]-1, 1[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction qui admet autour de $x = 0$ le développement limité $f(x) = x - 2x^3 + x^3\varepsilon(x)$, où $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$. Alors

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - x}{x^2} = 0.$$

☐

VRAI

☐

FAUX