# Exercices — Série 11

Mots-clés: produit scalaire, norme, orthogonalité, orthogonal d'un sous-espace vectoriel, bases orthogonales/orthonormées, projections/matrices orthogonales.

### Question 1

a) Soient 
$$u = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}$$
,  $v = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $w = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix}$ . Calculer 
$$u \cdot v, \quad v \cdot w, \quad \frac{u \cdot w}{\|v\|}, \quad \frac{1}{w \cdot w}w, \quad \frac{u \cdot w}{\|v\|}v.$$

- b) Calculer la distance entre u et v et la distance entre u et w.
- c) Calculer les vecteurs unitaires correspondant à u, v, w (pointant dans la même direction que le vecteur original).

Question 2 Soit  $v = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$  et  $W = \text{Vect}\{v\}$ . Donner l'ensemble  $W^{\perp}$  des

vecteurs orthogonaux à v. Est-ce que  $W^{\perp}$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^3$ ? Si oui, de quelle dimension?

### Question 3

- a) Décrire l'ensemble des vecteurs de  $\mathbb{R}^3$  qui sont orthogonaux à  $e_1 = (1,0,0)$ , puis à  $e_2 = (0,1,0)$ , et enfin simultanément à  $e_1$  et  $e_2$ . Idem avec  $e_1$  et  $e_3 = (0,0,1)$ , puis  $e_2$  et  $e_3$ . Combien il y a-t-il de vecteurs orthogonaux à  $e_1$ ,  $e_2$  et  $e_3$  simultanément?
- b) Trouver la projection orthogonale p du vecteur a=(2,2,2) sur la droite engendrée par le vecteur b=(-1,-2,-3).
- c) Trouver la distance du vecteur a à la droite engendrée par b.
- d) Montrer que  $||p|| = ||a|| |\cos \theta|$ , où  $\theta$  est l'angle formé par a et b.

Question 4 Soit  $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -2 & 2 & 3 \\ -1 & 1 & 4 \end{pmatrix}$  et U = Ker(A). Alors  $U^{\perp}$  est égal à

 $\square$  Lgn(A)  $\square$  Ker(A)  $\square$  Im(A)  $\square$   $\mathbb{R}^3$ 

Question 5 Soient  $u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $u_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $v = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$ .

a) Les vecteurs  $u_1$  et  $u_2$  sont orthogonaux.

VRAI FAUX

b) La projection orthogonale  $\operatorname{proj}_W(v)$  de v sur  $W = \operatorname{Vect}\{u_1, u_2\}$  est égale à

 $\square \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \qquad \square \begin{pmatrix} 7/4 \\ 1/4 \\ 1 \end{pmatrix} \qquad \square \begin{pmatrix} 7/2 \\ 1/2 \\ 2 \end{pmatrix} \qquad \square \begin{pmatrix} 7 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$ 

c) Dans la décomposition  $v=z+\operatorname{proj}_W(v),$  où  $z\in W^\perp,\,z=$ 

 $\square \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1/2 \\ -1 \end{pmatrix} \qquad \square \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \qquad \square \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \qquad \square \begin{pmatrix} -1/2 \\ -1/2 \\ 1 \end{pmatrix}$ 

Question 6

Soient les vecteurs  $v = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $w_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ ,  $w_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ . Soit w la meilleure approximation de v par un vecteur de la forme  $\alpha w_1 + \beta w_2$ . Alors  $w = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac$ 

 $\square \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix} \qquad \square \begin{pmatrix} -4/3 \\ -1/3 \\ -5/3 \end{pmatrix} \qquad \square \begin{pmatrix} 2/3 \\ 1/3 \\ 5/3 \end{pmatrix} \qquad \square \begin{pmatrix} 4/3 \\ 1/3 \\ 5/3 \end{pmatrix}$ 

## Question 7

- a) Soit x un vecteur de  $\mathbb{R}^3$ . Déterminer le cosinus des angles formés par x avec les axes de coordonnées.
- b) En déduire l'ensemble de tous les vecteurs de  $\mathbb{R}^3$  qui forment le même angle avec les trois axes de coordonnées.
- c) Écrire l'inégalité de Cauchy-Schwarz pour les vecteurs (a, b, c) et (1, 1, 1) de  $\mathbb{R}^3$  et en déduire que pour tous nombres réels a, b et c on a

$$(a+b+c)^2 \le 3(a^2+b^2+c^2).$$

d) Soit x un vecteur de  $\mathbb{R}^3$ . Notons par  $\alpha$ ,  $\beta$  et  $\gamma$  les angles formés par x avec les axes de coordonnées. En utilisant les points antérieurs, démontrer qu'on a les inégalités

$$-\sqrt{6} \le \sin(\alpha) + \sin(\beta) + \sin(\gamma) \le \sqrt{6}.$$

Soient  $(u_1, \ldots, u_n)$  et  $(v_1, \ldots, v_n)$  deux bases orthonormales de  $\mathbb{R}^n$ . On définit les matrices de taille  $n \times n$ ,  $U = (u_1 | \dots | u_n)$  et  $V = (v_1 | \dots | v_n)$ . Montrer que  $U^TU = I_n$ ,  $V^TV = I_n$  et que UVest inversible.

Soit  $A = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & -\sqrt{3} & 1\\ \sqrt{2} & \sqrt{3} & 1\\ \sqrt{2} & 0 & -2 \end{pmatrix}$ . Alors Question 9

- A n'est pas inversible  $\frac{A}{\sqrt{a}}$  est orthogonale
- $\bigcap$  A est orthogonale  $\frac{A}{\sqrt{6}}$  est orthogonale

-	Question 10 Indiquer pour chaquerièvement votre réponse.	ue énoncé s	s'il est vrai ou faux et justifier
a)	Une base d'un sous-espace vectoriel $W$ de $\mathbb{R}^n$ qui est un ensemble de vecteurs orthogonaux est une base orthonormale.		
	☐ VRAI		FAUX
b)	Un ensemble $S=\{v_1,v_2,\ldots,v_p\}$ orthogonal de vecteurs non nuls de $\mathbb{R}^n$ est linéairement indépendant et de ce fait est une base du sous-espace qu'il engendre.		
	☐ VRAI		FAUX
c)	Une base orthonormale est une base orthogonale mais la réciproque est fausse en général.		
	☐ VRAI		FAUX
d)	l) Si $x$ n'appartient pas au sous-espac nul.	e vectoriel	$W$ , alors $x - \operatorname{proj}_W(x)$ n'est pas
	☐ VRAI		FAUX
e)	Tout ensemble orthonormal de $\mathbb{R}^n$ est linéairement dépendant.		
	☐ VRAI		FAUX
f)	f) Soit $W$ un sous-espace vectoriel de $v = 0$ .	$ \in \mathbb{R}^n $ . Si $v$	est dans $W$ et dans $W^{\perp}$ , alors
	☐ VRAI		FAUX
g)	Si $U$ est une matrice de taille $m \times n$ avec des colonnes orthonormales, alors $U^TUx = x \ \forall x \in \mathbb{R}^n$ .		
	☐ VRAI		FAUX

### Question 11

a) Montrer que la matrice de rotation

$$R = \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha & 0 \\ -\sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

où  $\alpha$  est un réel quelconque, est orthogonale. Calculer  $\det R$ , les valeurs propres et des vecteurs propres correspondants.

b) Montrer que la matrice de réflexion

$$U = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

est orthogonale. Calculer  $\det U,$  les valeurs propres et des vecteurs propres correspondants.

c) Montrer que toute matrice  $n \times n$  de la forme  $Q = I_n - 2uu^T$ , où  $u \in \mathbb{R}^n$  est un vecteur unitaire (de norme 1), est orthogonale. Ces matrices sont appelées matrices de réflexion élémentaires. A l'aide d'un raisonnement géométrique, déterminer les valeurs propres et les espaces propres correspondants.