

Algèbre linéaire

Test intermédiaire

Classe inversée

Automne 2024

Réponses

Pour les questions à **choix multiple**, on comptera :

- +3 points si la réponse est correcte,
- 0 point si la question n'est pas répondue ou s'il y a plusieurs réponses,
- −1 point si la réponse est incorrecte.

Pour les questions de type **vrai-faux**, on comptera :

- +1 point si la réponse est correcte,
- 0 point si la question n'est pas répondue ou s'il y a plusieurs réponses,
- −1 point si la réponse est incorrecte.

Notation

- Pour une matrice A , a_{ij} désigne l'élément situé sur la ligne i et la colonne j de la matrice.
- Pour un vecteur $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$, x_i désigne la i -ème composante de $\vec{x}$.
- I_m désigne la matrice identité de taille $m \times m$.
- $\mathbb{P}_n(\mathbb{R})$ désigne l'espace vectoriel des polynômes réels de degré inférieur ou égal à n .
- $\mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ désigne l'espace vectoriel des matrices de taille $m \times n$ à coefficients réels.

Première partie, questions à choix multiple

Pour chaque question marquer la case correspondante à la réponse correcte sans faire de ratures. Il n'y a qu'une seule réponse correcte par question.

Question 1 : Soient

$$\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \quad \text{et} \quad \mathcal{C} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} \right\}$$

deux bases ordonnées de $\mathbb{R}^3$. Soit P la matrice de changement de base de la base $\mathcal{B}$ vers la base $\mathcal{C}$, telle que $[\vec{x}]_{\mathcal{C}} = P[\vec{x}]_{\mathcal{B}}$ pour tout $\vec{x} \in \mathbb{R}^3$. Alors la deuxième ligne de P est

☐ $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$

☐ $\begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$

☐ $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$

☒ $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$

Question 2 : Soit $\mathcal{B} = \{2 - t, t + t^2, -1 + t^3, -1 - t + 2t^2\}$ une base ordonnée de $\mathbb{P}_3(\mathbb{R})$. La quatrième coordonnée du polynôme $p(t) = t + 2t^2 + 3t^3$ par rapport à la base $\mathcal{B}$ est égale à

☐ $-7.$

☐ $\frac{1}{7}.$

☒ $-\frac{1}{7}.$

☐ $3.$

Question 3 : Soit $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^4$ l'application linéaire définie par

$$T\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} x - y \\ x - y \\ -5x + 6y \\ x + y \end{pmatrix}.$$

Alors

☒ T est injective mais pas surjective.

☐ T est surjective mais pas injective.

☐ T est injective et surjective.

☐ T n'est ni injective ni surjective.

Question 4 : Soit

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 3 & 0 \\ 2 & \sqrt{3} & \pi & 3 & \sqrt{2} \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & \pi & 3 & \sqrt{2} \\ \sqrt{3} & 1 & \pi & 3 & \sqrt{2} \end{pmatrix}.$$

Alors

☐ $\det(A) = 0.$

☐ $\det(A) = 12\pi.$

☒ $\det(A) = -6\pi.$

☐ $\det(A) = \sqrt{6}\pi.$

Question 5 : Soit

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 5 & -1 \\ 1 & -1 & 2 & 2 \\ 3 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Alors l'inverse $B = A^{-1}$ de la matrice A est tel que

$$\blacksquare b_{33} = \frac{4}{39}. \quad \square b_{41} = \frac{1}{3}. \quad \square b_{33} = -\frac{1}{13}. \quad \square b_{43} = \frac{2}{3}.$$

Question 6 : Soit W l'espace vectoriel des matrices symétriques de taille 2×2 et soit $T: \mathbb{P}_2(\mathbb{R}) \rightarrow W$ l'application linéaire définie par

$$T(a + bt + ct^2) = \begin{pmatrix} a & b - c \\ b - c & a + b + c \end{pmatrix} \quad \text{pour tout } a, b, c \in \mathbb{R}.$$

Soient

$$\mathcal{B} = \{1, 1 - t, t + t^2\} \quad \text{et} \quad \mathcal{C} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

des bases ordonnées de $\mathbb{P}_2(\mathbb{R})$ et W respectivement. La matrice A associée à T par rapport à la base $\mathcal{B}$ de $\mathbb{P}_2(\mathbb{R})$ et la base $\mathcal{C}$ de W , telle que $[T(p)]_{\mathcal{C}} = A[p]_{\mathcal{B}}$ pour tout $p \in \mathbb{P}_2(\mathbb{R})$, est

$$\square \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}. \quad \square \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad \blacksquare \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}. \quad \square \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Question 7 : Le système d'équations linéaires

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 5x_3 - 4x_4 = 0 \\ x_2 + 2x_3 + x_4 = 7 \\ x_2 + 3x_3 - 5x_4 = -4 \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 - 3x_4 = 1 \end{cases}$$

possède une solution unique telle que

$$\square x_1 = 2. \quad \blacksquare x_1 = -3. \quad \square x_1 = -2. \quad \square x_1 = 3.$$

Question 8 : Soit t un paramètre réel. Les vecteurs

$$\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} -3 \\ 5 \\ -2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \vec{v}_3 = \begin{pmatrix} t \\ -9 \\ 8 \end{pmatrix}$$

sont linéairement dépendants si et seulement si

$$\blacksquare t = 5. \quad \square t = -5. \quad \square t \neq 5. \quad \square t \neq -5.$$

Deuxième partie, questions de type Vrai ou Faux

Pour chaque question, marquer (sans faire de ratures) la case VRAI si l'affirmation est **toujours vraie** ou la case FAUX si elle **n'est pas toujours vraie** (c'est-à-dire si elle est parfois fausse).

Question 9 : Soit $T: \mathbb{P}_6(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{M}_{3 \times 2}(\mathbb{R})$ une application linéaire. Alors il existe $p, q \in \mathbb{P}_6(\mathbb{R})$ tels que $p \neq q$ et $T(p) = T(q)$.

☒ VRAI ☐ FAUX

Question 10 : Soit $\{\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_m\}$ une base de $\mathbb{R}^m$. Si A est une matrice de taille $m \times n$ telle que l'équation $A\vec{x} = \vec{b}_k$ possède au moins une solution pour tout $k = 1, \dots, m$, alors $\text{Im}(A) = \mathbb{R}^m$.

☒ VRAI ☐ FAUX

Question 11 : Soit A une matrice de taille $m \times n$ avec $m < n$. Si la forme échelonnée réduite de A possède exactement k lignes nulles, alors l'ensemble des solutions du système homogène $A\vec{x} = \vec{0}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$ de dimension $n - k$.

☐ VRAI ☒ FAUX

Question 12 : Soit A une matrice de taille $n \times n$ et soit $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ l'application linéaire définie par $T(\vec{x}) = A\vec{x}$, pour tout $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$. Si A est telle que $A^5 = 0$, alors T est surjective.

☐ VRAI ☒ FAUX

Question 13 : Soient V et W deux espaces vectoriels et soit $T: V \rightarrow W$ une application linéaire. Si $\dim(\text{Ker } T) = \dim V$, alors $\text{Im } T = \{\vec{0}_W\}$.

☒ VRAI ☐ FAUX

Question 14 : Soit q un polynôme de degré 3 quelconque. Alors l'ensemble

$$\{p \in \mathbb{P}_3(\mathbb{R}) \mid q(0) - p(0) = 0\}$$

est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{P}_3(\mathbb{R})$.

☐ VRAI ☒ FAUX

Question 15 : Soit $A \in \mathcal{M}_{4 \times 4}(\mathbb{R})$ une matrice de rang 3. Si $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ sont des vecteurs linéairement indépendants dans $\mathbb{R}^4$, alors $A\vec{u}, A\vec{v}, A\vec{w}$ sont linéairement indépendants dans $\mathbb{R}^4$.

☐ VRAI ☒ FAUX

Question 16 : Soit W le sous-espace vectoriel de $\mathbb{P}_5(\mathbb{R})$ engendré par $p_1, p_2, p_3, p_4 \in \mathbb{P}_5(\mathbb{R})$. Si $\dim(W) = 4$, alors il existe deux polynômes $p_5, p_6 \in \mathbb{P}_5(\mathbb{R})$ tels que l'ensemble $\mathcal{B} = \{p_1, p_2, p_3, p_4, p_5, p_6\}$ est une base de $\mathbb{P}_5(\mathbb{R})$.

☒ VRAI ☐ FAUX