

Exercices — Série 8

Exercice 1. [Dérivations implicites]

Pour les courbes suivantes données sous forme cartésienne implicite, calculer la pente de la tangente à la courbe sous la forme $y' = y'(x, y)$.

Vérifier que le point P donné appartient à la courbe puis déterminer l'équation de la tangente à la courbe au point P .

(i) $e^{xy} + y^2 - x - 2 = 0$ $P(0, 1)$

Déterminer en dérivant une seconde fois de manière implicite la valeur de y'' au point P .
En déduire la nature du point P .

(ii) $e^{x-1} + 2y^2 + y^3 - 4x^2 = 0$ $P(1, 1)$

(iii) $xy^3 + x^2y^2 + 3x + 4y - 4 = 0$ $P(2, -1)$

(iv) $y \ln(x) = \ln(y)$ $P(1, 1)$


(v) $y^3 + \ln\left(\frac{x}{y} + 1\right) - 5x = 8$. $P(0, 2)$

Exercice 2. [Courbe paramétrique]

Pour la courbe paramétrique suivante, calculer la pente de la tangente à la courbe $\frac{dy}{dx}$ comme fonction du paramètre t .

$$\begin{cases} x(t) = t \sin(t) \\ y(t) = t \cos(t) \end{cases}$$


puis donner l'équation de la tangente à cette courbe au point $P(0, -\pi)$.



Exercice 3. [La cardioïde]

La cardioïde est donnée sous forme paramétrique par les équations

$$\begin{cases} x(\theta) = (1 + \cos \theta) \cos \theta \\ y(\theta) = (1 + \cos \theta) \sin \theta \end{cases} \quad \theta \in [0, 2\pi].$$



- Calculer l'expression de la pente de la tangente à la courbe en fonction de θ : $\frac{dy}{dx} = \frac{y'(\theta)}{x'(\theta)}$
- Pour $\theta = \frac{\pi}{2}$ déterminer le point P de la courbe et trouver la pente de la tangente à la courbe en ce point.
- Trouver tous les points de la courbe où la tangente est horizontale c'est-à-dire les points où $y'(\theta) = 0$ et $x'(\theta) \neq 0$
- Trouver tous les points de la courbe où la tangente est verticale c'est-à-dire les points où $y'(\theta) \neq 0$ et $x'(\theta) = 0$
- Lorsque $\theta = \pi$ que se passe-t-il pour l'expression calculée sous (a) ? Lever l'indétermination avec la règle de L'Hôpital. Y a-t-il une tangente en ce point ? Si oui comment est-elle ?

Exercice 4.

Considérons la courbe définie par l'équation implicite $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$. C'est une ellipse centrée à l'origine et de demi-axes égaux à a et b).

- La pente de la tangente en un point (x, y) par différentiation implicite de son équation vaut:

☐ $-\frac{a^2}{b^2} \frac{y}{x}$

☐ $-\frac{b^2}{a^2} \frac{x}{y}$

☐ $\frac{b^2}{a^2} \frac{x}{y}$

☐ $\frac{b^2}{a^2} \frac{y}{x}$

- La pente de la tangente qui passe par $(-\sqrt{3}, -\frac{1}{2})$ à l'ellipse centrée en l'origine d'axes de longueurs $a = 2$ et $b = 1$ vaut:

☐ $\frac{\sqrt{3}}{2}$

☐ $-\frac{2}{\sqrt{3}}$

☐ $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

☐ $\frac{\sqrt{3}}{4}$

- (c) Une équation paramétrique de l'ellipse centrée en l'origine d'axes de longueurs a et b est donnée par

$$x = a \cos(t) = x(t), \quad y = b \sin(t) = y(t).$$

La pente de la tangente en un point $(x(t), y(t))$ vaut:

☐ $\frac{a \cos(t)}{b \sin(t)}$

☐ $\frac{b}{a} \cos(t) \sin(t)$

☐ $-\frac{b \sin(t)}{a \cos(t)}$

☐ $-\frac{b \cos(t)}{a \sin(t)}$


- (d) Est-ce que l'expression obtenue en (c) est la même qu'en (a)?

☐ oui

☐ non

Exercice 5.

Étant donné un cercle de diamètre OA et de centre B , ainsi qu'un point C du cercle sur la médiatrice de OA , la *Cissoïde de Dioclès* (environ 180 av. J.-C.) est la courbe dessinée par les points P définis comme suit: pour un point Q du cercle, on note Q' son symétrique par rapport à BC ; le point P se situe à l'intersection de la droite QO et de la perpendiculaire à OA par Q' :



Dans ce qui suit, on supposera que $O = (0, 0)$ et $A = (1, 0)$.

(a) La distance $\overline{OQ}$ en fonction du paramètre t mesurant l'angle QOA vaut:

- ☐ $\cos(t)$
☐ $\tan(t)$
☐ $\sin(t)$
☐ $\frac{1}{\tan(t)}$

[*Suggestion*: considérer le triangle rectangle QOA .]

(b) Les coordonnées de Q en fonction de t valent:

- ☐ $(\tan(t) \cos(t), \cos(t) \tan(t))$
☐ $\left(\frac{\cos(t)}{\tan(t)}, \frac{\cos(t)}{\tan(t)}\right)$
☐ $(\cos^2(t), \cos(t) \sin(t))$
☐ $(\sin(t) \cos(t), \sin^2(t))$

(c) En utilisant que P et Q sont à la même distance de BC , calculer la première coordonnée de P , puis en utilisant que les triangles POR' et QOR sont semblables, calculer la seconde. Nous pouvons déduire qu'une paramétrisation de la Cissoïde est:

- ☐ $x = f(t) = \sin^2(t)$ $y = g(t) = \frac{\cos^3(t)}{\sin(t)}$
☐ $x = f(t) = \cos(t) \sin(t)$ $y = g(t) = \sin^4(t)$
☐ $x = f(t) = \cos^2(t)$ $y = g(t) = \sin^2(t)$
☐ $x = f(t) = \sin^2(t)$ $y = g(t) = \frac{\sin^3(t)}{\cos(t)}$

(d) La pente de la tangente à la Cissoïde en un point $(x(t), y(t))$ par différentiation de son équation paramétrique vaut:

- ☐ $p(t) = \frac{3 \sin(t)}{2 \cos^3(t)}$
☐ $p(t) = -\frac{2 \sin^3(t)}{\cos(t)} (3 \cos^2(t) + \sin^2(t))$
☐ $p(t) = \frac{\sin(t)(3 \cos^2(t) + \sin^2(t))}{2 \cos^3(t)}$
☐ $p(t) = \frac{2 \cos^3(t)}{\sin(t)(3 \cos^2(t) + \sin^2(t))}$

(e) Pour trouver la pente de la tangente à la Cissoïde au point $C = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ avec l'expression paramétrique, nous utilisons t égal à:

- ☐ $\frac{\pi}{4}$
☐ $\frac{\pi}{3}$
☐ $-\frac{\pi}{4}$
☐ $-\frac{\pi}{3}$

(f) La pente de la tangente à la Cissoïde au point $C = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ vaut:

- ☐ $\frac{1}{2}$
☐ $3\sqrt{3}$
☐ 3
☐ 2

(g) Les points (x, y) sur la Cissoïde vérifient:

- ☐ $x^3 = y^2(x - 1)$
☐ $x(x^2 + y^2) = y^2$

(cette équation est en fait une équation implicite de la courbe).

(h) La pente de la tangente à la Cissoïde en utilisant l'équation implicite ci-dessus vaut:

$$\square y'(x) = \frac{3x^2 + y(x)(2x + y(x))}{2y(x)}$$

$$\square y'(x) = \frac{3x^2}{2y(x)(x-1)}$$

$$\square y'(x) = \frac{3x^2 - y^2(x)}{2y(x)(x-1)}$$

$$\square y'(x) = \frac{3x^2 + y^2(x)}{2y(x) - 2xy(x)}$$

(i) la pente de la tangente à la Cissoïde au point $C = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ en utilisant l'équation implicite ci-dessus vaut:

$$\square -1$$

$$\square \frac{1}{2}$$

$$\square 2$$

$$\square -\frac{3}{2}$$

Ces trois derniers exercices seront repris avec un supplément dans la série 9.

Exercice 6. [Vecteur tangent et courbure]

On considère la cycloïde $c(t) = (x(t), y(t))$ avec

$$\begin{cases} x(t) = t - \sin t \\ y(t) = 1 - \cos t \end{cases}$$

- (a) Calculer le vecteur tangent $c'(t)$ en tout point de la cycloïde. Que vaut-il pour $t = 2n\pi$ avec n entier ?
- (b) Calculer la courbure $\kappa(t)$. Que vaut la courbure en $t = 0$?
- (c) Pour $t = \pi$ calculer le point P de la courbe correspondant, le vecteur tangent et la courbure en P .

Exercice 7. [Vecteur tangent et courbure]

On considère la courbe γ donnée par son équation cartésienne explicite

$$y = \frac{1}{3}x^3$$

- (a) Calculer le vecteur tangent $c'(x)$ en tout point de cette courbe (en prenant x comme paramètre).
- (b) Calculer la courbure $\kappa(x)$. Que vaut-elle en $x = 0$?
- (c) Quand est-ce que $\kappa(x)$ est minimale ? maximale ?
- (d) Que fait la courbure lorsque x tend vers $\pm\infty$? Est-ce raisonnable ?
- (e) Pour le point $P(1, \frac{1}{3})$ calculer le vecteur tangent en P et la courbure en P .

Exercice 8. [Courbure d'une forme cartésienne implicite]

On considère la courbe γ donnée sous forme cartésienne implicite:

$$(\gamma) : xy^3 + \frac{1}{2}x^2y^2 + \frac{1}{3}x^3 - 3y = \frac{11}{3}$$

et le point $P(2, 1)$ sur la courbe.

- (a) En dérivant implicitement par rapport à x déterminer la pente y' de la tangente à γ au point P . En déduire un vecteur tangent en ce point.
- (b) En dérivant une seconde fois l'équation obtenue sous (a), trouver y'' au point P . En déduire la courbure de γ en ce point.