

Exercice 1. (i) Soient $w, \xi > 0$, $f, \varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ les fonctions définies par

$$f(x) = x^2 e^{-w^2 x^2}$$

$$\varphi(x) = \frac{2w^2 + \xi^2 - 4w^4 x^2}{4w^4} e^{-w^2 x^2}.$$

Montrer (en utilisant les tables et les propriétés des transformées de Fourier) que

$$\hat{f}(\alpha) = \frac{2w^2 - \alpha^2}{4\sqrt{2}w^5} e^{-\frac{\alpha^2}{4w^2}}$$

$$\hat{\varphi}(\alpha) = \frac{\xi^2 + \alpha^2}{4\sqrt{2}w^5} e^{-\frac{\alpha^2}{4w^2}}$$

(ii) Trouver $u: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ solution de

$$u(x) + \frac{1}{\sqrt{2}} \int_{-\infty}^{+\infty} u''(t) e^{-\sqrt{2}|x-t|} dt = x^2 e^{-x^2}$$

Exercice 2.

Trouver $u: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 2π -périodique solution de

$$u''(x) - 2u(x + \pi) = 3 + \sin\left(\frac{3}{2}x\right) \sin\left(\frac{x}{2}\right)$$

Indication : On pourra utiliser :

$$2 \sin(a) \sin(b) = \cos(a - b) - \cos(a + b)$$

$$\sin(n(x \pm \pi)) = (-1)^n \sin(nx)$$

$$\cos(n(x \pm \pi)) = (-1)^n \cos(nx)$$

Exercice 3 (*Facultatif* : Valeurs propres et vecteurs propres de la dérivée seconde).

Déterminer les paramètres $\lambda \in \mathbb{R}$ pour lesquels il existe $u_\lambda \in C^2(\mathbb{R})$, 2π -périodique, non nulle telle que

$$u''(x) = \lambda u(x).$$

Un échantillon d'exercices QCM

Exercice 4.

Soit

$$\Omega = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 < \frac{\pi^2}{4}, |z| < \cos\left(\sqrt{x^2 + y^2}\right) \right\}.$$

Alors, le bord de Ω , $\partial\Omega$ a deux parties :

$$\Sigma_1 = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 < \frac{\pi^2}{4}, z = \cos\left(\sqrt{x^2 + y^2}\right) \right\},$$

paramétrisée par

$$\alpha(r, \theta) = (r \cos(\theta), r \sin(\theta), \cos(r)), \quad r \in [0, \pi/2], \theta \in [0, 2\pi],$$

et

$$\Sigma_2 = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 < \frac{\pi^2}{4}, z = -\cos\left(\sqrt{x^2 + y^2}\right) \right\},$$

paramétrisée par

$$\beta(r, \theta) = (r \cos(\theta), r \sin(\theta), -\cos(r)), \quad r \in [0, \pi/2], \theta \in [0, 2\pi],$$

Considérons les normales associées $\alpha_r \wedge \alpha_\theta$ et $\beta_r \wedge \beta_\theta$. Alors :

- ☐ $\alpha_r \wedge \alpha_\theta$ et $\beta_r \wedge \beta_\theta$ sont toutes deux extérieures.
- ☐ $\alpha_r \wedge \alpha_\theta$ et $\beta_r \wedge \beta_\theta$ sont toutes deux intérieures.
- ☐ $\alpha_r \wedge \alpha_\theta$ est extérieure et $\beta_r \wedge \beta_\theta$ est intérieure.
- ☐ $\alpha_r \wedge \alpha_\theta$ est intérieure et $\beta_r \wedge \beta_\theta$ est extérieure.

Exercice 5.

Soit la fonction $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } -\pi < x \leq -\frac{\pi}{2} \\ x^2 & \text{si } -\frac{\pi}{2} < x \leq \frac{\pi}{2} \\ 0 & \text{si } \frac{\pi}{2} < x \leq \pi \end{cases} \quad \text{étendue par } 2\pi\text{-périodicité}$$

et $Ff(x)$, sa série de Fourier. Alors :

- ☐ $\forall x \in]-\pi, \pi], Ff(x) = x^2$.
- ☐ $\forall x \in]-\pi, \pi],$

$$Ff(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } -\pi < x \leq -\frac{\pi}{2} \\ x^2 & \text{si } -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2} \\ 0 & \text{si } \frac{\pi}{2} \leq x \leq \pi \end{cases}$$

- ☐ $\forall x \in]-\pi, \pi],$

$$Ff(x) = \begin{cases} \frac{\pi^2}{8} & \text{si } -\pi < x \leq -\frac{\pi}{2} \\ x^2 & \text{si } -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2} \\ \frac{\pi^2}{8} & \text{si } \frac{\pi}{2} \leq x \leq \pi \end{cases}$$

- ☐ $\forall x \in]-\pi, \pi],$

$$Ff(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } -\pi < x < -\frac{\pi}{2} \\ \frac{\pi^2}{8} & \text{si } x = -\frac{\pi}{2} \\ x^2 & \text{si } -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2} \\ \frac{\pi^2}{8} & \text{si } x = \frac{\pi}{2} \\ 0 & \text{si } \frac{\pi}{2} < x \leq \pi \end{cases}$$

Solution des exercices calculatoires

Exercice 1 (ii) $u(x) = (1 - x^2)e^{-x^2}$

Exercice 2 $u(x) = -\frac{3}{2} + \frac{1}{2} \cos(x) + \frac{1}{12} \cos(2x)$

Exercice 3 $\lambda = -n^2$, avec $n \in \mathbb{N}$ et $u_{-n^2}(x) = \begin{cases} \frac{A_0}{2} & \text{si } n = 0 \\ A_n \cos(nx) + B_n \sin(nx) & \text{si } n \geq 1 \end{cases}$

Exercice 4 $\alpha_r \wedge \alpha_\theta$ est extérieure et $\beta_r \wedge \beta_\theta$ est intérieure.

Exercice 5 $Ff(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } -\pi < x < -\frac{\pi}{2} \\ \frac{\pi^2}{8} & \text{si } x = -\frac{\pi}{2} \\ x^2 & \text{si } -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2} \\ \frac{\pi^2}{8} & \text{si } x = \frac{\pi}{2} \\ 0 & \text{si } \frac{\pi}{2} < x \leq \pi \end{cases}$