

Expériences aléatoires

La théorie des probabilités permet de décrire et modéliser les **phénomènes aléatoires**.

Les actions qui mènent à des résultats aléatoires sont appelées des **expériences aléatoires**. Plus précisément, une expérience est dite aléatoire s'il est impossible de prévoir son résultat. En principe, on admet qu'une expérience aléatoire peut être répétée (indéfiniment) dans des conditions identiques ; son résultat peut donc varier d'une réalisation à l'autre.

Exemples :

- lancer d'un dé ou d'une pièce de monnaie ;
- tirage d'une carte.

2.1. Probabilité d'événements

Modèles probabilistes d'une expérience aléatoire

- **Ensemble fondamental** Ω : tous les résultats possibles
- **Événement élémentaire** $\omega \in \Omega$: un résultat possible.
- **Événement** : un sous-ensemble (raisonnable) $A \subseteq \Omega$. Un événement peut réunir plusieurs événements élémentaires.
- On dit qu'un événement est **réalisé** si le résultat de l'expérience aléatoire (événement élémentaire) appartient à cet événement.

Exemple Lancer d'une pièce de monnaie :

$\Omega = \{P, F\}$.

$A = \{P\}$ = "Pile" est un événement (élémentaire)

Exemple Lancer d'un dé :

$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.





$A =$ "obtenir 1" = $\{1\}$ est un événement (élémentaire).

$B =$ "obtenir un chiffre pair" = $\{2, 4, 6\}$ est un événement (composé).

Diagramme de Venn et opérations entre événements

- $A \cup B = B \cup A$ union
- $A \cap B = B \cap A$ intersection
- A^c complémentaire
- $A \setminus B = A \cap B^c$ différence ; $A \setminus B \neq B \setminus A$

- $\emptyset$ ensemble vide
- $A = \{2, 4, 6\}$ (pair)
- $B = \{2, 3, 5\}$ (premier)



Fonction de probabilité

Définition: Les événements A et B sont **disjoints** si $A \cap B = \emptyset$.

Événements $A_1, A_2, \dots, A_n$ sont disjoints si $A_i \cap A_j = \emptyset$ quand $i \neq j$.

Définition: Une fonction de probabilité, notée ici $\Pr$, est une fonction telle que

- $0 \leq \Pr(A) \leq 1$ pour tout événement A ;
- $\Pr(\Omega) = 1$, (événement certain) ;
- Si $A_1, \dots, A_n$ est une collection disjointe d'événements, alors

$$\Pr\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n \Pr(A_i)$$

De même pour une collection infinie dénombrable $A_1, A_2, \dots$

Propriétés d'une fonction de probabilité

- $\Pr(\emptyset) = 0$, (événement impossible) ;
- $\Pr(A \cup B) = \Pr(A) + \Pr(B) - \Pr(A \cap B)$;
- $\Pr(A^c) = 1 - \Pr(A)$, (événement complémentaire de A) ;
- $A \subseteq B \Rightarrow \Pr(A) \leq \Pr(B)$.

Exemple Deux lancers d'une pièce de monnaie :

$\Omega = \{PP, PF, FP, FF\}$.

(a) Expliciter les événements A = "au moins un P", B = "au moins un F", $A \cap B$, et $A \cup B$.

(b) Trouver les probabilités correspondantes si

$$\Pr(\{PP\}) = \dots = \Pr(\{FF\}) = 1/4.$$

Solution (diapositive 66)	Événements élémentaires équiprobables
67	68 Sous l'hypothèse d'équiprobabilité des événements élémentaires, pour tout événement A de Ω, $\Pr(A) = \frac{\text{nombre d'événements élémentaires dans } A}{\text{nombre total d'événements élémentaires dans } \Omega}$ $= \frac{\text{nombre de cas favorables à } A}{\text{nombre total de cas possibles}}.$ Exemple Lancer d'un dé. Supposons que les six faces ont les mêmes chances d'apparaître (événements élémentaires équiprobables). Alors $\Pr(\{1\}) = \Pr(\{2\}) = \dots = \Pr(\{6\}) = \frac{1}{6},$ et $\Pr(\text{"obtenir un nombre pair"}) = \Pr(\{2, 4, 6\}) = \Pr(\{2\}) + \Pr(\{4\}) + \Pr(\{6\})$ $= \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$ Exemple Lancers de deux dés. Trouver $\Pr(\text{"la somme des faces vaut 7"})$.
Solution (diapositive 68)	Probabilité conditionnelle et indépendance
69	70 La probabilité que l'événement A se réalise peut être influencée par la réalisation d'un autre événement B. Pour formaliser cette idée, on introduit les concepts de probabilité conditionnelle et d'indépendance : Définition: La probabilité conditionnelle de A sachant que B s'est réalisé est définie par $\Pr(A \mid B) = \frac{\Pr(A \cap B)}{\Pr(B)}, \quad \text{si } \Pr(B) > 0.$ Définition: Deux événements A et B sont dits indépendants si $\Pr(A \cap B) = \Pr(A) \times \Pr(B)$. Intuition : si $\Pr(B) > 0$, c'est équivalent à $\Pr(A \mid B) = \Pr(A).$
Exemples	Solution diapositive 71
71 Exemple Deux lancers d'une pièce de monnaie. Trouver la probabilité d'obtenir pile au 2ème lancer sachant qu'on a obtenu pile au 1er lancer. Exemple Lancer d'un dé Les événements $A = \{2, 4\}$ et $B = \{2, 4, 6\}$ sont-ils indépendants ? Ne pas confondre indépendance et incompatibilité (A et B disjoints) ! Soient A, B disjoints tels que $\Pr(A), \Pr(B) > 0$. On a $\Pr(A \cap B) = \Pr(\emptyset) = 0, \quad \text{mais } \Pr(A) \times \Pr(B) \neq 0,$ donc A et B sont dépendants. Donc $A \cap B = \emptyset \Rightarrow A \text{ et } B \text{ dépendants, et ainsi, } A \text{ et } B \text{ indépendants} \Rightarrow A \cap B \neq \emptyset.$ Par ailleurs $A \cap B \neq \emptyset \nRightarrow A \text{ et } B \text{ indépendants.}$	72

Solution diapositive 71	Indépendance : généralisation
73	Définition: Les événements $A_1, \dots, A_n$ sont indépendants si, pour tout sous-ensemble d'indices $\{i_1, \dots, i_k\} \subseteq \{1, \dots, n\}$, on a $\Pr\left(\bigcap_{j=1}^k A_{i_j}\right) = \prod_{j=1}^k \Pr(A_{i_j}).$ Exemple Un système de n composants est appelé système en parallèle s'il fonctionne dès qu'au moins un de ses composants fonctionne. Un système en série fonctionne si et seulement si tous ses composants fonctionnent. (a) Si le ième composant fonctionne indépendamment de tous les autres et avec une probabilité p_i, $i = 1, \dots, n$, quelle est la probabilité de fonctionnement d'un système en parallèle ? (b) Même question pour un système en série. (c) Même question pour un système composé. 74
Solution diapositive 74	Formule des probabilités totales
75	Définition: Soit A un événement quelconque de Ω, et $\{B_i\}_{i=1, \dots, n}$ une partition de Ω, c'est-à-dire, $B_i \cap B_j = \emptyset, \quad i \neq j, \quad \bigcup_{i=1}^n B_i = \Omega.$ La formule des probabilités totales $\Pr(A) = \sum_{i=1}^n \Pr(A \cap B_i) = \sum_{i=1}^n \Pr(A \mid B_i) \Pr(B_i).$ Elle est également valide pour une partition infinie dénombrable. Exemple Trois machines M_1, M_2 et M_3 fabriquent des pièces dans les proportions respectives 25%, 35% et 40%. On sait que respectivement 5%, 4% et 2% des pièces produites par M_1, M_2 et M_3 sont défectueuses. On choisit une pièce aléatoirement. Calculer $\Pr(\text{"la pièce est défectueuse"}).$ 76
Formule des probabilités totales : diagramme de Venn	Solution diapositive 76
77	Définissons les événements : $D = \text{"la pièce est défectueuse"}$ et pour $i = 1, 2, 3$, $A_i = \text{"la pièce a été fabriquée par } M_i\text{"}$. 78

Théorème de Bayes	Solution exemple Bayes
Théorème de Bayes Soient $A \subseteq \Omega$ et $\{B_i\}_{i=1,\dots,n}$ une partition (éventuellement infinie dénombrable) de Ω. Si $\Pr(A) > 0$ alors on a, pour tout $i = 1, \dots, n$, $\Pr(B_i A) = \frac{\Pr(B_i \cap A)}{\Pr(A)} = \frac{\Pr(A B_i)\Pr(B_i)}{\sum_{j=1}^n \Pr(A B_j)\Pr(B_j)}.$ La formule de Bayes est très simple mais très utile, car elle permet une ‘inversion du point de vue’ dont on a souvent besoin en pratique. Exemple Pour dépister une maladie, on applique un test. Si la maladie est présente, le test le découvre avec probabilité 0.99. Si la personne est saine, le test le trouve malade avec probabilité 0.02. Sachant qu’en moyenne un patient sur 1000 est atteint de la maladie, calculer la probabilité qu’un patient soit atteint sachant que son test a été positif. Comment améliorer ce resultat ?	Soit M l’événement “le patient est atteint de la maladie”, M^c l’événement complémentaire, et A l’événement “le résultat du test est positif”.
Types d’indépendance	Exemples : indépendance conditionnelle
Les événements $A_1, \dots, A_n$ sont indépendants si pour tout ensemble fini d’indices $F \subseteq \{1, \dots, n\}$ qui est non-vide, on a $\Pr\left(\bigcap_{i \in F} A_i\right) = \prod_{i \in F} \Pr(A_i).$ Définition: Les événements $A_1, \dots, A_n$ sont conditionnellement indépendants sachant B si pour tout ensemble fini d’indices $F \subseteq \{1, \dots, n\}$ qui est non-vide, on a $\Pr\left(\bigcap_{i \in F} A_i \mid B\right) = \prod_{i \in F} \Pr(A_i \mid B).$	Exemple Une année donnée, la probabilité qu’un conducteur fasse une déclaration de sinistre à son assurance est μ, indépendamment des autres années. La probabilité pour une conductrice est de $\lambda < \mu$. Un assureur a le même nombre de conducteurs que de conductrices, et sélectionne une personne au hasard. (a) Donner la probabilité que la personne déclare un sinistre cette année (b) Donner la probabilité que la personne déclare des sinistres durant 2 années consécutives (c) Si la compagnie sélectionne au hasard une personne ayant fait une déclaration, quelle est la probabilité que cette personne fasse une déclaration l’année suivante ? (d) Montrer que la connaissance qu’une déclaration de sinistre ait été faite une année augmente la probabilité de déclarer un autre l’année suivante
Solution 82	
	2.2 Variables aléatoires