


Méthode des éléments finis

Formulation intégrale des problèmes aux limites bidimensionnels

Prof. F. Gallaire

Éléments finis quadrangulaires sérendipiens



- Famille sérendipienne d'éléments finis rectangulaires réguliers



Nœuds uniquement sur la périphérie



Gain en stockage et temps calcul sans perte appréciable de précision



Éléments finis quadrangulaires sérendipiens

- Formule générale des fonctions de base des éléments finis rectangulaires sérendipiens


$$\begin{aligned} {}^e h_i(\xi, \eta) = & \frac{1}{2} (1-\eta) {}^e h_i(\xi, -1) + \frac{1}{2} (1+\xi) {}^e h_i(1, \eta) \\ & + \frac{1}{2} (1+\eta) {}^e h_i(\xi, 1) + \frac{1}{2} (1-\xi) {}^e h_i(-1, \eta) \\ & - \frac{1}{4} (1-\xi)(1-\eta) {}^e h_i(-1, -1) - \frac{1}{4} (1+\xi)(1-\eta) {}^e h_i(1, -1) \\ & - \frac{1}{4} (1+\xi)(1+\eta) {}^e h_i(1, 1) - \frac{1}{4} (1-\xi)(1+\eta) {}^e h_i(-1, 1) \end{aligned}$$



Restriction de ${}^e h_i(\xi, \eta)$ le long des arêtes et aux coins

Éléments finis quadrangulaires sérendipiens


- Élément fini rectangulaire quadratique à 8 points nœuds



Numérotation des nœuds

Éléments finis quadrangulaires sérendipiens


- Fonctions de base de l'élément rectangulaire quadratique



$$^eh_1(\xi, \eta) = \frac{1}{2} (1-\eta) ^eh_1(\xi, -1) + \frac{1}{2} (1-\xi) ^eh_1(-1, \eta) - \frac{1}{4} (1-\xi)(1-\eta) ^eh_1(-1, -1)$$

Éléments finis quadrangulaires sérendipiens


- Fonctions de base de l'élément rectangulaire quadratique (*suite*)



$$^eh_1(\xi, \eta) = \frac{1}{2} (1-\eta) \cdot \frac{1}{2} \xi (\xi - 1) + \frac{1}{2} (1-\xi) \cdot \frac{1}{2} \eta (\eta - 1) - \frac{1}{4} (1-\xi)(1-\eta) \cdot (1)$$

Éléments finis quadrangulaires sérendipiens


- Fonctions de base de l'élément rectangulaire quadratique (*suite*)



$$e_{h_1}(\xi, \eta) = \frac{1}{4} (1 - \xi)(1 - \eta)(-1 - \xi - \eta)$$

Éléments finis quadrangulaires sérendipiens

- Fonctions de base de l'élément rectangulaire quadratique (*suite*)



$$^eh_5(\xi, \eta) = \frac{1}{2} (1 - \eta) ^eh_5(\xi, -1) = \frac{1}{2} (1 - \eta) \cdot (1 - \xi^2)$$

Éléments finis quadrangulaires sérendipiens


- Fonctions de base de l'élément rectangulaire quadratique (*suite*)

$${}^e h_1 = \frac{1}{4} (1-\xi)(1-\eta)(-1-\xi-\eta)$$

$${}^e h_2 = \frac{1}{4} (1+\xi)(1-\eta)(-1+\xi-\eta)$$

$${}^e h_3 = \frac{1}{4} (1+\xi)(1+\eta)(-1+\xi+\eta)$$

$${}^e h_4 = \frac{1}{4} (1-\xi)(1+\eta)(-1-\xi+\eta)$$



Élément fini
biquadratique

Éléments finis quadrangulaires sérendipiens


- Fonctions de base de l'élément rectangulaire quadratique (*suite*)

$${}^e h_5 = \frac{1}{2} (1 - \xi^2) (1 - \eta)$$

$${}^e h_6 = \frac{1}{2} (1 + \xi) (1 - \eta^2)$$

$${}^e h_7 = \frac{1}{2} (1 - \xi^2) (1 + \eta)$$


$${}^e h_8 = \frac{1}{2} (1 - \xi) (1 - \eta^2)$$



Fonctions de base
variant linéairement
de face à face


Éléments finis quadrangulaires sérendipiens

- Allure des fonctions de base de l'élément rectangulaire biquadratique



Éléments finis quadrangulaires sérendipiens

- Comparaison des fonctions de base des éléments quadratiques lagrangien et sérendipien



Éléments finis quadrangulaires sérendipiens

- Critères de convergence et élément biquadratique sérendipien




Complétude
satisfaite



Différentiabilité
satisfaite




Continuité
satisfaite
aux nœuds et
aux interfaces



Éléments finis quadrangulaires sérendipiens


- Famille généralisée d'éléments finis rectangulaires sérendipiens



Nombre de nœuds libre
sur chaque arête




Intérêt : transition
entre éléments
d'ordres différents



Éléments finis quadrangulaires sérendipiens

- Exemple d'un élément fini rectangulaire sérendipien généralisé


$$\begin{aligned}
 {}^e h_2 &= \frac{1}{2} (1-\eta) {}^e h_2(\xi, -1) \\
 &\quad + \frac{1}{2} (1+\xi) {}^e h_2(1, \eta) \\
 &\quad - \frac{1}{4} (1+\xi)(1-\eta) {}^e h_2(1, -1)
 \end{aligned}$$


$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{2} (1-\eta) \cdot \frac{1}{2} (1+\xi) + \frac{1}{2} (1+\xi) \cdot \frac{1}{2} \eta (\eta-1) \\
 &\quad - \frac{1}{4} (1+\xi)(1-\eta) \cdot (1) = \frac{1}{4} \eta (1+\xi)(\eta-1)
 \end{aligned}$$

Éléments finis quadrangulaires sérendipiens

- Exemple d'un élément fini rectangulaire sérendipien généralisé (*suite*)

$$\begin{aligned} \circled{e h_4} &= \frac{1}{2} (1+\eta) {}^e h_4(\xi, 1) \\ &\quad + \frac{1}{2} (1-\xi) {}^e h_4(-1, \eta) \\ &\quad - \frac{1}{4} (1-\xi)(1+\eta) {}^e h_4(-1, 1) \end{aligned}$$



$$= \frac{1}{2} (1+\eta) \cdot \frac{1}{2} (1-\xi) + \frac{1}{2} (1-\xi) \cdot \frac{1}{2} (1+\eta)$$




Fonction linéaire
 ${}^e h_4$ inchangée

$$- \frac{1}{4} (1-\xi)(1+\eta) \cdot (1) = \frac{1}{4} (1-\xi)(1+\eta)$$

Éléments finis quadrangulaires sérendipiens

- Exemple d'un élément fini rectangulaire sérendipien généralisé pour une transition bilinéaire-biquadratique



$$\textcircled{e h_2} = \frac{1}{4} \eta (1 + \xi) (\eta - 1)$$

$$\textcircled{e h_5} = \frac{1}{2} (1 + \xi) (1 - \eta^2)$$




$$e h_2^t \Big|_{\xi=1} = e h_1^q \Big|_{\xi=-1}$$

$$e h_5^t \Big|_{\xi=1} = e h_8^q \Big|_{\xi=-1}$$

Éléments finis quadrangulaires lagrangiens ou sérendipiens

- Numérotation usuelle des nœuds et calcul des fonctions de base



Éléments finis quadrangulaires lagrangiens ou sérendipiens



- Construction des fonctions de base des éléments rectangulaires

Fonctions de base des nœuds 1 à 4 de coin

$$\begin{aligned} {}^e h_1 &= 0.25 (1 - \xi) (1 - \eta) & {}^e h_3 &= 0.25 (1 + \xi) (1 + \eta) \\ {}^e h_2 &= 0.25 (1 + \xi) (1 - \eta) & {}^e h_4 &= 0.25 (1 - \xi) (1 + \eta) \end{aligned}$$

Fonctions de base des nœuds 5 à 8 de côté

$$\begin{aligned} {}^e h_5 &= 0.5 (1 - \xi^2) (1 - \eta) & \text{si le nœud 5 est présent;} & \quad \text{sinon } {}^e h_5 &= 0 \\ {}^e h_6 &= 0.5 (1 + \xi) (1 - \eta^2) & \text{si le nœud 6 est présent;} & \quad \text{sinon } {}^e h_6 &= 0 \\ {}^e h_7 &= 0.5 (1 - \xi^2) (1 + \eta) & \text{si le nœud 7 est présent;} & \quad \text{sinon } {}^e h_7 &= 0 \\ {}^e h_8 &= 0.5 (1 - \xi) (1 - \eta^2) & \text{si le nœud 8 est présent;} & \quad \text{sinon } {}^e h_8 &= 0 \end{aligned}$$



Éléments finis quadrangulaires lagrangiens ou sérendipiens

- Construction des fonctions de base (*suite*)


Correction des fonctions de base des nœuds de coin

$${}^e h_1 \leftarrow {}^e h_1 - 0.5 ({}^e h_8 + {}^e h_5)$$

$${}^e h_2 \leftarrow {}^e h_2 - 0.5 ({}^e h_5 + {}^e h_6)$$

$${}^e h_3 \leftarrow {}^e h_3 - 0.5 ({}^e h_6 + {}^e h_7)$$

$${}^e h_4 \leftarrow {}^e h_4 - 0.5 ({}^e h_7 + {}^e h_8)$$



Critère de déplacement
rigide (température
uniforme)

$$\sum_{i=1}^8 {}^e h_i(x, y) = 1$$

Éléments finis quadrangulaires lagrangiens ou sérendipiens



- Construction des fonctions de base (*suite*)

Fonction de base du nœud interne 9 (élément biquadratique lagrangien)

$${}^e h_9 = (1 - \xi^2)(1 - \eta^2) \quad \text{si l'élément est biquadratique lagrangien;} \quad \text{sinon } {}^e h_9 = 0$$

Correction des fonctions de base des nœuds de coin et de côté

$${}^e h_i \leftarrow {}^e h_i + 0.25 {}^e h_9 \quad (i = 1, 2, 3, 4) \quad {}^e h_i \leftarrow {}^e h_i - 0.5 {}^e h_9 \quad (i = 5, 6, 7, 8)$$



Éléments finis quadrangulaires lagrangiens ou sérendipiens


- Exemple d'application

$${}^e h_5 = 0.5(1+\xi)(1-\eta^2) \equiv {}^e h_6$$

$$\begin{aligned} {}^e h_2 &\leftarrow {}^e h_2 - 0.5 {}^e h_6 \\ &= 0.25(1+\xi)(1-\eta) \\ &\quad - 0.5(0.5)(1+\xi)(1-\eta^2) \\ &= 0.25\eta(1+\xi)(\eta-1) \end{aligned}$$




Numérotation des nœuds



Éléments finis triangulaires

- Élément fini triangulaire (isocèle) rectangle linéaire à 3 nœuds



Éléments finis triangulaires

- Fonctions de base de l'élément triangulaire rectangle

$${}^e h_1 = 1 - \xi - \eta$$

$${}^e h_2 = \xi$$


$${}^e h_3 = \eta$$



Fonctions linéaires
en ξ et η

$\Rightarrow$


Élément fini
bilinéaire



Différentiabilité
satisfaite

Éléments finis triangulaires

- Allure des fonctions de base de l'élément triangulaire bilinéaire



Éléments finis triangulaires


- Critère de continuité et élément triangulaire bilinéaire



Continuité
satisfaite aux
nœuds et aux
interfaces






Élément
compatible
ou conforme



Éléments finis triangulaires

- Famille d'éléments finis triangulaires rectangles




Fonctions de base =
produits normés de
formes linéaires



Intérêt : accroissement
de la précision

Éléments finis triangulaires

- Élément fini triangulaire quadratique à 6 points nodaux



Éléments finis triangulaires

- Fonctions de base de l'élément triangulaire quadratique

$${}^e h_1 = (1 - \xi - \eta) \cdot \left(\frac{1}{2} - \xi - \eta\right) \cdot 2$$

$$= (1 - \xi - \eta)(1 - 2\xi - 2\eta)$$


$${}^e h_5 = \xi \eta \cdot 4 = 4\xi \eta$$



Normalisation



Surabondance
de monômes



Éléments finis triangulaires

- Fonctions de base de l'élément triangulaire quadratique (*suite*)

$${}^e h_1 = (1-\xi-\eta)(1-2\xi-2\eta)$$

$${}^e h_2 = \xi(2\xi-1)$$

$${}^e h_3 = \eta(2\eta-1)$$


$${}^e h_4 = 4\xi(1-\xi-\eta)$$

$${}^e h_5 = 4\xi\eta$$

$${}^e h_6 = 4\eta(1-\xi-\eta)$$



Élément fini
biquadratique




Différentiabilité
satisfaite

Éléments finis triangulaires


- Allure des fonctions de base de l'élément triangulaire biquadratique



Complétude
satisfaite



$${}^e h_1 = (1 - \xi - \eta)(1 - 2\xi - 2\eta)$$



$${}^e h_6 = 4\eta(1 - \xi - \eta)$$

Éléments finis triangulaires


- Critère de continuité et élément triangulaire biquadratique




Continuité
satisfaite aux
nœuds et aux
interfaces



Élément
compatible
ou conforme



Réseau d'éléments finis quadrangulaires et triangulaires



Précision des éléments finis bidimensionnels réguliers

- Estimation asymptotique locale de l'erreur

$$\| e u - e u_I \|_{1, e \Omega} \leq e C_1 e h^k \| e u \|_{k+1, e \Omega} \quad (e h \rightarrow 0)$$

$e u_I$ interpolation nodale

$e C_1$ facteur de convergence

$e h$ «diamètre» de l'élément fini $e \Omega$

k degré des fonctions de base (interpolation)



Plus grande
distance entre
deux nœuds



Norme H^1



Coefficient dépendant de
la forme de l'élément




Critère de
complétude



Facteur lié à la régularité
de la solution


Précision des éléments finis bidimensionnels réguliers

- Complétude des éléments finis (triangles de Pascal)



Précision des éléments finis bidimensionnels réguliers

- Complétude des éléments finis (*suite*)



Polynômes complets
au 2ème degré

Précision des éléments finis bidimensionnels réguliers

- Estimation asymptotique de l'erreur (norme H^1)

$$\| e^h \|_{1, \Omega} = \| u - u^h \|_{1, \Omega} \leq C_1 h^k \quad (h \rightarrow 0)$$

e^h écart entre solutions exacte u et approchée u^h

C_1 facteur de convergence

h longueur caractéristique du réseau ($h = \max^e h$)

k taux de convergence (degré du polynôme complet)






Coefficient dépendant de
la forme de l'élément

$$C_1 \text{ (rectangle)} \leq C_1 \text{ (rectangle)} \leq C_1 \text{ (triangle)}$$



Critère de
complétude



$k = 2$