

Physique Générale: électromagnétisme – Cours 23




http:\\ttpoll.eu


session ID: emagsv

A quelle vitesse se propage une onde é.m. dans le vide?

A.
$$c = 3 \times 10^5 \text{ m/s}$$



C.
$$c = 3 \times 10^{10} \text{ m/s}$$




Une perturbation se propage avec $\vec{E}(z,t) = \vec{E}_0 \cos(kz - \omega t)$.

- \checkmark A. Elle se propage selon +z.
 - B. Elle se propage selon -z.
 - C. Cela depend du sens de \vec{E}_0 .



Dans une onde é.m. la direction de \vec{B} telle que...

- A. $\vec{E} \times \vec{B}$ est selon +z.
- B. $\vec{E} \times \vec{B}$ est selon -z.
- \checkmark C. $\vec{E} \times \vec{B}$ est selon la direction de propagation.
 - D. $\vec{E} \times \vec{B} = 0$.



Quelle est la longueur d'onde de l'onde é.m. émise par vos téléphones si la fréquence est de 3 GHz?


A. 600 nm



C. 1 km



Très souvent, les ondes é.m. ont un spectre de fréquences/longueurs d'onde:




spectre Fourier 4D

$$\tilde{E}(\omega, \vec{k}) = \frac{1}{(2\pi)^2} \iiint \int E(\vec{x}, t) e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t)} d^3 \vec{x} dt$$


spectre Fourier 1D (fréquence)

$$\tilde{E}(\omega) = \frac{1}{(2\pi)^{1/2}} \int E(t)e^{i\omega t}dt$$


et dans le vide $\omega = 2\pi f = \frac{2\pi c}{\lambda}$




Application de la pression de radiation: les 'optical tweezers' pour la biologie!



étirement d'une protéine (ADN)



rotation d'une cellule



nanoparticule (100nm)

Pression de radiation dans l'Univers: sur les comètes!

Comète Halley (dernier passage 1986, prochain passage 2061)



Comète Hale (dernier passage 1997, prochain passage 4385)

