

Exercice 1

Le seul soluté en quantité importante dans le vinaigre est l'acide acétique, CH_3COOH ($\text{pK}_a = 4,75$). Supposons que l'on veuille préparer une solution tampon à l'aide d'un vinaigre dont la masse volumique est $\rho = 1,01 \text{ g cm}^{-3}$ et la teneur en acide acétique de 4,53% masse. (100g de vinaigre contiennent 4.53 g de CH_3COOH). Quel serait le pH de la solution tampon obtenue en dissolvant 10,0 g d'acétate de sodium, CH_3COONa dans 250 mL de vinaigre à 25°C ?

Exercice 2

On dissout 21 g d'acide benzoïque, $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$, et 18 g de benzoate de sodium, $\text{C}_6\text{H}_5\text{COONa}$, dans de l'eau pour préparer 500 mL de solution tampon.

- Quel est le pH de cette solution ?
- Quel est le pH de la solution obtenue par adjonction de 50 mL de NaOH 0,15 M à 50 mL de cette solution tampon ?
- Quel est le pH de la solution obtenue en ajoutant 0,05 mol de HCl gazeux à 100 mL de cette solution tampon ?

$\text{pK}_a(\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}) = 4.2$

Exercice 3

On dissout 10,8 g du chlorure d'ammonium, NH_4Cl , et 0,15 mol d'ammoniac, NH_3 , dans de l'eau pour préparer 500 mL de solution tampon.

- Quel est le pH de cette solution ?
- Quel est le pH de la solution obtenue par adjonction de 25 mL de NaOH 0,2 M à 75 mL de cette solution tampon ?
- Quel est le pH de la solution obtenue en ajoutant 100 mL HCl 0,1 M à 100 mL de cette solution tampon ?

$\text{pK}_a(\text{NH}_4^+) = 9.25$

Exercice 4

Calculer le volume d'eau et la masse de NH_4Cl (s) à ajouter à une solution de 250 mL NH_3 (1 mol/L) pour obtenir 0.5 L d'une solution tampon de $\text{pH} = 10.25$. (Considérer pour l'ensemble du problème, que la température vaut 25°C et que l'ajout d'un solide à une solution n'en modifie pas le volume.)

$\text{pK}_a(\text{NH}_4^+) = 9.25$