

**Exercice 1.** (*Définitions de limites*)

Donner la définition avec  $\varepsilon, \delta, \dots$  et la caractérisation équivalente avec des suites de:

$$(a) \lim_{x \uparrow 4} f(x) = -\infty \qquad (b) \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

**Exercice 2.** (*Prolongements par continuité*)

Calculer le prolongement par continuité en  $x = 0$  des fonctions suivantes:

$$(a) f(x) = \frac{\sin(x)}{x} \qquad (b) f(x) = x \sin\left(\frac{1}{x}\right) \qquad (c) f(x) = \arctan\left(\frac{1}{x^2}\right)$$

**Exercice 3.** (*Calcul de limites*)

Calculer les limites suivantes (si elles existent).

$$\begin{aligned} (a) \lim_{x \downarrow 0} \frac{1}{x} - \frac{1}{|x|} & \qquad (e) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 + 5x - 6}{4 - x} \\ (b) \lim_{x \uparrow 0} \frac{1}{x} - \frac{1}{|x|} & \qquad (f) \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + x} - \sqrt{x^2 + 1} \\ (c) \lim_{x \uparrow 1} \frac{\sqrt{1 - x^2}}{x - 1} & \qquad (g) \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[3]{x + 1} - \sqrt[3]{x} \\ (d) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5x - 6}{4 - x^2} & \qquad (h) \lim_{x \rightarrow \infty} x \left( \sqrt{\left(1 + \frac{2}{x}\right)\left(1 + \frac{3}{x}\right)} - 1 \right) \end{aligned}$$

**Exercice 4.** (*Continuité*)

Étudier la continuité et la continuité à gauche/droite en  $x = 3$  et  $x = -1$  de la fonction  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  suivante, en fonction des paramètres  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3x^2 - 10x + 3}{x^2 - 2x - 3} & \text{si } x > 3 \text{ ou } x < -1 \\ \alpha & \text{si } x = 3 \\ \beta x - 4 & \text{si } -1 \leq x < 3. \end{cases}$$

**Exercice 5.** (*Applications du TVI*)

Montrer que:

- L'équation  $\cos(x) = x \sin(x)$  a au moins une solution dans l'intervalle  $[0, 2025]$ .
- L'équation  $\sin(x) + \frac{1}{x-4} = 0$  a au moins **deux** solutions dans l'intervalle  $[0, \pi]$ .
- L'équation  $(x - 2) \cos(x) = \sin(x)$  admet au moins **deux** solutions sur  $\mathbb{R}$ .
- Tout polynôme  $p(x)$  de degré **impair** à coefficients réels possède au moins une racine (= un zéro) dans  $\mathbb{R}$ .

**Exercice 6.** (*Théorème du point fixe*)

Soit  $f: [a, b] \rightarrow [a, b]$  une fonction continue (partant **et arrivant** vers  $[a, b]$ ). Montrer que  $f$  possède un point fixe, i.e., qu'il existe  $c \in [a, b]$  avec  $f(c) = c$ .

**Exercice 7.** (*V/F type examen*)

Vrai ou faux ?

- (a) Si  $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  sont deux fonctions telles que  $f(q) = g(q)$  pour tout  $q \in \mathbb{Q}$ , alors  $f(x) = g(x)$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ .
- (b) Si  $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  sont deux fonctions continues telles que  $f(q) = g(q)$  pour tout  $q \in \mathbb{Q}$ , alors  $f(x) = g(x)$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ .
- (c) Toute fonction  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  est continue en au moins un  $u \in \mathbb{R}$ .
- (d) Si  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  est telle que  $f^2$  est continue, alors  $f$  est continue.
- (e) Toute fonction continue  $f: [0, 1[ \rightarrow \mathbb{R}$  atteint soit son minimum, soit son maximum (soit les deux) sur  $[0, 1[$ .

**Exercice 8.** (*QCM type examen, 1/2*)

Soit  $f: I \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction continue, avec  $I = [0, 1]$ . Alors l'image  $\text{Im}(f)$  de  $f$ :

- est toujours un intervalle ouvert.
- est toujours un intervalle fermé.
- est toujours un intervalle, mais qui peut être ni ouvert, ni fermé.
- n'est pas nécessairement un intervalle.

**Exercice 9.** (*QCM type examen, 2/2*)

Même question qu'à l'exercice 8, mais avec  $I = ]0, 1[$ .