

## Analyse I – Corrigé de la Série 6

### Exercice 1.

$$\begin{aligned} i) \lim_{n \rightarrow \infty} a_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + an + b} - n) = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left( \sqrt{1 + \frac{a}{n} + \frac{b}{n^2}} - 1 \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a + \frac{b}{n}}{\sqrt{1 + \frac{a}{n} + \frac{b}{n^2}} + 1} = \frac{a}{2} \end{aligned}$$

Par l'Intermezzo dans la Série 5 on sait que  $1 \leq \sqrt{1+x} \leq 1 + \frac{1}{2}x$  pour tout  $x \geq 0$ , alors la limite  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{1 + \frac{a}{n} + \frac{b}{n^2}} = 1$  d'après le théorème des 2 gendarmes.

$$\begin{aligned} ii) \lim_{n \rightarrow \infty} a_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{2n^2 - n + 1} - 2n) = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left( \sqrt{2 - \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}} - 2 \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-2n - 1 + \frac{1}{n}}{\sqrt{2 - \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}} + 2} = -\infty \end{aligned}$$

Par l'Intermezzo dans la Série 5 on sait que  $1 + x \leq \sqrt{1+x} \leq 1 + \frac{1}{2}x$  pour tout  $-1 \leq x \leq 0$ . On a  $-1 \leq -\frac{1}{2n} + \frac{1}{2n^2} \leq 0$  pour tout  $n \geq 1$ , alors la limite  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{2 - \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{2} \sqrt{1 - \frac{1}{2n} + \frac{1}{2n^2}} = \sqrt{2}$  d'après le théorème des 2 gendarmes.

iii) On a  $\forall x \in \mathbb{R} \quad -1 \leq \cos(x) \leq 1$ .

Ainsi,  $-\frac{3 + \frac{8}{n}}{n + 2 + \frac{6}{n}} \leq a_n \leq \frac{3 + \frac{8}{n}}{n + 2 + \frac{6}{n}}$ . Les deux membres bornant  $a_n$  ayant pour limite 0 pour  $n \rightarrow \infty$ , on a donc d'après le théorème des gendarmes :  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

iv) Démontrons que  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$ . Soit  $\varepsilon > 0$ . On a très clairement,  $\forall n \in \mathbb{N}, a_n \geq 1$ . Donc il faut trouver  $n_0 \in \mathbb{N}$  tel que pour tout  $n \geq n_0$ , on a  $\sqrt[n]{n} \leq (1 + \varepsilon)$ , ou  $(1 + \varepsilon)^n \geq n$ . Par la formule binomiale on a  $(1 + \varepsilon)^n \geq 1 + n\varepsilon + \frac{n(n-1)}{2}\varepsilon^2 \geq \frac{n(n-1)}{2}\varepsilon^2$ . Alors pour avoir  $\varepsilon^2 \frac{n(n-1)}{2} \geq n$ , il faut prendre  $n$  tel que  $\frac{n-1}{2} \geq \frac{1}{\varepsilon^2}$ , d'où  $n \geq 1 + \frac{2}{\varepsilon^2}$ .

On peut prendre par exemple  $n_0 = \left\lceil \frac{2}{\varepsilon^2} + 2 \right\rceil$ .

Une autre méthode : On a  $\forall n \in \mathbb{N}, a_n \geq 1$ . De plus,  $n^{\frac{1}{n}} = (\sqrt{n}\sqrt{n} \cdot 1^{n-2})^{\frac{1}{n}} \leq \frac{2\sqrt{n} + n - 2}{n}$  d'après l'inégalité arithmético-géométrique :

$$\sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n} \leq \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

pour tout  $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$  positifs.

Enfin,  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2\sqrt{n} + n - 2}{n} = 1$ . Ainsi, d'après le théorème des gendarmes,  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$ .

v) Soit  $a = b_k > 0$  le coefficient dominant de  $P(n)$  et  $k \in \mathbb{N}$  le degré de  $P(n)$ . Alors  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{P(n)}{an^k} =$

1. Pour  $\varepsilon = \frac{1}{2}$ ,  $\exists n_0 \in \mathbb{N}$  tel que  $\forall n \geq n_0$ ,

$$1 - \frac{1}{2} \leq \frac{P(n)}{an^k} \leq 1 + \frac{1}{2} \quad \implies \quad \frac{1}{2} \leq \frac{P(n)}{an^k} \leq \frac{3}{2}.$$

Alors pour tout  $n \geq n_0$

$$\left(\frac{a}{2}n^k\right)^{\frac{1}{n}} \leq (P(n))^{\frac{1}{n}} \leq \left(\frac{3a}{2}n^k\right)^{\frac{1}{n}}.$$

On sait que  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$  et que pour tout  $s > 0$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{s} = 1$ . Alors d'après le théorème des 2 gendarmes, on a  $\lim_{n \rightarrow \infty} (P(n))^{\frac{1}{n}} = 1$ .

### Exercice 2.

i) On a  $\forall x \in \mathbb{R} - 1 \leq \cos(x) \leq 1$ .

$$\text{D'où } -\frac{1}{2n+1} \leq \frac{\cos(\sqrt{n^2+2})}{2n+1} \leq \frac{1}{2n+1}.$$

D'après le théorème des gendarmes on a donc  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cos(\sqrt{n^2+2})}{2n+1} = 0$ .

ii) On a  $\forall x \in \mathbb{R}_+ \sin(x) \leq x$  et  $\cos(x) \leq 1$ .

De plus, on montre assez trivialement que  $\forall n \geq 1, \cos\left(\frac{1}{n^2}\right) \geq 0$  et  $\sin\left(\frac{1}{n^3}\right) \geq 0$ . Ainsi, pour  $n \geq 1, 0 \leq n^2 \cos\left(\frac{1}{n^2}\right) \sin\left(\frac{1}{n^3}\right) \leq \frac{1}{n}$ .

Enfin, d'après les théorèmes des gendarmes on a donc  $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \cos\left(\frac{1}{n^2}\right) \sin\left(\frac{1}{n^3}\right) = 0$

iii) Nous allons utiliser les formules de trigonométrie suivantes :

$$\sin(p) - \sin(q) = 2 \sin\left(\frac{p-q}{2}\right) \cos\left(\frac{p+q}{2}\right)$$

$$\cos(p) + \cos(q) = 2 \cos\left(\frac{p-q}{2}\right) \cos\left(\frac{p+q}{2}\right).$$

$$\text{Ainsi, } \frac{\sin(n+1) - \sin(n-1)}{\cos(n+1) + \cos(n-1)} = \tan(1).$$

$$\text{On a donc directement } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin(n+1) - \sin(n-1)}{\cos(n+1) + \cos(n-1)} = \tan(1)$$

iv) Comme pour le cosinus, on a  $\forall x \in \mathbb{R} - 1 \leq \sin(x) \leq 1$ .

$$\text{D'où } -\frac{1}{1+n^2+n^3} \leq \frac{\sin(\sqrt{n^3+n^2+1})}{n^3+n^2+1} \leq \frac{1}{1+n^2+n^3}.$$

D'après le théorème des gendarmes on a donc  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin(\sqrt{n^3+n^2+1})}{n^3+n^2+1} = 0$ .

$$\begin{aligned} v) \frac{\sqrt{n^2+n+1} - \sqrt{n^2+3n+4}}{2} &= \frac{(n^2+n+1) - (n^2+3n+4)}{2(\sqrt{n^2+n+1} + \sqrt{n^2+3n+4})} \\ &= \frac{-2 - \frac{3}{n}}{2\left(\sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}} + \sqrt{1 + \frac{3}{n} + \frac{4}{n^2}}\right)}. \end{aligned}$$

Par opérations élémentaires sur les limites et l'argument comme dans l'Exercice 1(i), on

$$a) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^2+n+1} - \sqrt{n^2+3n+4}}{2} = -\frac{1}{2}$$

$$vi) \sqrt{n}(\sqrt{n^3+n} - \sqrt{n^3+1}) = \frac{\sqrt{n}(n-1)}{\sqrt{n^3+n} + \sqrt{n^3+1}} = \frac{1 - \frac{1}{n}}{\sqrt{1 + \frac{1}{n^2}} + \sqrt{1 + \frac{1}{n^3}}}$$

Par opérations élémentaires sur les limites et l'argument comme dans l'Exercice 1(i), on

$$a) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n}(\sqrt{n^3+n} - \sqrt{n^3+1}) = \frac{1}{2}$$

$$vii) -\frac{n^3}{7^n} \leq \frac{n^3}{7^n} \cos\left(\frac{7^n}{(n+1)^3}\right) \leq \frac{n^3}{7^n}$$

La suite  $\left(\frac{n^3}{7^n}\right)$  converge vers 0 par le critère de d'Alembert :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)^3 7^n}{7^{n+1} n^3} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^3 \frac{1}{7} = \frac{1}{7} < 1.$$

D'après le théorème des gendarmes on trouve que  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3}{7^n} \cos\left(\frac{7^n}{(n+1)^3}\right) = 0$

viii) La suite  $n^2 3^n e^{-3n} = n^2 \left(\frac{3}{e^3}\right)^n$  converge vers 0 par le critère de d'Alembert :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)^2 3^{n+1} (e^3)^n}{(e^3)^{n+1} n^2 3^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^2 \frac{3}{e^3} = \frac{3}{e^3} < 1$$

Alors on a  $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 3^n e^{-3n} = 0$

### Exercice 3.

i) La suite  $a_{n+1} = \frac{1}{4}(3a_n + 1)$ ,  $a_0 = 0$  est un exemple d'une récurrence linéaire de la forme  $a_{n+1} = qa_n + b$ , où  $q = \frac{3}{4}$  et  $b = \frac{1}{4}$ . Par la proposition vue dans le cours (voir Notes du Cours 9), puisque  $|q| < 1$ , la suite converge vers la limite  $\frac{b}{1-q} = \frac{1/4}{1-3/4} = 1$ . Donc on a

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1.$$

ii) La suite  $a_{n+1} = \frac{1}{4}(a_n + 4)$ ,  $a_0 = 3$  est encore un exemple d'une récurrence linéaire de la forme  $a_{n+1} = qa_n + b$ , où  $q = \frac{1}{4}$  et  $b = 1$ . Par la proposition vue dans le cours (voir Notes du Cours 9), puisque  $|q| < 1$ , la suite converge vers la limite  $\frac{b}{1-q} = \frac{1}{1-1/4} = \frac{4}{3}$ . Donc on a

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{4}{3}.$$

iii) Si la limite  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$  existe, elle satisfait l'équation (utiliser les propriétés algébriques comme précédemment)

$$a = \frac{7}{3} - \frac{1}{1+a} \Leftrightarrow 1 = \left(\frac{7}{3} - a\right)(1+a) \Leftrightarrow 0 = \frac{4}{3} + \frac{4}{3}a - a^2 \Leftrightarrow$$

$$3a^2 - 4a - 4 = (3a+2)(a-2) = 0 \Leftrightarrow a = 2 \text{ ou } a = -\frac{2}{3}.$$

On montre par récurrence que  $a_n \geq 0$  pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ . On a  $a_0 = 1 \geq 0$ . Si  $a_{n-1} \geq 0$ , alors

$$a_n = \frac{7}{3} - \frac{1}{1+a_{n-1}} \geq \frac{7}{3} - 1 = \frac{4}{3} \geq 0.$$

Ainsi la seule limite possible est  $a = 2$ .

On montre alors (encore par récurrence) que  $(a_n)$  est majorée par  $a = 2$ . On a  $a_1 = 1 \leq a$ . Si  $0 \leq a_{n-1} \leq a$ , on a alors

$$a_n = \frac{7}{3} - \frac{1}{1+a_{n-1}} \leq \frac{7}{3} - \frac{1}{1+a} = 2 = a.$$

Montrons que  $(a_n)$  est croissante. On a  $a_0 = 1 < a_1 = \frac{7}{3} - \frac{1}{2}$ . Ici  $a_{n+1} = g(a_n)$  avec  $g(x)$  une fonction croissante. Donc la suite  $(a_n)$  est monotone par les notes du Cours 9 et la méthode d'Exercice 4 ci-dessous. Elle est nécessairement croissante parce que  $a_0 < a_1$ . En étant croissante et majorée, la suite  $(a_n)$  est donc convergente avec limite  $a = 2$ .

#### Exercice 4.

i) On a par définition de la fonction  $g$ ,  $\forall n \geq 1, m < a_n < M$ .

Ainsi,  $\forall n \in \mathbb{N}, a_n > \min(a_0, m)$  et  $\forall n \in \mathbb{N}, a_n < \max(a_0, M)$ .

La suite  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est donc bien bornée.

ii) Nous avons donc  $g$  fonction croissante. Ainsi,  $x \leq y \Leftrightarrow g(x) \leq g(y)$ .

Afin de montrer que  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est monotone, raisonnons par disjonction de cas :

Si  $a_1 \geq a_0$ , alors montrons par récurrence que  $a_{n+1} \geq a_n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

*Initialisation* :  $a_1 \geq a_0$

*Hérédité* : Supposons que  $a_n \geq a_{n-1}$  pour un  $n \in \mathbb{N}^*$ . Alors parce que  $g$  est croissante,  $a_{n+1} = g(a_n) \geq g(a_{n-1}) = a_n$ . Donc  $(a_n)$  est croissante.

Si  $a_1 \leq a_0$ , alors montrons par récurrence que  $a_{n+1} \leq a_n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

*Initialisation* :  $a_1 \leq a_0$

*Hérédité* : Supposons que  $a_n \leq a_{n-1}$  pour un  $n \in \mathbb{N}^*$ . Alors parce que  $g$  est croissante,  $a_{n+1} = g(a_n) \leq g(a_{n-1}) = a_n$ . Donc  $(a_n)$  est décroissante.

iii) Par propriété, toute suite monotone et bornée est convergente.

iv) Si la fonction  $g(x)$  est décroissante, alors la suite définie par la formule  $a_0 \in E$ ,  $a_{n+1} = g(a_n)$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , n'est pas monotone en général. En effet, supposons que  $a_0 \leq a_1$ . Alors puisque  $g$  est décroissante, on obtient  $g(a_0) \geq g(a_1)$ , ce qui donne  $a_1 \geq a_2$ . Supposons maintenant que  $a_0 \geq a_1$ . Alors on a  $g(a_0) \leq g(a_1)$ , ce qui donne  $a_1 \leq a_2$ . Dans les deux cas, la suite obtenue n'est pas monotone sauf si  $a_0 = a_1 = \dots$ .

Par contre, on peut conclure que les deux sous-suites  $(a_{2n})$  et  $(a_{2n+1})$  sont monotones : Nous voulons montrer que les sous-suites  $(a_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$  et  $(a_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$  sont monotones et de croissance opposée (si  $(a_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$  est croissante alors  $(a_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$  est décroissante).

Si la fonction  $g(x)$  est décroissante, alors la fonction  $g \circ g(x) = g(g(x))$  est croissante : pour tout  $x_1 \leq x_2$ , on a  $g(x_1) \geq g(x_2)$  et  $g(g(x_1)) \leq g(g(x_2))$ . Puisque  $a_{n+2} = g \circ g(a_n)$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , on sait d'après ii) que les suites  $(a_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$  et  $(a_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$  sont monotones. Pour démontrer qu'elles sont de croissance opposée, il suffit de constater que la relation d'ordre entre  $a_0$  et  $a_2$ , est opposée à celle entre  $g(a_0) = a_1$  et  $g(a_2) = a_3$ .

v) Posons  $\forall x \in [1, +\infty[$ ,  $g(x) = 7 - \frac{6}{x}$ .

Il est facile à voir que  $g$  est strictement croissante, minorée par 1 et majorée par 7.

D'après iii), nous avons donc que  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est convergente. Sa limite est donc solution de l'équation  $l = 7 - \frac{6}{l}$  et donc de l'équation  $l^2 - 7l + 6 = 0$ . On trouve alors  $l_{1,2} = \frac{7 \pm 5}{2}$ .

De plus,  $a_1 = 4 > a_0$  donc d'après ii),  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est strictement croissante. La solution  $l = 1$  ne convient donc pas. Ainsi,  $l = 6$ .

### Exercice 5.

Supposons que  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge vers un réel  $l$ . Alors  $l$  est solution de l'équation  $l = \sqrt{b+l}$ .

Cela revient à résoudre le trinôme  $l^2 - l - b = 0$  ce qui conduit à  $l_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{1+4b}}{2}$ . Cependant,

l'équation  $l = \sqrt{b+l}$  impose  $l \geq 0$ . Ainsi, on a  $l = \frac{1 + \sqrt{1+4b}}{2}$ .

La fonction  $g(x) = \sqrt{b+x}$  est croissante pour tout  $b > 0$  et  $x > 0$ . De plus, on a  $a_1 = \sqrt{b+1} > 1 = a_0$ . Alors par Exercice 4(ii), la suite  $(a_n)$  est croissante.

Il nous reste à démontrer que la suite  $(a_n)$  est majorée. D'abord, par définition de  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ , nous avons que  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $a_n > 0$ . Ensuite, montrons par récurrence que  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $a_n < l$ .

*Initialisation* :  $a_0 = 1 < \frac{1 + \sqrt{1+4b}}{2}$  car  $b > 0$ .

*Hérédité* : Supposons qu'il existe  $n \in \mathbb{N}$  tel que  $a_n < l$ . Alors

$$a_{n+1} = \sqrt{b + a_n} \stackrel{b=l^2-l}{=} \sqrt{l^2 - l + a_n} < \sqrt{l^2 - l + l} = l.$$

Donc  $(a_n)$  est majorée par  $l = \frac{1+\sqrt{1+4b}}{2}$ . Alors  $(a_n)$  est une suite croissante et majorée, donc convergente, et on a

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{1 + \sqrt{1+4b}}{2}.$$

*Remarque* : Nous pouvons aussi utiliser le résultat de l'Exercice 7 de la Série 5 :

Soient  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  et  $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$  deux suites, et  $0 < b_n < 1$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ . Soit  $l \in \mathbb{R}$  tel que

$$a_{n+1} - l = b_n(a_n - l) \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Alors la suite  $(a_n)$  est convergente.

Ici  $b_n = \frac{a_{n+1} - l}{a_n - l}$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ . Puisque  $a_{n+1} > a_n$  et  $0 < a_n < l$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , on obtient  $0 < b_n < 1$ . Cela démontre que la suite  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est convergente.

### Exercice 6.

Si la limite  $a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$  existe, elle satisfait l'équation

$$a = 1 + \frac{1}{2}a^2 - \frac{1}{2}a \Leftrightarrow a^2 - 3a + 2 = (a - 1)(a - 2) = 0, \quad (1)$$

et donc  $a = 1$  ou  $a = 2$ .

On a

$$a_2 = 1 + \frac{1}{2} \left(\frac{3}{2}\right)^2 - \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} = 1 + \frac{9}{8} - \frac{3}{4} = \frac{11}{8} < \frac{12}{8} = \frac{3}{2} = a_1.$$

Montrons par récurrence que la suite est minorée par 1. On a

$$a_1 = \frac{3}{2} \geq 1,$$

et si  $a_{n-1} \geq 1$ , il suit que

$$a_n = 1 + \frac{1}{2}a_{n-1}^2 - \frac{1}{2}a_{n-1} = 1 + \frac{1}{2}a_{n-1}(a_{n-1} - 1) \geq 1.$$

De plus, la fonction  $g(x) = 1 + \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x$  est croissante pour tout  $x > 1$  : si  $x > y > 1$ , on a  $2(g(x) - g(y)) = x^2 - x - y^2 + y = (x - y)(x + y) - (x - y) = (x - y)(x + y - 1) > 0$ . Alors en remarquant que  $1 < (a_n) \leq \frac{3}{2}$ , par Ex. 4(ii) et (iii) la suite  $(a_n)$  est décroissante et bornée, donc convergente, et sa limite est  $a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$ .

### Exercice 7.

- i) VRAI.  $(|a_n|)_{n \geq 1}$  est clairement minorée par 0 et toute suite décroissante et minorée converge.
- ii) VRAI. On a  $|a_n| \leq |a_1|$  pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ .
- iii) FAUX. Contre-exemple : Prendre  $a_n = (-1)^n \left(1 + \frac{1}{n}\right)$
- iv) FAUX. Contre-exemple : Prendre  $a_n = 1 + \frac{1}{n} = \frac{n+1}{n}$ . Alors  $\frac{1}{a_n} = \frac{n}{n+1}$  qui est convergente et donc bornée.
- v) VRAI. On a  $|a_{n+1}| < |a_n| \Leftrightarrow a_{n+1}^2 < a_n^2$  pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ . Ainsi,  $(a_n^2)_{n \in \mathbb{N}}$  est décroissante. De plus,  $(a_n^2)_{n \in \mathbb{N}}$  est clairement minorée par 0. Toute suite décroissante et minorée converge.
- vi) FAUX. Contre-exemple : Prendre  $a_n = \frac{n+1}{n}$ . Alors  $\frac{1}{a_n} = \frac{n^2}{(n+1)^2}$  qui converge vers 1.
- vii) FAUX. Contre-exemple : Prendre  $a_n = (-1)^n \left(1 + \frac{1}{n}\right)$ . Alors  $|a_{n+1} - a_n| > 2$  pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ .

**Exercice 8.**

i) On a  $a_n = \sin\left(2 + \frac{1}{n+1}\right) = (\sin 3, \sin(2 + \frac{1}{2}), \sin(2 + \frac{1}{3}), \sin(2 + \frac{1}{4}), \dots)$ . Puisque  $\sin(x)$  est décroissante sur  $[2, 3] \subset [\pi/2, \pi]$ , on a  $x_n = \sup\{a_k, k \geq n\} = (\sin(2), \sin(2), \sin(2), \dots)$  et  $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \sin(2)$ . On a aussi  $z_n = \inf\{a_k, k \geq n\} = a_n$  et  $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = \sin(2)$ . Alors la suite est convergente et  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sin(2)$ . On trouve facilement  $\sup\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}} = \sin(2)$  et  $\inf\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}} = \sin(3)$ .

ii) On a  $a_n = \sin\left(2 + \frac{(-1)^n}{2n+1}\right) = (\sin 3, \sin(2 - \frac{1}{3}), \sin(2 + \frac{1}{5}), \sin(2 - \frac{1}{7}), \sin(2 + \frac{1}{9}), \dots)$ . Puisque  $\sin(x)$  est décroissante sur  $[2 - \frac{1}{3}, 3] \subset [\pi/2, \pi]$ , on a

$$\begin{aligned} x_n = \sup\{a_k, k \geq n\} &= (\sin(2 - \frac{1}{3}), \sin(2 - \frac{1}{3}), \sin(2 - \frac{1}{7}), \sin(2 - \frac{1}{7}), \dots) = \\ &= \sin\left(2 - \frac{1}{2(n+1)+(-1)^n}\right), \end{aligned}$$

et  $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \sin(2)$ . On a aussi

$$\begin{aligned} z_n = \inf\{a_k, k \geq n\} &= (\sin 3, \sin(2 + \frac{1}{5}), \sin(2 + \frac{1}{5}), \sin(2 + \frac{1}{9}), \sin(2 + \frac{1}{9}), \dots) = \\ &= \sin\left(2 + \frac{1}{2(n+1)+(-1)^{n+1}}\right), \end{aligned}$$

et  $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = \sin(2)$ . Alors la suite est convergente et  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sin(2)$ . On trouve facilement  $\sup\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}} = \sin(2 - \frac{1}{3})$  et  $\inf\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}} = \sin(3)$ .

iii) On a  $a_n = \cos(\pi n) + \frac{(-1)^n}{n+1} = (2, -1 - \frac{1}{2}, 1 + \frac{1}{3}, -1 - \frac{1}{4}, 1 + \frac{1}{5}, \dots)$ . On obtient

$$\begin{aligned} x_n = \sup\{a_k, k \geq n\} &= (2, 1 + \frac{1}{3}, 1 + \frac{1}{3}, 1 + \frac{1}{5}, 1 + \frac{1}{5}, \dots) = \\ &= 1 + \frac{1}{n + \frac{3+(-1)^{n+1}}{2}}, \end{aligned}$$

et  $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$ . On a aussi

$$\begin{aligned} z_n = \inf\{a_k, k \geq n\} &= (-1 - \frac{1}{2}, -1 - \frac{1}{2}, -1 - \frac{1}{4}, -1 - \frac{1}{4}, \dots) = \\ &= -1 - \frac{1}{n + \frac{3+(-1)^n}{2}}, \end{aligned}$$

et  $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = -1$ . Puisque  $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n \neq \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n$ , la suite diverge. On trouve facilement  $\sup\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}} = 2$  et  $\inf\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}} = -\frac{3}{2}$ .

**Exercice 9.**

i) VRAI. Supposons que  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$  converge vers  $S$ . On a  $a_n = \sum_{n=0}^n a_n - \sum_{n=0}^{n-1} a_n$ .

$$\text{Or, } \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \sum_{n=0}^n a_n - \sum_{n=0}^{n-1} a_n \right) = S - S = 0 \text{ donc } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 = \lim_{n \rightarrow \infty} |a_n|.$$

ii) FAUX. Contre-exemple : Prendre  $a_n = \frac{1}{2(n+1)}$  et  $b_n = \frac{1}{n+1}$ .

iii) FAUX. Contre-exemple : Prendre  $a_n = (-1)^n$ .

iv) VRAI. Remarquons tout d'abord que la suite de sommes partielles est croissante :

$\forall n \in \mathbb{N}, S_{n+1} - S_n = |a_{n+1}| \geq 0$ . De plus,  $(S_n)$  est bornée donc majorée. Toute suite croissante et majorée converge. Donc  $\exists S \in \mathbb{R}_+$  tel que  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^n |a_n| = S$ . Ce qui démontre que  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$  converge absolument.

v) FAUX. Contre-exemple :  $a_n = \frac{1}{2}$ .

vi) FAUX. Contre-exemple :  $a_n = -n$ .

vii) VRAI.  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$  converge absolument.

viii) VRAI. La convergence d'une série ne dépend pas des premiers termes.  $\sum_{n=1}^n a_n$  converge absolument. Donc d'après Q1,  $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = 0$ . Il existe donc  $n_0 \in \mathbb{N}$  tel que  $\forall n \geq n_0$ ,  $|a_n| \leq 1$ . Décomposons notre série :  $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = \sum_{n=1}^{n_0-1} |a_n| + \sum_{n=n_0}^{\infty} |a_n| = A + B$  car la série converge. En remarquant que  $\forall |x| < 1$  on a  $x^2 < |x|$ , nous pouvons écrire que  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 = \sum_{n=1}^{n_0-1} a_n^2 + \sum_{n=n_0}^{\infty} a_n^2 \leq \sum_{n=1}^{n_0-1} a_n^2 + B$ . Le premier terme étant une somme finie,  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$  converge.

ix) FAUX. On a pour tout  $n \geq 2$  que  $\sqrt{n} \leq n$  et donc  $\frac{1}{n} \leq \frac{1}{\sqrt{n}}$ . Comme la série harmonique diverge, on conclut par le critère de comparaison que la série en question diverge aussi.