

# Algèbre linéaire

## Chapitre 3 : Espaces vectoriels

Simone Deparis

EPFL Lausanne – MATH

Semaine 4



## Définition

Soient  $V$  un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel et  $v_1, \dots, v_t \in V$ . Une *combinaison linéaire* de  $v_1, \dots, v_t$  est un vecteur de la forme  $\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_t v_t$ , où  $\lambda_i \in \mathbb{R}$  pour tout  $1 \leq i \leq t$ .

## Définition

Soient  $V$  un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel et  $S \subset V$  une collection non-vidée de vecteurs. On écrit  $\text{Vect}(S)$  pour l'ensemble des combinaisons linéaires des vecteurs de  $S$ , c'est-à-dire

$$\text{Vect}(S) = \{ \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_t v_t : \lambda_i \in \mathbb{R}, v_i \in S \}.$$

## Remarque

D'autres notations sont parfois utilisées pour désigner l'ensemble  $\text{Vect}(S)$ . On rencontrera notamment  $\text{Vect}\{S\}$ ,  $\text{span}(S)$  ou encore  $\text{lin}(S)$ , par exemple.

## Proposition

Soient  $V$  un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel et  $S \subset V$  une famille non-vide. Alors  $\text{Vect}(S)$  est un sous-espace vectoriel de  $V$ . On l'appelle le *sous-espace engendré par  $S$* . Par convention, on notera  $\text{Vect}(\emptyset) = \{0\}$ .

## Question 1

Soit  $V = \mathbb{R}^3$  et

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \subset V, w = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

$w \in \text{Vect}(S)$

- A. Vrai
- B. Faux

## Question 2

Soit  $W$  un espace vectoriel et  $S, T \subset W$ . Qu'est-ce qui est toujours vrai ?

- A. Si  $S \subset \text{Vect}(T)$ , alors  $\text{Vect}(T) \subset \text{Vect}(S)$ .
- B. Si  $S \subset \text{Vect}(T)$ , alors  $\text{Vect}(S) \subset \text{Vect}(T)$ .
- C. Aucun des deux énoncés ci-dessus.

## Question 3

Soit  $W$  un espace vectoriel et  $v, w \in W$ . Qu'est-ce qui est toujours vrai? (Il y a plusieurs options correctes)

- A.  $\text{Vect}(v, w) = \text{Vect}(v + w, w)$ .
- B.  $\text{Vect}(v, w) = \text{Vect}(v + w)$ .
- C.  $\text{Vect}(v, w) = \text{Vect}(\lambda v, w)$  pour tous les  $\lambda \in \mathbb{R}$  tel que  $\lambda \neq 0$ .
- D.  $\text{Vect}(v, w) = \text{Vect}(w, v)$ .

## Définition

Soient  $V$  un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel et  $W_1, W_2 \subset V$  deux sous-espaces vectoriels de  $V$ . La *somme* de  $W_1$  et  $W_2$  est le sous-ensemble de  $V$  défini par

$$W_1 + W_2 = \{u + v : u \in W_1, v \in W_2\}.$$

## Proposition

Soient  $V$  un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel et  $W_1, W_2 \subset V$  deux sous-espaces vectoriels de  $V$ . Alors  $W_1 \cap W_2$  et  $W_1 + W_2$  sont des sous-espaces vectoriels de  $V$ .

## Définition

Soient  $V$  un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel et  $W_1, W_2 \subset V$  des sous-espaces vectoriels de  $V$ . On dit que la somme  $W_1 + W_2$  est *directe* et on écrit  $W_1 + W_2 = W_1 \oplus W_2$  si  $W_1 \cap W_2 = \{0\}$ .

## Question 4

Soit  $V$  un espace vectoriel et  $W_1, W_2 \subset V$  deux sous-espaces vectoriels. Quels sous-ensembles de  $V$  sont toujours des sous-espaces vectoriels? (Il y a plusieurs options correctes)

- A.  $W_1 + W_2$ .
- B.  $W_1 \cap W_2$ .
- C.  $W_1 \cup W_2$ .

### Définition

Soit  $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$  une matrice de taille  $m \times n$  à coefficients réels. On appelle *l'espace ligne de  $A$*  le sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^n$  engendré par les lignes de  $A$ , vues comme des vecteurs de  $\mathbb{R}^n$ . Autrement dit, si  $L_1, \dots, L_m$  sont les lignes de  $A$  (vues comme des vecteurs de  $\mathbb{R}^n$ ), alors l'espace ligne de  $A$  est défini par  $\text{Vect}(\{L_1, \dots, L_m\})$ .

### Définition

Soit  $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$  une matrice de taille  $m \times n$  à coefficients réels. On appelle *l'espace colonne de  $A$*  le sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^m$  engendré par les colonnes de  $A$ , vues comme des vecteurs de  $\mathbb{R}^m$ . Autrement dit, si  $C_1, \dots, C_n$  sont les colonnes de  $A$  (vues comme des vecteurs de  $\mathbb{R}^m$ ), alors l'espace colonne de  $A$  est défini par  $\text{Vect}(\{C_1, \dots, C_n\})$ .

## Question 5

Vrai/faux : Soit  $I_n$  la matrice identité de taille  $n \times n$ . Alors,  $\text{Lgn } I_n = \mathbb{R}^n$ .

- A. Vrai
- B. Faux

## Question 6

Vrai/faux : Soit  $A$  une matrice inversible de taille  $n \times n$ . Alors,  $\text{Lgn } A = \mathbb{R}^n$ .

- A. Vrai
- B. Faux

## Calculs à savoir faire :

- 1 Déterminer si un sous-ensemble d'un espace vectoriel est un sous-espace vectoriel.
- 2 Connaître les exemples principaux d'espaces vectoriels ( $\mathbb{R}^n$ ,  $\mathbb{P}_n(\mathbb{R})$ , l'espace vectoriel des matrices  $m \times n$ ).
- 3 Pour un sous-ensemble  $S$  d'un espace vectoriel  $V$ , déterminer si un vecteur donné de  $V$  est contenu dans  $\text{Vect}(S)$ .
- 4 Déterminer si une somme de sous-espaces vectoriels est directe.

## Question 7

L'ensemble des vecteurs

$$E = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \subset \mathbb{R}^2$$

est linéairement indépendant.

- A. Vrai
- B. Faux

## Question 8

L'ensemble

$$E = \{v_1, v_2, v_3, v_4\} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 6 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \subset \mathbb{R}^3$$

est linéairement indépendant.

- A. Vrai
- B. Faux

## Devoirs pour jeudi :

- Regarder les vidéos 4.2 - 4.6 du MOOC.
- Faire les petits quiz après les vidéos.

# Algèbre linéaire

## Chapitre 4a : Bases et dimension

Simone Deparis

EPFL Lausanne – MATH

Semaine 4



## Calculs à savoir faire :

- 1 Opérations sur les matrices et leurs propriétés (addition, multiplication avec des scalaires, multiplication matricielle, transposition,...).
- 2 Déterminer si une matrice est inversible et (si elle est inversible) calculer son inverse.
- 3 Connaître les matrices élémentaires et leur relation avec les opérations élémentaires sur les lignes et sur les colonnes.

## 3.7 Espace ligne, espace colonne d'une matrice

$$M_{m \times n}(\mathbb{R}) = \{ \text{matrices de taille } m \times n \text{ à coefficients réels} \}$$

### Définition

Soit  $A$   $m \times n$ . On appelle *l'espace ligne de  $A$*  le sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^n$  engendré par les lignes de  $A$ , vues comme des vecteurs de  $\mathbb{R}^n$ .

$\text{Lgn}(A) = \text{Vect}(\{L_1, \dots, L_m\})$ , où  $L_1, \dots, L_m$  sont les lignes de  $A$ .

### Définition

Soit  $A$   $m \times n$ . On appelle *l'espace colonne de  $A$*  le sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^m$  engendré par les colonnes de  $A$ , vues comme des vecteurs de  $\mathbb{R}^m$ .

$\text{Col}(A) = \text{Vect}(\{C_1, \dots, C_n\})$ , où  $C_1, \dots, C_n$  sont les colonnes de  $A$ .

## Question 1

Vrai/faux : Soit  $I_n$  la matrice identité de taille  $n \times n$ . Alors,  $\text{Lgn } I_n = \mathbb{R}^n$ .

- A. Vrai
- B. Faux

## Question 2

Soit  $A$  une matrice  $m \times n$ . Quelles affirmations sont toujours vraies ?

- A.  $\text{Lgn } A = \text{Lgn } A^T$
- B.  $\text{Col } A = \text{Col } A^T$
- C.  $\text{Col } A = \text{Lgn } A^T$ .
- D. Aucune des relations ci-dessus.

## 4.1 Dépendance et indépendance linéaires

Soit  $V$  un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

### Définition

Soit  $S \subset V$ . On dit que  $S$  est *linéairement dépendante* (ou *liée*) s'il existe des vecteurs distincts  $v_1, \dots, v_r \in S$  et des scalaires  $\lambda_1, \dots, \lambda_r \in \mathbb{R}$  non tous nuls tels que  $\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_r v_r = 0$ .


S'il n'existe pas de tels vecteurs dans  $S$ , alors on dit que  $S$  est *linéairement indépendante* (ou *libre*).

**Remarque :** Si  $0 \in S$ , alors  $S$  est liée car  $\lambda \cdot 0 = 0$  pour tout  $\lambda \in \mathbb{R}$ .

## Série 4, Exercice 7

On rappelle que  $\mathbb{P}_3$  est l'espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à 3.

- (a) Les vecteurs de  $\mathbb{P}_3$  suivants sont-ils linéairement indépendants ?
- (i)  $p_1, p_2, p_3$  tels que  $p_1(t) = 1 - t^2$ ,  $p_2(t) = t^2$ ,  $p_3(t) = t$ ,  $t \in \mathbb{R}$ .
  - (ii)  $p_1, p_2, p_3$  tels que  $p_1(t) = 1 + t + t^2$ ,  $p_2(t) = t + t^2$ ,  $p_3(t) = t^2$ ,  $t \in \mathbb{R}$ .
- (b) Les vecteurs  $p_1, p_2, p_3$  de (ii) forment-ils une base de  $\mathbb{P}_3$  ?



## Série 4, Exercice 7, solution

## Question 3

Vrai/faux : L'ensemble

$$E = \{t^2 + t, 1, t + 2\} \subset \mathbb{P}_2$$

engendre l'espace vectoriel  $\mathbb{P}_2$ .

- A. Vrai
- B. Faux

## Question 5

L'ensemble

$$E = \{t^2 + t, 1, t + 2\} \subset \mathbb{P}_2$$

est linéairement indépendant.

- A. Vrai
- B. Faux

## Question 4

L'ensemble des vecteurs

$$E = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \subset \mathbb{R}^2$$

est linéairement indépendant.

- A. Vrai
- B. Faux

## 4.2 Dépendance et indépendance linéaires : propriétés et critères

### Proposition

Soient  $v_1, \dots, v_r \in V$  des vecteurs de  $V$ . Alors ces derniers sont linéairement dépendants si et seulement s'il existe  $1 \leq i \leq r$  tels que  $v_i \in \text{Vect}(\{v_1, \dots, v_{i-1}, v_{i+1}, \dots, v_r\})$ .

### Proposition

Soit  $S \subset V$  un ensemble linéairement indépendant (=une famille libre de vecteurs) dans  $V$ . Alors tout sous-ensemble  $T \subset S$  est aussi linéairement indépendant.

Soit  $S \subset V$  un ensemble linéairement dépendant (=famille liée) dans  $V$ . Alors toute collection de vecteurs  $T$  contenant  $S$  est également linéairement dépendante.

## Question 6

L'ensemble

$$E = \{v_1, v_2, v_3, v_4\} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 6 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \subset \mathbb{R}^3$$

est linéairement indépendant.

- A. Vrai
- B. Faux

## Question 7

Soit  $V$  un espace vectoriel et  $S, T \subset V$  des sous-ensembles finis. Quelles affirmations sont correctes? (plusieurs réponses possibles)

- A. Si  $S$  et  $T$  sont des familles libres, alors  $S \cup T$  est une famille libre.
- B. Si  $S$  et  $T$  sont des familles libres, alors  $S \cap T$  est une famille libre.
- C. Si  $S$  et  $T$  sont des familles liées, alors  $S \cup T$  est une famille liée.
- D. Si  $S$  et  $T$  sont des familles liées, alors  $S \cap T$  est une famille liée.

## Question 8

Vrai ou faux? Soit  $V$  un espace vectoriel et  $v_1, v_2, v_3 \in V$ . Si tous les trois ensembles  $\{v_1, v_2\}$ ,  $\{v_1, v_3\}$  et  $\{v_2, v_3\}$  sont linéairement indépendants, alors  $\{v_1, v_2, v_3\}$  est aussi linéairement indépendant.

- A. Vrai
- B. Faux

## 4.3 Bases et dimension

### Définition

Soit  $\mathcal{B} \subset V$ . On dit que  $\mathcal{B}$  est une *base* de  $V$  si les deux conditions suivantes sont vérifiées.

- Tout  $v \in V$  est une combinaison linéaire de vecteurs de  $\mathcal{B}$ , i.e.  $\text{Vect}(\mathcal{B}) = V$ .
- $\mathcal{B}$  est linéairement indépendant.

### Définition

On dit d'un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel  $V$  qu'il est *de dimension finie* s'il possède une base finie. Sinon, on dit que  $V$  est *de dimension infinie*.

### Théorème

Soit  $V$  un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie. Alors toutes les bases de  $V$  sont finies et possèdent le même nombre d'éléments.

## Question 9

Une base de  $\mathbb{P}_d$  est donnée par

A.  $\{t, t^2, \dots, t^d\}$

B.  $\{1, t, t^2, \dots, t^d\}$

C.  $\{1, 1 + t, 1 + t + t^2, \dots, 1 + t + \dots + t^d\}$

(plusieurs réponses correctes).

## 4.4 Dimension

### Définition

Soit  $V$  un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie. Le nombre d'éléments dans une base s'appelle la *dimension* de  $V$  et on le désigne par  $\dim V < \infty$ . Autrement  $\dim V = \infty$ .

### Proposition

Soit  $\dim V < \infty$ . Alors les deux affirmations suivantes sont vérifiées.

- Si  $\{v_1, \dots, v_r\}$  est un ensemble générateur de  $V$ , alors il existe une base  $\mathcal{B}$  de  $V$  telle que  $\mathcal{B} \subset \{v_1, \dots, v_r\}$ . On parle d'*extraction de base*.
- Si  $\{v_1, \dots, v_r\}$  est une partie libre de  $V$ , alors il existe une base  $\mathcal{B}$  de  $V$  telle que  $\{v_1, \dots, v_r\} \subset \mathcal{B}$ . On parle de *complétion en une base*.

## Question 10

Soit

$$E = \left\{ \begin{pmatrix} 9 \\ 9 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 12 \\ 12 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \subset \mathbb{R}^3.$$

Alors

- A.  $\dim \text{Vect}(E) = 3$
- B.  $\dim \text{Vect}(E) = 2$
- C.  $\dim \text{Vect}(E) = 1$
- D.  $\dim \text{Vect}(E) = 0$

## 4.5 Bases dans un espace de dimension connue

### Théorème

Soit  $\dim V < \infty$ . Alors les deux affirmations suivantes sont vérifiées.

- Si  $S \subset V$  est une famille génératrice qui possède  $n$  éléments, alors  $S$  est une base de  $V$ .
- Si  $S' \subset V$  est une famille libre qui possède  $n$  éléments, alors  $S'$  est une base de  $V$ .

## 4.6 Systèmes homogènes et base de l'espace des solutions

Soient  $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$  et  $X = (x_1 x_2 \cdots x_n)^T$ , où  $x_1, \dots, x_n$  sont des inconnues. Alors l'ensemble des solutions du système linéaire  $AX = 0$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^n$ .

### Proposition

Soient  $A$  et  $X$  comme ci-dessus. Alors la dimension de l'espace des solutions du système  $AX = 0$  est égale au nombre de variable(s) libre(s) dans une forme échelonnée de  $A$ .

### Proposition

Soient  $A$  et  $X$  comme ci-dessus. Pour trouver une base de l'espace des solutions du système  $AX = 0$ , on pose successivement une des variables libre égale à 1 et toutes les autres égales à 0.

## Série 4, Exercice 8

Soit  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ .

- Déterminer le rang de  $A$  et la dimension du noyau de  $A$ .
- Même question pour  $A^T$ .
- On suppose qu'une matrice  $A$  de taille  $7 \times 7$  possède un pivot dans chaque ligne. Quel est le rang de  $A$ ? Quelle est la dimension du noyau de  $A$ ?
- On considère une matrice  $A$  de taille  $m \times n$  et un vecteur  $\vec{b} \in \mathbb{R}^m$ . Quelle doit être la relation entre le rang de  $[A \ \vec{b}]$  et le rang de  $A$  pour que l'équation  $A\vec{x} = \vec{b}$  soit compatible?



## Série 4, Exercice 8, solution

## Chapitre 4a, Concepts importants

- Espace vectoriel,
- $\text{Vect}(E)$ ,
- linéairement dépendant et indépendant,
- base et dimension
- coordonnées
- 

Sur la page Moodle il y a des liens vers des vidéos complémentaires de 3Blue1Brown

## Devoirs pour mardi :

- Regarder les vidéos 4.7 et 4.9 - 4.12 du MOOC.
- Faire les petits quiz après les vidéos.
- MOOC 4.7.1 : faire quelques exercices en ligne (au moins un par sous-section).