



Ens: S. Deparis

Algèbre linéaire - (n/a)













20 novembre 2025

Durée: 60 minutes

CATALOGUE

Attendez le début de l'épreuve avant de tourner la page. Ce document est imprimé recto-verso, il contient 4 pages, les dernières pouvant être vides. Ne pas dégrafer.

- Posez votre carte d'étudiant sur la table.
- **Aucun** document n'est autorisé.
- L'utilisation d'une **calculatrice** et de tout outil électronique est interdite pendant l'épreuve.
- Pour les questions à **choix multiple**, on comptera :
 - +3 points si la réponse est correcte,
 - 0 point si il n'y a aucune ou plus d'une réponse inscrite,
 - 1 point si la réponse est incorrecte.
- Pour les questions de type **vrai-faux**, on comptera :
 - +1 point si la réponse est correcte,
 - 0 point si il n'y a aucune ou plus d'une réponse inscrite,
 - 1 point si la réponse est incorrecte.
- Utilisez un **stylo** à encre **noire ou bleu foncé** et effacez proprement avec du **correcteur blanc** si nécessaire.
- Si une question est erronée, l'enseignant se réserve le droit de l'annuler.

Respectez les consignes suivantes Read these guidelines Beachten Sie bitte die unten stehenden Richtlinien		
choisir une réponse select an answer Antwort auswählen	ne PAS choisir une réponse NOT select an answer NICHT Antwort auswählen	Corriger une réponse Correct an answer Antwort korrigieren
  		 
ce qu'il ne faut PAS faire what should NOT be done was man NICHT tun sollte		
     		

CATALOGUE

Notations

- Pour une matrice A , a_{ij} désigne l'élément situé sur la ligne i et la colonne j de la matrice.
- Pour un vecteur $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$, x_i désigne la i -ème composante de \vec{x} .
- I_m désigne la matrice identité de taille $m \times m$.
- $\mathbb{P}_n(\mathbb{R})$ désigne l'espace vectoriel des polynômes réels de degré inférieur ou égal à n .
- $\mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ désigne l'espace vectoriel des matrices de taille $m \times n$ à coefficients réels.

Première partie, questions à choix multiple

Pour chaque question marquer la case correspondant à la réponse correcte sans faire de ratures. Il n'y a qu'une seule réponse correcte par question.

[SCQ-01-2024]

Question 1 : Le système d'équations linéaires

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 = 3 \\ x_2 - 2x_3 + 2x_4 = 2 \\ 4x_1 + 3x_2 + 4x_3 - 3x_4 = 1 \\ 5x_1 + 3x_2 + 3x_3 - x_4 = 0 \end{cases}$$

possède une solution unique telle que

- $x_4 = -2$.
 $x_4 = \frac{1}{2}$.
 $x_4 = 1$.
 $x_4 = -\frac{5}{2}$.

[SCQ-02-2024]

Question 2 : Soit a un nombre réel. Le système d'équations linéaires

$$\begin{cases} ax_1 + x_3 = 1 \\ ax_2 + x_4 = 0 \\ x_1 + ax_3 = 1 \\ x_2 + ax_4 = 1 \\ x_1 + x_3 = a \end{cases}$$

possède exactement une solution si et seulement si

- $a \in \{-2, 1\}$.
 $a = -2$.
 $a \in \{-1, 1, -2\}$.
 $a \in \{-1, 1\}$.

[SCQ-03-2024]

Question 3 : Soit

$$A = \begin{pmatrix} \pi & 1 & 3 & 1 \\ 2\pi & 1 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Alors l'inverse $B = A^{-1}$ de la matrice A est tel que

- $b_{22} = 1$.
 $b_{23} = 5$.
 $b_{24} = 3$.
 $b_{21} = 7$.

[SCQ-04-2024]

Question 4 : Soit $\alpha \in \mathbb{R}$ et $B \in \mathcal{M}_{4 \times 4}(\mathbb{R})$ définie par

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \alpha & 0 \\ 1 & 1 & 0 & \alpha \\ \alpha & 0 & 1 & 1 \\ 0 & \alpha & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Alors

- $\det(B) = \alpha(\alpha + 1)(\alpha^2 - 4)$.
 $\det(B) = \alpha(\alpha + 2)(\alpha - 1)^2$.
 $\det(B) = \alpha^2(\alpha - 1)^2$.
 $\det(B) = \alpha^2(\alpha^2 - 4)$.

[SCQ-05-2024]

Question 5 : Soit $\vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$ et soit $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'application linéaire définie par

$$T \left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} x - y - 5z \\ -2x + y + 7z \\ x - 2z \end{pmatrix}.$$

Alors

- le vecteur \vec{v} est dans $\text{Im}(T)$ et dans $\text{Ker}(T)$.
 le vecteur \vec{v} n'est ni dans $\text{Ker}(T)$, ni dans $\text{Im}(T)$.
 le vecteur \vec{v} est dans $\text{Ker}(T)$, mais pas dans $\text{Im}(T)$.
 le vecteur \vec{v} est dans $\text{Im}(T)$, mais pas dans $\text{Ker}(T)$.

[SCQ-06-2024]

Question 6 : Soit W l'espace vectoriel des matrices symétriques de taille 2×2 . La deuxième coordonnée de la matrice $\begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \in W$ dans la base ordonnée $\left\{ \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \right\}$ de W est

1. $\frac{1}{4}$. -2. $-\frac{3}{4}$.

[SCQ-07-2024]

Question 7 : Soit $\mathcal{B} = \{\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3\}$ une base ordonnée de \mathbb{R}^3 et soit $\mathcal{C} = \{\vec{c}_1, \vec{c}_2, \vec{c}_3\}$ la base ordonnée de \mathbb{R}^3 formée des vecteurs

$$\vec{c}_1 = \vec{b}_1 - \vec{b}_2, \quad \vec{c}_2 = \vec{b}_1 - \vec{b}_3 \quad \text{et} \quad \vec{c}_3 = \vec{b}_1 + \vec{b}_2 + \vec{b}_3.$$

Soit P la matrice de changement de base telle que $[\vec{v}]_{\mathcal{C}} = P[\vec{v}]_{\mathcal{B}}$ pour tout $\vec{v} \in \mathbb{R}^3$. Alors

- $p_{23} = 2$. $p_{23} = 1$. $p_{23} = -\frac{2}{3}$. $p_{23} = 0$.

[SCQ-08-2024]

Question 8 : Soit $T: \mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{P}_2(\mathbb{R})$ l'application linéaire définie par

$$T \left(\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \right) = b_{12} - (b_{11} + b_{22})t + b_{21}t^2.$$

Soient

$$\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 5 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{pmatrix} \right\} \quad \text{et} \quad \mathcal{C} = \{1, 1 + t^2, t + t^2\}$$

des bases ordonnées de $\mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ et $\mathbb{P}_2(\mathbb{R})$ respectivement. La matrice A associée à T par rapport à la base \mathcal{B} de $\mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ et la base \mathcal{C} de $\mathbb{P}_2(\mathbb{R})$, telle que $[T(B)]_{\mathcal{C}} = A[B]_{\mathcal{B}}$ pour tout $B \in \mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$, satisfait

- $a_{12} = -6$. $a_{12} = 3$. $a_{12} = 2$. $a_{12} = -4$.

CATALOGUE

Deuxième partie, questions de type Vrai ou Faux

Pour chaque question, marquer (sans faire de ratures) la case VRAI si l'affirmation est **toujours vraie** ou la case FAUX si elle **n'est pas toujours vraie** (c'est-à-dire si elle est parfois fausse).

[TF-01-2024]

Question 9: Soient A une matrice de taille $m \times n$ et B une matrice de taille $n \times m$. Si AB est inversible, alors A et B sont inversibles.

VRAI FAUX

[TF-02-2024]

Question 10: Soient A et B deux matrices de taille 3×3 . Si $\det(A) = 2$, alors

$$\det(BA^{-1}B) = \frac{1}{2} \det(B)^2.$$

VRAI FAUX

[TF-03-2024]

Question 11: Soit V un espace vectoriel et soient v_1, v_2, v_3 trois vecteurs de V . Si l'ensemble $\{v_1, v_2, v_3\}$ est linéairement indépendant, alors l'ensemble $\{v_1 - v_2, v_1 - v_3, v_2 - v_3\}$ est linéairement indépendant.

VRAI FAUX

[TF-04-2024]

Question 12: L'ensemble

$$\{p \in \mathbb{P}_n(\mathbb{R}) \mid p(1)p(2) = 0\}$$

est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{P}_n(\mathbb{R})$.

VRAI FAUX

[TF-05-2024]

Question 13: Le nombre de lignes non nulles dans la forme échelonnée réduite d'une matrice est égal à son rang.

VRAI FAUX

[TF-06-2024]

Question 14: Si A est une matrice de taille $m \times n$ telle que $\text{Col}(A) = \mathbb{R}^m$, alors pour tout choix de $\vec{b} \in \mathbb{R}^m$, le système $A\vec{x} = \vec{b}$ possède une solution unique.

VRAI FAUX

[TF-07-2024]

Question 15: Soit V un espace vectoriel et soit $T: V \rightarrow \mathbb{R}$ une application linéaire. Si $v_1, v_2, v_3 \in V$ sont tels que

$$T(v_1) = 2, \quad T(v_2) = 3 \quad \text{et} \quad T(v_3) = 1,$$

alors $v_1 - v_2 + v_3$ est dans $\text{Ker}(T)$.

VRAI FAUX

[TF-08-2024]

Question 16: Soient V et W deux espaces vectoriels et soient $T, S: V \rightarrow W$ deux applications linéaires. Si $\text{Ker}(T) = \text{Ker}(S)$, alors $\text{Im}(T) = \text{Im}(S)$.

VRAI FAUX