

Section d'architecture SAR - Bachelor semestre 1

Fonctions et polynômes

Philippe Chabloz

Fonctions réelles d'une variable réelle

Fonction provient du latin *functio*, qui signifie accomplissement, exécution. Ce terme apparaît au XVIIe siècle sous la plume de Jean Bernoulli dans une lettre à son ami Gottfried Leibnitz.

Définition : Soient A et B deux ensembles. Une *fonction* de A à B attribue à chaque élément de A exactement un élément de B . Nous utiliserons la notation :

$$\begin{aligned} f: A &\rightarrow B \\ x &\mapsto f(x) \end{aligned}$$

L'ensemble A est appelé *domaine de la fonction* et l'ensemble B est appelé *codomaine de la fonction*.

Soit $b = f(a)$. Alors
 b est appelé *l'image de a par f*
 a est la *pré-image de b par f*

Expressions de la fonction


$$\begin{aligned} f: A &\rightarrow B \\ x &\mapsto 0,9x \end{aligned}$$

ou $f(x) = 0,9x$


Tableau de valeurs

x	$f(x)$
0	0
1	0,9
2	1,8
3	2,7

Diagramme sagittal



Le graphique



Fonctions réelles d'une variable réelle

Soit f une fonction de domaine A et de codomaine B

$$f: A \rightarrow B$$


$$x \mapsto f(x)$$

Définitions :

On dit que f est *injective* si tout élément b de B a au plus une pré-image

On dit que f est *surjective* si tout élément b de B a au moins une pré-image

Si f est *injective et surjective*, on dit qu'elle est *bijective*.




Fonctions du premier degré

Fonctions constantes

$$f(x) = c \text{ où } c \in \mathbb{R}$$


Le graphe représentatif est une droite horizontale.



Fonctions linéaires

$$f(x) = ax \text{ où } a \in \mathbb{R}^*$$


Le graphe représentatif est une droite qui passe par l'origine.



Fonctions affines

$$f(x) = ax + b \text{ où } a, b \in \mathbb{R}^*$$

Le graphe représentatif est une droite qui ne passe pas par l'origine.



Équation du premier degré

Soient $a, b \in \mathbb{R}$. L'expression

$$P(x) = ax + b$$

s'appelle un **polynôme** en x :

- ❖ de degré 0 si $a = 0$
- ❖ de degré 1 si $a \neq 0$


L'équation du premier degré associée est :

$$ax + b = 0.$$

Soit $a \neq 0$, alors l'équation admet comme solution

$$x = -\frac{b}{a}$$

Géométriquement, cette solution est représentée par le point d'intersection de la droite représentée par la fonction affine $f(x) = ax + b$ avec l'axe des abscisses (Ox).




Fonctions du second degré

- ❖ Soient $a, b, c \in \mathbb{R}$ avec $a \neq 0$, la fonction

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

s'appelle **fonction quadratique** ou fonctions polynomiales du second degré.

- ❖ Le nombre $\Delta = b^2 - 4ac$ est appelé *discriminant*.
- ❖ La représentation graphique d'une fonction du second degré est une parabole.



Équation du second degré

Formule de Viète

Si $\Delta = b^2 - 4ac \geq 0$ alors les solutions de l'équation
 $ax^2 + bx + c = 0$

sont données par : $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$



François Viète
1540-1603

Exemple :

On cherche à construire un champ rectangulaire de surface $12m^2$ et dont la longueur excède de 3 mètres la largeur.

On pose : $x = \text{largeur du champ}$ et donc $x + 3 = \text{longueur du champ}$. Alors

$$\begin{aligned} x(x + 3) &= 12 \\ x^2 + 3x - 12 &= 0 \end{aligned}$$

$$x_{1,2} = \frac{-3 \pm \sqrt{9+48}}{2} = \frac{-3 \pm \sqrt{57}}{2}$$

On obtient deux solutions, une positive l'autre négative. Ainsi $x \approx 2.27m$.

Solutions complexes

Si le *discriminant* est négatif, il n'y a pas de solutions car la racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas !! Quoique

Cela n'existe pas dans les nombres réels. Mais on peut introduire les nombres complexes. On définit

- ❖ le **nombre imaginaire** i par la propriété

$$i^2 = -1$$

- ❖ l'**ensemble des nombres complexes** comme tous les nombres de la forme

$$z = a + bi$$

avec a et b réels. Le nombre réel a est la partie réelle de z et le nombre réel b sa partie imaginaire.

Exemples :

$$z = \sqrt{2} + \pi \cdot i$$

$$z = 2i \text{ avec } z^2 = -4$$

$$z = \frac{-1 + \sqrt{3} \cdot i}{2} \text{ avec } z^3 = 1$$

L'effervescence intellectuelle du XVIe siècle

$$ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$$


« L'équation cubique est impossible à résoudre comme l'est la quadrature du cercle »

Luca Pacioli - *Summa de arithmetica, geometria, de proportioni et de proportionalita* - 1494

Scipione del Ferro résout, vers 1515, les équations du type

$$x^3 + px + q = 0$$

où p est une constante positive et q une constante négative. Sa méthode a été améliorée par Jérôme Cardan quelques décennies plus tard.



Luca Pacioli
1445 - 1517

Sur l'équation cubique

Nous souhaitons résoudre une équation cubique :

$$ax^3 + bx^2 + cx + d = 0, \quad \text{où } a, b, c, d \in \mathbb{R}.$$

La première étape consiste à la simplifier en la divisant par a et en introduisant z :

$$x = z - \frac{b}{3a}$$

pour obtenir l'équation sous la *forme réduite* suivante :

$$z^3 + pz + q = 0$$

où les coefficients p et q dépendent de a, b, c, d .



Jérôme Cardan
1501-1576

En 1547, *Cardan* a établi e qu'une solution de l'équation

$$x^3 + px + q = 0$$

où p et q sont deux constantes. La solution est donnée par la formule

$$x = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{\Delta}} + \sqrt[3]{-\frac{q}{2} - \sqrt{\Delta}}$$

où $\Delta = \left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3$.

Combien de solutions ?

Soit l'équation réduite

$$x^3 + px + q = 0$$

et $\Delta = \left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3$ le discriminant. Alors

1. si $\Delta > 0$ alors l'équation admet trois racines distinctes, dont une réelle et deux complexes conjuguées ;
2. si $\Delta = 0$ alors l'équation admet une racine double ou triple et toutes ses racines sont réelles ;
3. si $\Delta < 0$ alors l'équation admet trois racines réelles distinctes.

Remarque : historiquement, les nombres complexes ont été introduits pour être utilisés momentanément pour résoudre des problèmes réels.

« On fait apparaître ce qui nous manque puis on le fait disparaître pour retrouver l'équilibre »

Cadran.

Démonstration par récurrence

On souhaite démontrer une propriété

$$P(n)$$

Pour tout nombre entier positif $n \geq 0$.

La démonstration par récurrence se fait en 2 étapes:

1. On démontre que P est vraie pour $n = 0$
2. On démontre que **si P est vraie pour n (hypothèse de récurrence) alors P est vraie pour $n+1$.**

Alors P est vraie pour tout entier n