

## THÉORIE DES GROUPES 2024 - 25, SÉRIE 5

**Exercice 1.** *À faire après chaque cours!*

Revoir le cours et comprendre/remplir les lacunes dans les démonstrations.

**Exercice 2.** *Quelques exemples de sous-groupes de torsion (facile)*

Déterminer  $\text{Tors}(A)$  pour les exemples suivants de groupes abéliens.

- (1)  $A$  est un groupe abélien fini.
- (2)  $A = (\mathbb{Q}, +)$ .
- (3)  $A = (\mathbb{Q}/\mathbb{Z})$ .
- (4)  $A = \mathbb{C}^\times$ .
- (5)  $A$  est un sous-groupe de  $\mathbb{Z}$ .
- (6)  $A$  est un sous-groupe de  $\mathbb{Z}^k$  pour  $k \geq 2$ .

**Exercice 3.** (moyen)

Montrer que si  $G$  est abélien et finiment engendré tel que  $\text{Tors}(G) = G$ , alors  $G$  est un groupe fini.

**Exercice 4.** *Groupes abéliens libres (facile)*

Étant donnée une famille de groupes abéliens  $(A_i)_{i \in I}$ , nous définissons leur somme directe comme le groupe abélien

$$\bigoplus_{i \in I} A_i = \{(a_i)_{i \in I} \mid a_i \in A_i, \text{ pour tout } i, \text{ seuls un nombre fini des } a_i \text{ sont non-nuls}\}$$

où l'addition est effectuée composante par composante.

Prouvez que les affirmations suivantes sont équivalentes pour un groupe abélien  $A$  :

- (1)  $A$  est un groupe abélien libre. C'est-à-dire

$$A \cong \mathbb{Z}^{\oplus I} := \bigoplus_{i \in I} \mathbb{Z}.$$

Pour un certain ensemble d'indexation  $I$  (pas nécessairement fini).

- (2) Il existe un ensemble  $I$  et un sous-ensemble  $B = \{a_i \mid i \in I\} \subset A$  appelé une **base**, tel que tous les éléments  $x \in A$  peuvent être écrits de manière unique comme des sommes finies

$$x = \sum_{k \in I} n_k a_k$$

où tous sauf un nombre fini de  $n_k$  sont égaux à 0. Notez que la condition d'unicité implique que les éléments d'une base sont linéairement indépendants sur  $\mathbb{Z}$ .

**Exercice 5.** (moyen)

Soit  $F = \mathbb{Z}^3$  et définissez une fonction  $f : F \rightarrow \mathbb{Z}^2$  sur une base  $(e_1, e_2, e_3)$  par

$$f(e_1) = (1, 0); \quad f(e_2) = (1, 1), \quad f(e_3) = (0, -1).$$

Montrez que vous pouvez prolonger  $f$  uniquement en un homomorphisme de groupes. L'image de  $f$  est-elle libre abélienne ?

**Exercice 6.** (moyen)

Rappelez-vous que le rang d'un groupe abélien libre finiment engendré  $A$  est l'entier positif  $r$  tel que

$$A \cong \mathbb{Z}^r.$$

Rappelez-vous aussi qu'il a été montré en classe que si  $A \subseteq \mathbb{Z}^r$  est un sous-groupe, alors  $A \cong \mathbb{Z}^k$  pour un certain  $k \leq r$ . Nous verrons aussi dans le prochain exercice que le rang d'un groupe libre-abélien est bien défini.

Calculez le rang des groupes abéliens libres suivants.

- (1) Sous-groupe engendré par  $(1, 1)$  dans  $\mathbb{Z}^2$ .
- (2) Sous-groupe engendré par  $(1, 2)$  et  $(-3, -6)$  dans  $\mathbb{Z}^2$ .
- (3)  $\{a + b\sqrt{2} + c\sqrt{3} \mid a, b, c \in \mathbb{Z}\}$  en tant que sous-groupe additif de  $\mathbb{R}$ .
- (4) Sous-groupe engendré par  $(2, 3, 8)$ ,  $(1, 5, 1)$  et  $(1, -9, 34)$  dans  $\mathbb{Z}^3$ .
- (5) Sous-groupe engendré par  $(2, 3, 8)$ ,  $(1, 5, 1)$  et  $(1, -9, 13)$  dans  $\mathbb{Z}^3$ .

**Exercice 7.** (moyen)

Montrer que les rationnels positifs  $\mathbb{Q}^{>0}$  avec loi de groupe donnée par la multiplication habituelle ne forment pas un groupe abélien finiment engendré. Cependant, montrez qu'il s'agit d'un groupe abélien libre en exhibant une base.

**Exercice 8.** (moyen)

Notez qu'un homomorphisme  $A \rightarrow B$  de groupes abéliens induit une application

$$\text{Tors}(A) \rightarrow \text{Tors}(B).$$

Maintenant, considérez la suite exacte courte de groupes abéliens

$$0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0.$$

Déterminez si

$$0 \rightarrow \text{Tors}(A) \rightarrow \text{Tors}(B) \rightarrow \text{Tors}(C) \rightarrow 0$$

est également exacte en général.