

## THÉORIE DES GROUPES 2024 - 25, SOLUTIONS 3

**Exercice 1.** *Sous-groupes normaux et quotients de groupes*  
Voir les notes de cours Structures algébriques.

**Exercice 2.** *Premier théorème d'isomorphisme*  
Voir les notes de cours Structures algébriques.

**Exercice 3.** *Théorème de correspondance et troisième théorème d'isomorphisme*  
Voir les notes de cours Structures algébriques.

**Exercice 4.** *Deuxième théorème d'isomorphisme*  
Voir les notes de cours Structures algébriques.

**Exercice 5.** *Équivalence des définitions des actions de groupe : Très important ! À retenir et utiliser en pratique !*

Nous construisons une application

$$f : \{ \Phi : G \rightarrow \text{Bij}(X) \mid \Phi \text{ est une action} \} \cong \{ \cdot : G \times X \rightarrow X \mid (1) \ \& \ (2) \text{ tiennent} \}$$

donnée par

$$f : \Phi \mapsto \cdot_{\Phi}$$

où  $\cdot_{\Phi} : G \times X \rightarrow X$  est donnée par  $g \cdot_{\Phi} x = \Phi(g)(x)$ . Vérifions que cette application est bien définie, c'est-à-dire que  $\cdot_{\Phi}$  satisfait (1) et (2) :

- (1)  $e_G \cdot_{\Phi} x = \Phi(e_G)(x) = x$ , pour tout  $x \in X$ , par le fait que  $\Phi$  est une action.
- (2)  $g \cdot_{\Phi} (h \cdot_{\Phi} x) = g \cdot_{\Phi} \Phi(h)(x) = \Phi(g)(\Phi(h)(x)) = \Phi(gh)(x) = (gh) \cdot_{\Phi} x$ , pour tous  $g, h \in G$  et  $x \in X$ , encore une fois parce que  $\Phi$  est une action.

De la même manière, nous construisons maintenant une application dans l'autre sens

$$g : \{ \cdot : G \times X \rightarrow X \mid (1) \ \& \ (2) \text{ tiennent} \} \cong \{ \Phi : G \rightarrow \text{Bij}(X) \mid \Phi \text{ est une action} \}$$

donnée par

$$\cdot \mapsto \Phi.$$

où  $\Phi : G \rightarrow \text{Bij}(X)$  est donnée par  $\Phi.(g)(x) = g \cdot x$ . Vérifions que cette application est bien définie, c'est-à-dire que  $\Phi.$  est une action. D'après les notes de cours, il suffit de prouver la multiplicativité et que chaque  $\Phi.(g) : X \rightarrow X$  est une bijection :

- (1) La multiplicativité découle de celle de  $\cdot$  :  $\Phi.(gh)(x) = (gh) \cdot x = g \cdot (h \cdot x) = \Phi.(g)(\Phi.(h)(x))$  pour tous  $g, h \in G$  et  $x \in X$ , donc  $\Phi.(gh) = \Phi.(g) \circ \Phi.(h)$ .

- (2) Montrons que pour tout  $g \in G$ ,  $\Phi.(g)$  est une bijection. Pour la surjectivité, prenons  $x \in X$  arbitrairement. Alors  $\Phi.(g)(g^{-1} \cdot x) = g \cdot (g^{-1} \cdot x) = (g \cdot g^{-1}) \cdot x = e_G \cdot x = x$ . Pour l'injectivité, prenons  $x, y \in X$  avec  $g \cdot x = \Phi.(g)(x) = \Phi.(g)(y) = g \cdot y$ . En prenant  $g^{-1} \cdot (g \cdot x) = g^{-1} \cdot (g \cdot y)$ , on obtient  $x = y$ .

Il est facile de vérifier que  $f \circ g$  et  $g \circ f$  sont les identités sur les ensembles respectifs, nous avons donc la bijection désirée.

**Exercice 6.** Soit  $g \in G$ , il est clair que si  $g \in H$  alors  $gHg^{-1} = H$ . Si  $g \notin H$ , alors puisque l'indice de  $H$  dans  $G$  est deux, nous avons que

$$G/H = \{H, gH\} \text{ et } H \backslash G = \{H, Hg\}.$$

Cela implique que  $gH = Hg$  en tant qu'ensembles. Il en découle que  $gHg^{-1} = H$ .

**Exercice 7.** *Quelques propriétés des classes utiles en pratique*

- (1) Nous avons les équivalences suivantes

$$\begin{aligned} gH = g'H &\iff \exists h \in H \text{ tel que } g' = gh \\ &\iff \exists h \in H \text{ tel que } g^{-1}g' = h \\ &\iff g^{-1}g' \in H. \end{aligned}$$

- (2) Vous avez montré en cours que les classes forment une partition de  $G$ , elles doivent donc coïncider ou être disjointes.
- (3) Supposons que  $gH \cap g'K \neq \emptyset$ . Cela signifie qu'il existe un élément  $x \in G$  tel que  $x \in gH$  et  $x \in g'K$ . Ainsi, nous avons

$$x = gh_1 = g'k_1$$

pour certains  $h_1 \in H$  et  $k_1 \in K$ . En réarrangeant cette équation, nous obtenons

$$g^{-1}g' = h_1k_1^{-1}. \tag{1}$$

Nous allons montrer par double inclusion que  $gH \cap g'K = gh_1(H \cap K)$ . Supposons d'abord que  $y \in gH \cap g'K$ . Nous pouvons écrire

$$y = gh_2 = g'k_2$$

pour certains  $h_2 \in H$  et  $k_2 \in K$ . En réarrangeant l'équation et en utilisant (1), nous obtenons

$$h_2 = g^{-1}g'k_2 = (h_1k_1^{-1})k_2.$$

De là, nous pouvons déduire que  $h_1^{-1}h_2 = k_1^{-1}k_2 \in K \cap H$ . Ainsi, nous pouvons écrire

$$y = gh_2 = gh_1(k_1^{-1}k_2) \in gh_1(K \cap H).$$

Cela prouve la première inclusion. La deuxième inclusion est directe.

**Exercice 8.** Pour prouver que l'action  $\Phi : G \rightarrow \text{Bij}(G/H)$  donnée par  $\Phi_g(aH) = gaH$  n'est pas fidèle, nous devons trouver  $g \neq g' \in G$  tels que  $\Phi_g = \Phi_{g'}$ . Comme  $H$  a au moins deux éléments, prenons  $g$  et  $g'$  comme étant deux éléments différents de  $H$ . Montrons que  $\Phi_g(aH) = \Phi_{g'}(aH)$ , pour tout  $a \in G$ . Observons que  $\Phi_g(aH) = \Phi_{g'}(aH) \iff gaH = g'aH \iff a^{-1}g'^{-1}ga \in H$ , mais cela est vrai pour tout  $a \in G$ , car  $g'^{-1}g \in H$  par construction et  $H$  est normal.

**Exercice 9.** (1) Soit  $\varphi : X \rightarrow Y$  un isomorphisme de  $G$ -ensembles. Supposons que  $X$  soit transitif. Soient  $y_1, y_2 \in Y$ . Comme  $\varphi$  est une bijection, il existe  $x_1, x_2 \in X$  tels que  $\varphi(x_1) = y_1$  et  $\varphi(x_2) = y_2$ . Comme  $X$  est transitif, il existe  $g \in G$  tel que  $g \cdot x_1 = x_2$ . En appliquant l'isomorphisme  $\varphi$  des deux côtés, on obtient

$$g \cdot y_1 = g \cdot \varphi(x_1) = \varphi(g \cdot x_1) = \varphi(x_2) = y_2.$$

Ainsi,  $Y$  est transitif. Si  $Y$  est transitif, montrez que  $\varphi^{-1} : Y \rightarrow X$  est un morphisme de  $G$ -ensembles et appliquez le même raisonnement à  $\varphi^{-1}$  pour montrer que  $X$  est transitif.

(2) Immédiat.

(3) Nous construisons une fonction

$$\begin{aligned} \{\text{Classes de conjugaison de sous-groupes } H \leq G\} &\rightarrow \mathcal{X} / \sim \\ [H] &\mapsto [G/H] \end{aligned}$$

où  $G/H$  est muni de l'action habituelle de  $G$ . Cette action est clairement transitive. De plus, cette application est bien définie car si  $[H] = [H']$ , c'est-à-dire que  $H$  et  $H'$  sont conjugués, alors les deux  $G$ -ensembles  $G/H$  et  $G/H'$  sont isomorphes d'après l'exercice 3 de la semaine 2. Par conséquent, ils appartiennent à la même classe d'isomorphisme et définissent ainsi le même élément  $[G/H] = [G/H']$  de  $\mathcal{X} / \sim$ .

Nous montrons que cette fonction est bijective. Elle est injective car si  $H$  et  $H'$  sont des sous-groupes tels que  $G/H$  et  $G/H'$  sont isomorphes en tant que  $G$ -ensembles, alors  $H$  et  $H'$  sont conjugués d'après l'exercice 3 de la semaine 2.

Pour montrer qu'elle est surjective, soit  $G \curvearrowright X$  un  $G$ -ensemble transitif. Choisissez un point  $x \in X$  et considérez son stabilisateur  $H = \text{Stab}_G(x)$ . Par le théorème orbite-stabilisateur, il existe une bijection entre  $X$  et  $G/H$  donnée par

$$\begin{aligned} f : G/H &\rightarrow X \\ gH &\mapsto g \cdot x. \end{aligned}$$

Cette application est  $G$ -équivariante car

$$f(a \cdot gH) = f(agH) = ag \cdot x = a \cdot (g \cdot x) = a \cdot f(gH)$$

et donc  $G/H \cong X$  en tant que  $G$ -ensembles. Par conséquent, tout  $G$ -ensemble transitif est isomorphe à  $G/H$  pour un certain sous-groupe  $H$  de  $G$ . Cela montre la surjectivité.

(4) (a)  $G = \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ . Ses sous-groupes sont

- $\langle 0 \rangle$  (sous-groupe trivial)
- $\langle 2 \rangle \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$
- $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ .

Aucun de ces sous-groupes n'est conjugué (car  $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$  est abélien), donc nous avons trois classes de conjugaison distinctes. Ainsi, il y a trois classes d'isomorphisme d'actions transitives de  $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ .

(b)  $G = \mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ . Ses sous-groupes sont

- $\langle 0 \rangle$
- $\langle 4 \rangle \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$
- $\langle 2 \rangle \cong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$
- $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ .

Encore une fois, aucun de ces sous-groupes n'est conjugué, donc il y a quatre classes d'isomorphisme distinctes d'actions transitives de  $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ .

(c)  $G = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ . Ses sous-groupes sont

- $\langle (0, 0) \rangle$  (sous-groupe trivial)
- $\langle (1, 0) \rangle \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$
- $\langle (0, 1) \rangle \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$
- $\langle (1, 1) \rangle \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$
- $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ .

Tous ces sous-groupes sont distincts et non conjugués (car  $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$  est abélien), donc il y a cinq classes d'isomorphisme distinctes d'actions transitives.

(d)  $G = S_3$ . Ses sous-groupes sont

- $\langle e \rangle$  (sous-groupe trivial)
- Trois sous-groupes isomorphes à  $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$  (générés par des transpositions)
- $\langle (123) \rangle \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$
- $S_3$ .

Les trois sous-groupes isomorphes à  $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$  sont conjugués entre eux, et les autres ne le sont pas. Par conséquent, nous avons quatre classes d'isomorphisme distinctes d'actions transitives de  $S_3$ .