

Partie III: Cours No 8.2
Thermodynamique / réactions
chimiques

V.Michaud

Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne



Contenu du cours MSE 101

- Introduction, les matériaux
- Partie I: De l'atome à la structure des matériaux (11/09-2/10)
 - Structure atomique, tableau périodique,
 - Liaisons chimiques, Structure des matériaux
- Partie II: Propriétés mécaniques (7/10-4/11)
 - Elasticité linéaire/plasticité,
 - Ductilité et dureté,
 - Ténacité,
 - Fatigue et usure, étude de cas
- Partie III: Phénomènes thermodynamiques, concepts du rôle de la chaleur, du temps, des équilibres (6/11-9/12)
 - Dans les corps purs,
 - dans les mélanges réactifs (réactions chimiques) Réactions chimiques: acide base /oxydo-réduction, piles et électrolyse
 - dans les mélanges non réactifs (alliages, diagrammes de phase)
- Partie IV: Propriétés fonctionnelles des matériaux (11-18/12)
 - Propriétés thermiques/ Comportement à haute température,
 - Propriétés électriques, magnétiques.

Table des matières

- Rappel: formation des molécules
- D'où vient l'énergie des réactions (enthalpie)?
- Qu'est ce que la thermodynamique
- Energie interne

Objectifs du cours

- Revenir vers les principes de base de la chimie qui forme les liaisons entre les matériaux, mais cette fois en mettant l'accent sur l'énergie, sous diverses formes et les effets de la température et de la pression.
- C'est un petit avant goût de la thermodynamique qui sera vue en physique au deuxième semestre, mais vu du côté chimie/matériaux qui nous permettra d'expliquer les états des matériaux et la formation des alliages de plusieurs matériaux et leur état en fonction de la température/pression et de leur composition.


Rappel du cours 2: Formation de molécules

Principe des réactions chimiques: les éléments en présence se combinent pour en former d'autres plus stables énergétiquement, et la vitesse avec laquelle cette réaction se produit dépend aussi des conditions de pression et température.

Certains principes ont été observés:


- Conservation de la masse
- Proportions définies
- Proportions multiples

Equation chimique (cours 2)



- Formule des réactifs et des produits
- Nombre de molécules, atomes, ions impliqués
- Flèche vers la droite : la réaction inverse n'a pas lieu

Exemple




↑
Coefficient stoechiométrique

- ▶ Conservation du nombre de chacun des atomes
- ▶ Conservation de la charge électrique totale

Indications supplémentaires → à droite de la formule

(g) phase gazeuse
(l) phase liquide
(s) phase solide
(aq) solution aqueuse



Il y a le même nombre d'atomes de chaque élément des deux côtés de la flèche, la réaction est équilibrée.

Classification des réactions (cours 2)

Par type de réaction:


(1) Equilibre (cas général, défini par **thermodynamique**)



Classification des réactions (cours 2)

Par type de réaction:

(2) Réaction complète (équilibre déplacé)



Δ : chauffage

chaux



Industrie: aciérie, verrerie, cimenterie

L'oxyde de calcium, «chaux vive», est un produit obtenu par calcination du calcaire à 825 ° C.

Toutes ces réactions comportent une transformation d'énergie, dont une partie va vers la formation de nouvelles liaisons chimiques, et une autre peut être dissipée sous forme de chaleur, il peut se passer beaucoup de choses...

Liaisons chimiques (cours 3)


L'énergie de liaison c'est aussi la quantité d'énergie nécessaire pour briser une liaison chimique. Pour une molécule simple, comme Cl-Cl gazeux, il y a une relation directe entre l'enthalpie (la chaleur) de réaction pour former ou briser la molécule, et son énergie de liaison: ce sont les mêmes.



On peut donc trouver, dans certains cas (gaz), **l'énergie de liaison d'une molécule en mesurant la chaleur dégagée ou absorbée lors d'une réaction chimique.**

Liaisons chimiques (cours 3)

Exemple comme donné en exercice série 3:



$\Delta H = -566$ kJ enthalpie de la réaction.

On a $\Delta H_{\text{réaction}} = \Delta H_{\text{bris liaison}} + \Delta h_{\text{formation liaison}}$

Qu'est ce que la thermodynamique?


La thermodynamique est la **science de la transformation de l'énergie**

Thermodynamique et Cinétique

Thermodynamique: considère les potentiels chimiques relatifs des réactifs et des produits. Elle permet de prédire si une réaction est spontanée ou non, de calculer la quantité de travail que l'on peut attendre de cette réaction et de déterminer la composition de l'équilibre.

Cinétique: s'intéresse plutôt au potentiel chimique des états intermédiaires, et explique pourquoi une réaction est lente ou rapide.

Définitions: système, environnement, univers



Système : milieu réactionnel (chimie)

Environnement : ce qui est à l'extérieur du système

Univers : ensemble du système et de son environnement

Types de Systèmes


Ouvert : peut échanger de l'énergie et de la matière

Fermé : peut échanger de l'énergie mais pas de la matière

Isolé : ne peut échanger ni énergie ni matière

Définitions: fonction d'état

- Décrit l'état du système.
- Ne dépend que de l'état du système et est indépendante de la manière dont cet état a été atteint.



état initial

état final

Fonctions d'état:

Altitude

Énergie potentielle

Le travail fourni


La chaleur dissipée

ne sont pas des fonctions d'état

Grandeurs extensives et intensives

Grandeurs

- **Extensives** : proportionnelles à la quantité de matière (masse, volume, chaleur, énergie)
- **Intensives** : indépendantes de la quantité de matière (température, pression, densité)



Équation d'état

Relation qui lie des variables d'état entre elles

Loi des gaz parfaits

$$pV = nRT$$

p : pression

V : volume

n : nombre de moles

T : température

R : constante des gaz parfaits

= 8.314 J/(mol K)

= 0.082 m.atm/(mol K)

= 0.083 m. bar K⁻¹ mol⁻¹

Energie Interne U

Tout système chimique contient une certaine **quantité d'énergie** qui dépend de son état physique, de la température et de la pression. Cette énergie interne **U** est la somme d'énergie cinétique provenant du mouvement (translation, mais aussi rotation et vibration) et d'énergie potentielle (l'énergie des électrons et de l'énergie des liaisons chimiques). Elle ne peut pas être mesurée mais peut apparaître sous forme de chaleur, d'électricité ou de rayonnement lumineux.



ΔU


Energie interne U

Valeur absolue: pas mesurable
On mesure le changement ΔU .

La variation d'énergie interne ΔU est indépendante du chemin suivi pour passer d'un état initial à un état final. Elle est une fonction d'état du système.

Premier principe de la thermodynamique

Durant une transformation (transformation physique ou réaction chimique), la **variation d'énergie interne** du système est égale à la somme de la **quantité de chaleur Q** échangée avec l'environnement et du **travail W** fourni (mécanique, électrique..).





Conséquence pour un système fermé

L'énergie est toujours conservée. On ne crée pas l'énergie, on la transforme .

Variation de l'énergie interne du système

= Energie échangée avec le milieu extérieur sous forme de travail + Energie échangée avec le milieu extérieur sous forme de chaleur



$$\Delta U = W + Q$$

Exemple

- $W = + 10 \text{ kJ}$ si 10 kJ d'énergie **sont fournis** au système sous forme de travail
- $W = - 10 \text{ kJ}$ si 10 kJ d'énergie **sont perdus** par le système sous forme de travail
- $Q = + 10 \text{ kJ}$ si 10 kJ d'énergie **sont fournis** au système sous forme de chaleur
- $Q = - 10 \text{ kJ}$ si 10 kJ d'énergie **sont perdus** par le système sous forme de chaleur

Chaleur d'une transformation


Réaction à volume constant = dans un récipient fermé

→ Réaction isochore ($V = \text{const.}$) $\Rightarrow W = -p\Delta V = 0$

Pas d'expansion du gaz
contre l'atmosphère
environnante:

$$\Delta V = 0 \Rightarrow W = 0$$

$$\Delta U = Q_V$$



On détermine la variation d'énergie interne ΔU , par simple mesure de la **chaleur** fournie ou absorbée par le système Q_V à volume constant


Chaleur de transformation à pression constante

Dans la majorité des cas, les transformations (réaction chimique) se déroulent à **pression constante** dans des récipients ouverts (système ouvert). Dans ce cas le volume peut varier et un travail mécanique être échangé. La variation de l'énergie interne ΔU n'est plus égale à la seule chaleur.

Définition d'une nouvelle fonction d'état du système appelée **enthalpie H**

$$H = U + pV \quad p: \text{pression externe} \quad V: \text{volume du système}$$

Chaleur de transformation à pression constante



Q = énergie
fournie au système
sous forme de
chaleur

La variation d'**enthalpie** du système ΔH est égale à la
chaleur Q_p fournie au système, à **pression constante**.

Résumé

- La thermodynamique est la science de la transformation de l'énergie.
- Nous distinguons les systèmes isolés, fermés et ouverts.
- Les lois principales de la thermodynamique donnent les bases des considérations énergétiques des réactions chimiques.
- La première loi s'appelle le principe de la conservation d'énergie. Elle indique que si l'énergie peut être transformée d'une forme à une autre, elle ne peut être ni créée ni détruite.
- Ainsi, le concept de changement de l'enthalpie, qui est la somme du changement de l'énergie interne et du travail en volume, peut être dérivé. L'enthalpie de réaction indique si l'énergie est consommée (endothermique) ou fournie (exothermique) au cours d'une réaction chimique.

A retenir du cours d'aujourd'hui

- *Les définitions principales d'énergie interne, enthalpie, endothermique, exothermique.*
- *Ecrire et utiliser une équation thermochimique*
- *Ecrire et utiliser le premier principe de la thermodynamique*