



### 1. Transvaser



Transvaser le volume à pipeter plus max. 10% de la solution mère dans un récipient.

**Ne jamais pipeter directement dans le flacon, risque de contamination!**


### 2. Rincer / Prélever



Rincer la pipette en prélevant la solution au-dessus du trait de jauge. Vider le contenu dans un bécher déchet. Si nécessaire, recommencer.


Prélever la solution comme ci-dessus puis essuyer délicatement le bout de la pipette avec un papier.

### 3. Ajuster




Ajuster le ménisque, en prenant garde d'appuyer la pipette à **45°** sur le bord du récipient.

### 4. Ecouler



Appuyer la pipette contre la paroi (à **45°**) du récipient de destination. Laisser couler entièrement le liquide, attendre 15 secondes et faire  $\frac{1}{4}$  de tour.

### 5. Vider



Evacuer la dernière goutte en tant que déchet.

#### Lecture du ménisque



Placer son œil à la hauteur du trait → voir un trait et pas une ellipse !

C'est la pointe du ménisque qui doit être sur le trait de jauge

#### Avec quoi pipeter

Macro-aspirateur



Pro-pipette



Connecter délicatement à la pipette, sans faire un bras de levier !

**!**  
Une fois connecté à la pipette, l'ensemble doit rester à la verticale !  
→ Evite un retour de liquide  
→ Limite le risque de contamination