

Remarque

Certains exercices consistent en des questions de type Vrai ou Faux (V/F). Pour chaque question, répondre VRAI si l'affirmation est toujours vraie ou par FAUX si elle n'est pas toujours vraie.

Exercice 1.

- (i) Retrouver la formule de la *Proposition 9.3 (ii)* à partir de celle de la dérivée en chaîne.
- (ii) Retrouver la formule de la *Proposition 9.3 (iii)* à partir de celle de la dérivée d'un produit de fonctions.

Exercice 2.

⌚ Objectif: Série de Taylor et fonction analytique

📖 Théorie nécessaire: Exemples 8.15, 8.16

Montrer que la fonction $f(x) = \frac{2}{3+4x}$ est analytique en x_0 et déterminer l'intervalle de convergence de la série de Taylor. Considérer les valeurs de x_0 suivantes :

$$(i) \ x_0 = 0 \quad (ii) \ x_0 = 2$$

Exercice 3.

⌚ Objectif: Série de Taylor

📖 Théorie nécessaire: Exemples 8.16, 8.20

Déterminer la série de Taylor de $f(x)$ autour de x_0 et donner son rayon de convergence et son intervalle de convergence.

$$(i) \ f(x) = e^{2x+1} \quad \text{avec } x_0 = 0 ; \quad (ii) \ f(x) = \frac{1}{x+1} \quad \text{avec } x_0 = 2 .$$

Exercice 4.

⌚ Objectif: DL, série de Taylor

📖 Théorie nécessaire: Théorème 8.2, exemple 8.9, 8.11 et/ou définition 8.14, exemples 8.15, 8.16

Trouver les coefficients des quatre premiers termes a_0, a_1, a_2, a_3 de la série de Taylor autour de $x_0 = 0$ des fonctions f suivantes :

$$(i) \ f(x) = \log\left(\frac{1-x}{1+x}\right) \quad (iii) \ f(x) = \arctan(x) \\ (ii) \ f(x) = \tan(x) \quad (iv) \ f(x) = \sqrt{1+\tan(x)}$$

Exercice 5.

⌚ **Objectif:** Rayon de convergence, intervalle de convergence

📖 **Théorie nécessaire:** Exemple 8.20

Déterminer le rayon de convergence et l'intervalle de convergence des séries entières données ci-dessous.

$$(i) \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\log n}{n} x^n$$

$$(ii) \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n}{\sqrt{n^n + 1}} x^n$$

$$(iii) \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{(x-2)^{2n}}{n3^{n+1}}$$

$$(iv) \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\arctan(n)}{1+n^2} (x-2)^n$$

Exercice 6.

⌚ **Objectif:** Calcul de primitive

Trouver des primitives pour les fonctions f suivantes :

$$(i) f(x) = \sin(x)$$

$$(x) f(x) = \frac{1}{1+x} + \frac{1}{1-x}$$

$$(ii) f(x) = \cos(x)$$

$$(xi) f(x) = \frac{1}{1-x^2} \text{ (utiliser le point précédent)}$$

$$(iii) f(x) = \tan(x)$$

$$(xii) f(x) = \frac{2x}{1-x^2}$$

$$(iv) f(x) = e^x$$

$$(xiii) f(x) = \frac{1}{\tan(x)}$$

$$(v) f(x) = \sinh(x)$$

$$(xiv) f(x) = x \exp(x^2)$$

$$(vi) f(x) = \cosh(x)$$

$$(vii) f(x) = \log(x)$$

$$(viii) f(x) = \frac{1}{x}$$

$$(ix) f(x) = (ax+b)^s \quad (s \neq -1)$$

$$(xv) f(x) = (ax^p+b)^s x^{p-1} \quad (s \neq -1, a, p \neq 0)$$

Exercice 7.

⌚ **Objectif:** Calcul de primitive

Calculer les primitives suivantes :

$$(i) \int \frac{3x+4}{1+x^2} dx$$

$$(ii) \int \frac{\sin(x)}{\cos(x)^3} dx$$

$$(iii) \int \frac{1}{\sqrt{4-3x^2}} dx$$

$$(iv) \int \frac{\sinh(x)}{e^x+1} dx$$

Exercice 8.

En utilisant que si φ est bijective, alors

$$\int^x f(t) dt = \int^{\varphi^{-1}(x)} f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt,$$

(comparer avec la formule de changement de variables donnée au cours) trouver des primitives pour les fonctions f suivantes, avec le changement de variable $x = \varphi(u)$ indiqué :

$$(i) f:]-1, 1[\rightarrow \mathbb{R} \text{ définie par } f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \text{ et } \varphi:]-\pi/2, \pi/2[\rightarrow]-1, 1[\text{ définie par } \varphi(u) = \sin(u).$$

$$(ii) f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ définie par } f(x) = \frac{1}{1+x^2} \text{ et } \varphi:]-\pi/2, \pi/2[\rightarrow \mathbb{R} \text{ définie par } \varphi(u) = \tan(u).$$

Exercice 9.

➊ **Objectif:** Exemple d'une fonction qui n'a pas de primitive

➋ **Théorie nécessaire:** Proposition 6.12, Définition 9.1

Soit $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x = 0 \\ 0 & \text{si } x \neq 0 \end{cases}$$

Montrer par l'absurde que f n'admet pas de primitive.

Suggestion : utiliser le Théorème 6.12 (voir Polycopié p. 93).

Exercice 10.

Soit $I \subset \mathbb{R}$ un intervalle ouvert non-vide et borné et soit $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue.

Q1 : f admet une primitive sur I .

Dans la suite on restreint le domaine de f à l'intervalle $[a, b] \subset I$ où $a, b \in I$ tels que $a < b$.

Q2 : Si $\int_a^b f(x) dx = 0$, alors f admet un zéro en $[a, b]$.

Q3 : Si $\int_a^b f(x) dx \geq 0$, alors $f(x) \geq 0$ pour tout $x \in [a, b]$.

Q4 : Si $f(x) < 0$ pour tout $x \in [a, b]$, alors $\int_a^b f(x) dx < 0$.

Soit encore F une primitive de f sur $[a, b]$.

Q5 : Si $f(x) \leq 0$ pour tout $x \in [a, b]$, alors $F(x) \leq 0$ pour tout $x \in [a, b]$.

Q6 : Pour tout $x \in [a, b]$, on a $F(x) = \int_a^x f(t) dt$.

Suggestion : considérez le résultat (Théorème de la moyenne) qu'il faut montrer dans l'Exercice 12.

Exercice 11.

➊ **Objectif:** Estimations sur les intégrales

➋ **Théorie nécessaire:** Proposition 9.10 (iii)

Vérifier les deux inégalités suivantes

$$\frac{7}{100} < \int_0^1 \frac{e^{-2x}}{5+x^3} dx < \frac{1}{10}.$$

Indication : utiliser le fait que $e > \frac{5}{2}$.

Exercice 12.

➊ **Objectif:** Théorème de la Moyenne

➋ **Théorie nécessaire:** TAF, théorème fondamental du calcul intégral

Soit $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue. À l'aide du théorème fondamental du calcul intégral et du théorème des accroissements finis, montrer qu'il existe $c \in]a, b[$ tel que

$$\int_a^b f(x) dx = f(c)(b-a).$$

Solution des exercices calculatoires et auto-évaluation

Exercice 4 (i) $a_0 = 0, a_1 = -2, a_2 = 0, a_3 = -\frac{2}{3}$

(ii) $a_0 = 0, a_1 = 1, a_2 = 0, a_3 = \frac{1}{3}$

(iii) $a_0 = 0, a_1 = 1, a_2 = 0, a_3 = -\frac{1}{3}$

(iv) $a_0 = 1, a_1 = \frac{1}{2}, a_2 = -\frac{1}{8}, a_3 = \frac{11}{48}$

Exercice 5 (i) $r = 1, I = [-1, 1[$

(ii) $r = +\infty, I = \mathbb{R}$

(iii) $r = \sqrt{3}, I = [2 - \sqrt{3}, 2 + \sqrt{3}]$

(iv) $r = 1, I = [1, 3]$