

# Analyse II

# Examen

## Partie commune

## Printemps 2021

---

### Réponses

---

Pour les questions à **choix multiple**, on comptera :

- +3 points si la réponse est correcte,
- 0 point si la question n'est pas répondue ou s'il y a plusieurs réponses,
- 1 point si la réponse est incorrecte.

Pour les questions de type **vrai-faux**, on comptera :

- +1 point si la réponse est correcte,
- 0 point si la question n'est pas répondue ou s'il y a plusieurs réponses,
- 1 point si la réponse est incorrecte.

## Première partie, questions à choix multiple

Pour chaque question, marquer la case correspondante à la réponse correcte sans faire de ratures.  
Il n'y a qu'**une seule** réponse correcte par question.

**Question 1:** Soient les sous-ensembles

$$A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 \leq 1\} \quad \text{et} \quad B = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 > 1\}.$$

Alors l'ensemble non vide  $A \cap B \subset \mathbb{R}^3$  est

- ouvert
- borné
- fermé
- non borné

**Question 2:** Soit  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$  la fonction définie par

$$f(x, y, z) = xy + 2yz.$$

Alors le maximum et le minimum de  $f$  sous la contrainte  $x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0$  sont respectivement

- $\frac{6}{\sqrt{20}}$  et  $-\frac{6}{\sqrt{20}}$
- $\frac{\sqrt{2}}{5}$  et  $-\frac{\sqrt{2}}{5}$
- $\frac{\sqrt{5}}{2}$  et  $-\frac{\sqrt{5}}{2}$
- $\frac{5}{\sqrt{20}}$  et  $-\frac{3}{\sqrt{20}}$

**Question 3:** Soit  $f : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}$  la fonction définie par

$$f(x, y) = \frac{\sin(y^2)}{x^2 + y^2}.$$

Alors

- $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 1$
- $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$  n'existe pas
- $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = \frac{1}{2}$
- $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0$

**Question 4:** L'intégrale

$$\int_0^1 \left( \int_{\arctan(x)}^{\pi/4} \left( \cos^6(y) + \frac{1}{1+x^2} \right) dy \right) dx$$

vaut

- $\frac{\pi^2}{32} - \frac{3}{16}$
- $\frac{\pi^2}{32} + \frac{7}{48}$
- $\frac{\pi^2}{16} + \frac{1}{144}$
- $\frac{\pi^2}{16} + \frac{5}{16}$

**Question 5 :** Soit  $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  la fonction définie par

$$g(u, v) = (v^2, u - v)$$

et soit  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction de classe  $C^1$  telle que

$$J_f(x, y) = \begin{pmatrix} -y \sin(x) & \cos(x) + 2y \end{pmatrix}.$$

Alors la fonction composée  $h = f \circ g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  satisfait

- $\frac{\partial h}{\partial v}(1, 0) = 3$         $\frac{\partial h}{\partial v}(1, 0) = -2$         $\frac{\partial h}{\partial v}(1, 0) = -3$         $\frac{\partial h}{\partial v}(1, 0) = 2$

**Question 6 :** L'équation du plan tangent à la surface

$$x^4 + y^4 + z^8 = 3$$

au point  $(1, -1, 1)$  est

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> $x + y + z = 1$             | <input type="checkbox"/> $x + y + 2z = 3$  |
| <input checked="" type="checkbox"/> $x - y + 2z = 4$ | <input type="checkbox"/> $2x - 2y + z = 5$ |

**Question 7 :** Soit  $F : ]0, +\infty[ \rightarrow \mathbb{R}$  la fonction définie par

$$F(t) = \int_{t^2}^t \frac{\sin^2(tx)}{x} dx.$$

Alors

- |  |
|--|
| <input type="checkbox"/> $F'(t) = \frac{2 \sin^2(t^2)}{t} + \frac{\sin^2(t^3)}{t}$                             |
| <input type="checkbox"/> $F'(t) = \frac{\sin^2(t^2)}{t} - \frac{2 \sin^2(t^3)}{t} + \sin^2(t^2) - \sin^2(t^3)$ |
| <input checked="" type="checkbox"/> $F'(t) = \frac{2 \sin^2(t^2)}{t} - \frac{3 \sin^2(t^3)}{t}$                |
| <input type="checkbox"/> $F'(t) = \frac{\sin^2(t^2)}{t} - \frac{\sin^2(t^3)}{t}$                               |

**Question 8 :** Soit  $D$  le sous-ensemble de  $\mathbb{R}^3$  donné par

$$D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0, 1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4, x^2 + y^2 \leq z^2\}.$$

Alors l'intégrale

$$\int_D \frac{z^2}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} dx dy dz$$

est égale à

$\int_1^2 \left( \int_0^{\pi/4} \left( \int_0^{\pi/2} r^3 \cos^2(\theta) \sin(\theta) d\varphi \right) d\theta \right) dr$

$\int_1^4 \left( \int_0^{\pi/4} \left( \int_{\pi/4}^{\pi/2} r^3 \cos^2(\theta) \sin(\theta) d\varphi \right) d\theta \right) dr$

$\int_1^2 \left( \int_0^{\pi/2} \left( \int_{\pi/4}^{\pi/2} r^3 \sin(\theta) d\varphi \right) d\theta \right) dr$

$\int_1^2 \left( \int_0^{\pi/2} \left( \int_0^{\pi/2} r \cos^2(\theta) d\varphi \right) d\theta \right) dr$

**Question 9 :** La solution  $y(x)$  de l'équation différentielle

$$\cos(x)y'(x) + \sin(x)y(x) = \cos^2(x)$$

qui satisfait la condition initiale  $y(0) = 2$  vérifie aussi

$y\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3} + \frac{\pi\sqrt{3}}{6}$

$y\left(\frac{\pi}{3}\right) = 1 + \frac{\pi}{6}$

$y\left(\frac{\pi}{3}\right) = 1 - \frac{\pi}{6}$

$y\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\sqrt{3} + \frac{\pi\sqrt{3}}{6}$

**Question 10 :** Soit  $D$  le sous-ensemble de  $\mathbb{R}^2$  donné par

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq y \leq x, x^2 + y^2 \leq 4\}.$$

Alors l'intégrale

$$\int_D xy^2(x^2 + y^2) dx dy$$

vaut

$\frac{32\sqrt{2}}{21}$

$\frac{2^{12}\sqrt{2}}{7}$

$\frac{8\sqrt{2}}{9}$

$\frac{2^8}{21}$

**Question 11 :** Soit  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  la fonction définie par

$$f(x, y) = \cos(x + y) \cos(x - y).$$

Alors le polynôme de Taylor d'ordre deux de  $f$  autour du point  $(0, 0)$  est

- $p_2(x, y) = 1 - x^2 - y^2 - 2xy$
- $p_2(x, y) = 1 + x^2 + y^2$
- $p_2(x, y) = 1 - x^2 - y^2$
- $p_2(x, y) = 1 + x^2 + y^2 - 2xy$

**Question 12 :** Soit  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$  la fonction définie par

$$f(x, y, z) = zy^5 + 4e^{z-x} - 2.$$

L'équation  $f(x, y, z) = 0$  définit dans un voisinage de  $(x, y) = (2, -1)$  une fonction  $z = g(x, y)$  qui satisfait  $g(2, -1) = 2$  et  $f(x, y, g(x, y)) = 0$  ainsi que

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> $\frac{\partial g}{\partial y}(2, -1) = \frac{3}{10}$ | <input type="checkbox"/> $\frac{\partial g}{\partial y}(2, -1) = -\frac{3}{10}$            |
| <input type="checkbox"/> $\frac{\partial g}{\partial y}(2, -1) = \frac{10}{3}$ | <input checked="" type="checkbox"/> $\frac{\partial g}{\partial y}(2, -1) = -\frac{10}{3}$ |

**Question 13 :** Soit  $a \in ]0, +\infty[$  fixé et soit  $y(x)$  la solution de l'équation différentielle

$$y'(x) = \left(a + \frac{x}{a}\right) y(x)$$

qui satisfait la condition initiale  $y(0) = 1$ . Alors

- $y(2) - y(-2) = e^{2a} - e^{-2a}$
- $y(2) - y(-2) = 0$
- $y(2)y(-2) = e^{4/a}$
- $y(2)y(-2) = e^{4a}$

**Question 14 :** Soit  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  la fonction définie par

$$f(x, y) = \begin{cases} \sqrt{|xy|} \sin(\sqrt{x^2 + y^2}) & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Alors

- la fonction  $f$  est différentiable en  $(0, 0)$
- la fonction  $f$  est continue en  $(0, 0)$  mais n'est pas continue sur  $\mathbb{R}^2$
- les dérivées partielles  $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)$  et  $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)$  existent, mais  $f$  n'est pas différentiable en  $(0, 0)$
- la fonction  $f$  n'est pas continue en  $(0, 0)$

**Question 15 :** La solution  $u(x)$  de l'équation différentielle

$$u''(x) + 9u(x) = \sin(3x)$$

qui satisfait les conditions initiales  $u(0) = \frac{\pi}{6}$  et  $u'(0) = -\frac{1}{6}$  vérifie aussi

$u(\pi) = 0$

$u(\pi) = \frac{\pi - 1}{6}$

$u(\pi) = \frac{\pi}{6}$

$u(\pi) = \frac{1}{6}$

**Question 16 :** Soit  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  la fonction définie par

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^4}{x^4 + y^8} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Alors la dérivée directionnelle de  $f$  en  $(0, 0)$  suivant le vecteur  $\mathbf{v} = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

vaut  $\frac{9}{2}$

vaut  $\frac{3}{4}$

n'existe pas

vaut 0

**Question 17 :** Soit  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  la fonction définie par

$$f(x, y) = x^3 + 2y^3 + 3x^2y + 3xy^2 - x - 2y.$$

Alors

$(-2/\sqrt{3}, 1/\sqrt{3})$  est un point d'extremum local de  $f$

$f$  a exactement deux points stationnaires

$f$  n'admet pas de point de maximum local

$f$  admet au moins un point de maximum local et au moins un point de minimum local

**Question 18 :** Soit  $(\mathbf{a}_n)_{n \in \mathbb{N}}$  la suite d'éléments de  $\mathbb{R}^2$  définie par

$$\mathbf{a}_n = \left( \cos\left(\frac{n\pi}{2}\right), \sin\left(\frac{n\pi}{4}\right) \right)$$

pour tout  $n \in \mathbb{N}$ . Alors

la sous-suite  $(\mathbf{a}_{2k+1})_{k \in \mathbb{N}}$  converge

la sous-suite  $(\mathbf{a}_{4k+1})_{k \in \mathbb{N}}$  converge

la sous-suite  $((-1)^k \mathbf{a}_{4k+1})_{k \in \mathbb{N}}$  converge

la sous-suite  $((-1)^k \mathbf{a}_{2k+1})_{k \in \mathbb{N}}$  converge

## Deuxième partie, questions de type Vrai ou Faux

Pour chaque question, marquer (sans faire de ratures) la case VRAI si l'affirmation est **toujours vraie** ou la case FAUX si elle **n'est pas toujours vraie** (c'est-à-dire si elle est parfois fausse).

**Question 19 :** Soit  $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$ . Alors

$$\int_D \frac{z}{x^2 + y^2 + z^2 + 1} dx dy dz \geq \frac{\pi}{8}.$$

VRAI       FAUX

**Question 20 :** Soient

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\} \quad \text{et} \quad E = D \setminus \{(0, 0)\}.$$

Alors il existe une fonction continue  $f : E \rightarrow \mathbb{R}$  qui n'est pas bornée.

VRAI       FAUX

**Question 21 :** Soit  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction telle que  $\nabla f(1, 0) = (2, -1)$ .

Si  $D_{\mathbf{v}}f(1, 0) = 1$  pour  $\mathbf{v} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ , alors  $f$  n'est pas différentiable en  $(1, 0)$ .

VRAI       FAUX

**Question 22 :** Soit  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction continue et soit  $U \subset \mathbb{R}^n$  un ouvert non vide. Alors l'ensemble  $f(U)$  est ouvert.

VRAI       FAUX

**Question 23 :** Soit  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction de classe  $C^2$  et soit  $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^3$  un point stationnaire de  $f$ . Si les trois valeurs propres  $\lambda_1, \lambda_2$  et  $\lambda_3$  de la matrice hessienne  $\text{Hess}_f(\mathbf{a})$  sont telles que

$$\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 2 \quad \text{et} \quad \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 = -1,$$

alors  $\mathbf{a}$  n'est pas un point d'extremum local de  $f$ .

VRAI       FAUX

**Question 24 :** Soit  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction de classe  $C^1$ . Si  $\nabla f(1, -1) = (0, 0)$ , alors  $(1, -1) \in \mathbb{R}^2$  est un point d'extremum local de  $f$ .

VRAI       FAUX

**Question 25 :** Soit  $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction différentiable en  $(x_0, y_0, z_0) \in \mathbb{R}^3$  et soit  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$  une fonction différentiable en  $t_0 \in \mathbb{R}$  telle que  $g(t_0) = (x_0, y_0, z_0)$ . S'il existe  $c \in \mathbb{R}$  tel que

$$F(g(t)) = c \quad \text{pour tout } t \in \mathbb{R},$$

alors le produit scalaire du gradient  $\nabla F(x_0, y_0, z_0)$  avec le vecteur  $g'(t_0)$  est nul.

VRAI       FAUX

**Question 26 :** Soit  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction telle que les dérivées partielles  $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)$  et  $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)$  existent. Si  $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 0$  et  $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0$ , alors  $f$  est continue au point  $(0, 0)$ .

VRAI       FAUX

**Question 27 :** Soit  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction de classe  $C^3$ . Si  $p_2(x, y) = 2 + x^2 + 2y^2$  est le polynôme de Taylor de  $f$  d'ordre 2 autour de  $(0, 0)$ , alors  $\nabla f(0, 0) = (0, 0)$ .

VRAI       FAUX

**Question 28 :** Soient  $A$  et  $B$  deux sous-ensembles non vides de  $\mathbb{R}^n$ . Alors  $\partial(A \cup B) = \partial A \cup \partial B$ .

VRAI       FAUX