

The first matrix I designed was quite naturally perfect.

It was a work of art. Flawless. Sublime.

A triumph only equaled by its monumental failure.

The first matrix I designed was quite naturally perfect.

It was a work of art. Flawless. Sublime.

A triumph only equaled by its monumental failure.

The first matrix I designed was quite naturally perfect.

It was a work of art. Flawless. Sublime.

A triumph only equaled by its monumental failure.

Operations Elementaires

Operations sur les lignes

$M = (m_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq d' \\ j \leq d}}$ la i -ieme ligne $L_i(M) = (m_{ij})_{j=1 \dots d}$

$$\begin{pmatrix} m_{11} & & m_{1d} \\ \vdots & & \vdots \\ m_{i1} & m_{i2} & \dots & m_{id} \\ \vdots & & \vdots \\ m_{d'1} & & m_{d'd} \end{pmatrix} \longrightarrow L_i = (m_{i1} \ m_{i2} \ \dots \ m_{id})$$

DÉFINITION 9.1. Les operations elementaires sur les lignes d'une matrice sont les applications suivantes de $M_{d' \times d}(K)$ vers $M_{d' \times d}(K)$: pour $i, j \in \{1, \dots, d'\}$ et $\lambda \in K^\times$ et $\mu \in K$

(I) Transposition: Echanger deux lignes $i \neq j \leq d'$ de M :

$$L_i \longleftrightarrow L_j$$

(II) Dilatation: Multiplier la i -eme ligne par un scalaire $\lambda \neq 0$:

$$L_i \rightarrow \lambda.L_i.$$

(III) Combinaison Lineaire: Additionner a la ligne i un multiple scalaire de la la j -ieme ligne pour $i \neq j$: $\mu \in K$

$$L_i \rightarrow L_i + \mu L_j$$

PROPOSITION 9.1. *Ces trois operations sont des applications lineaires bijectives*

$$(I), (II), (III) : M_{d' \times d}(K) \mapsto M_{d' \times d}(K).$$

PROPOSITION 9.2. *Les trois operations elementaires sont obtenues par multiplication a gauche de M par des matrices convenables: pour $1 \leq i \neq j \leq d'$*

$$(I) T_{ij} \cdot \bullet : M \mapsto T_{ij} \cdot M$$

$$(II) D_{i,\lambda} \cdot \bullet : M \mapsto D_{i,\lambda} \cdot M$$

$$(III) Cl_{ij,\mu} \cdot \bullet : M \mapsto Cl_{ij,\mu} \cdot M.$$

ou les matrices carrees T_{ij} , $D_{i,\lambda}$, $Cl_{ij,\mu} \in M_{d'}(K)$ sont definies par:

$$T_{ij} = \text{Id}_{d'} - E_{ii} - E_{jj} + E_{ij} + E_{ji}.$$

$$D_{i,\lambda} = \text{Id}_{d'} + (\lambda - 1) \cdot E_{ii}, \quad \lambda \neq 0$$

$$Cl_{ij,\mu} = \text{Id}_{d'} + \mu \cdot E_{ij}, \quad i \neq j \text{ ou } \mu \neq -1 \text{ si } i = j.$$

DÉFINITION 9.2. *Les matrices*

$$T_{ij}, D_{i,\lambda}, \lambda \neq 0, Cl_{ij,\mu}$$

pour $i, j \leq d'$, $\lambda \neq 0$, et si $i = j$, $\mu \neq -1$ sont appelees matrices de transformations elementaires.

DÉFINITION 9.3. On dit que N est ligne-équivalente à M ssi il existe une suite de transformations élémentaires qui transforme M en N .

– De manière équivalente, N est ligne-équivalente à M ssi il existe une suite finie de matrices des transformations élémentaires telle que N est obtenue à partir de M par multiplications à gauche par cette suite de matrices.

Ex:
$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Ligne-equiv

Car $K \neq 2$,

PROPOSITION 9.3. La relation être "ligne-équivalente" est une relation d'équivalence sur $M_{d' \times d}(K)$.
– De plus deux matrices M, N ligne-équivalentes sont équivalentes au sens de la notion d'équivalence de deux matrices de la Définition 7.10.

COROLLAIRE. Si M et N sont lignes équivalentes alors

$$\text{rg}(M) = \text{rg}(N).$$

  THE WARNING  Par contre équivalente
 $\not\Rightarrow$ ligne-équivalente

PROPOSITION 9.4. Si $N \in M_{d' \times d}(K)$ est ligne-equivalente a M alors toute ligne de N est combinaison lineaire des lignes de M :

$$\forall i \leq d', \text{Lig}_i(N) \in \langle \text{Lig}_1(M), \dots, \text{Lig}_{d'}(M) \rangle \subset K^d$$

et inversement les lignes de M sont combinaisons lineaires des lignes de N . En particulier les SEV engendres par les lignes de M et de N sont les memes

$$\langle \text{Lig}_1(M), \dots, \text{Lig}_{d'}(M) \rangle = \langle \text{Lig}_1(N), \dots, \text{Lig}_{d'}(N) \rangle \subset K^d$$

Echelonnage

DÉFINITION 9.4. Une matrice $M = (m_{ij}) \in M_{d' \times d}(K)$ est échelonnée si elle est nulle ou bien si

(1) Il existe $1 \leq r \leq d$ et $1 \leq j_1 < \dots < j_r \leq d$ tels que

- Pour la ligne L_1 , le premier terme non-nul est le j_1 -ième: on a $m_{1j} = 0$ pour tout $j < j_1$ et $m_{1j_1} \neq 0$,
- Pour la ligne L_2 , le premier terme non-nul est le j_2 -ième: on a $m_{2j} = 0$ pour tout $j < j_2$ et $m_{2j_2} \neq 0$,
- $\vdots$
- Pour la ligne L_r , le premier terme non-nul est le j_r -ième: on a $m_{rj} = 0$ pour tout $j < j_r$ et $m_{rj_r} \neq 0$

(2) Si $r < d$ les lignes $L_{r+1}, \dots, L_{d'}$ sont toutes nulles.

Si M est non-nulle les $j_1 < \dots < j_r$ sont appelés les échelons de M et les m_{ij_i} , $1 \leq i \leq r$ sont les pivots de M .

$$\begin{pmatrix} 0 & m_{12} & m_{13} & m_{14} & \cdots & \cdots & m_{1d} \\ 0 & 0 & 0 & m_{24} & \cdots & \cdots & m_{2d} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & m_{35} & \cdots & \cdots \cdots \cdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$r=3$$

$$d_1=2$$

$$d_2=4$$

$$d_3=5$$

DÉFINITION 9.5. Une matrice est echelonnee reduite si le seul coefficient non-nul d'une colonne contenant un pivot est le pivot lui-meme et il vaut 1:

– pour tout $i = 1, \dots, r$

$$m_{ij_i} = 1.$$

– Pour tout $i = 1, \dots, r$ et tout $1 \leq i' \neq i \leq d'$, on a

$$m_{i'j_i} = 0.$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & m_{13} & 0 & 0 & \cdots & m_{1d} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & \cdots & m_{2d} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

THÉORÈME 9.1 (Gauss). *Toute matrice est ligne-équivalente à une matrice échelonnée réduite.*

PROPOSITION 9.5. *Deux matrices ligne-équivalentes et échelonnées réduites sont égales.*

COROLLAIRE 9.1. *(Unicité de la forme échelonnée réduite) Soit $M \in M_{d' \times d}(K)$ une matrice alors M est ligne-équivalente à une unique matrice échelonnée réduite (qu'on appelle la forme échelonnée réduite de M).*

Applications

Calcul du Rang

PROPOSITION 9.6. *Si M et N sont lignes équivalentes*

$$\operatorname{rg}(M) = \operatorname{rg}(N).$$

Ensuite on a

PROPOSITION 9.7. *Si R est échelonnée avec r échelons alors*

$$\operatorname{rg}(R) = r.$$

Matrices Inversibles

PROPOSITION 9.8 (Critere d'inversibilite par operations elementaires). Soit $M \in M_d(K)$ une matrice carree alors M est inversible ssi M est ligne equivalente a la matrice identite Id_d .

$$\text{Id}_d = T_n T_{n-1} \dots T_1 M$$

$$\Leftrightarrow M^{-1} = T_n \times \dots \times T_1$$

Le principe des vases communicants
permet d'inverser une
matrice.

THÉORÈME 9.2. Le groupe linéaire $GL_d(K)$ est engendré par les matrices des transformations élémentaires

$$T_{ij}, D_{i,\lambda}, Cl_{ij,\mu}, \quad i, j \leq d, \quad \lambda, \mu \in K, \quad \lambda \neq 0, \quad \text{et si } i = j, \quad \mu \neq -1.$$

En d'autres termes (puisque l'ensemble des matrices de transformations élémentaires est stable par inverse) toute matrice $M \in GL_d(K)$ s'écrit comme un produit fini de ces matrices.

Preuve: Si M est inversible il existe

$T_1, \dots, T_n$ des matrices de TELs

$$\text{tg} \quad Id_d = T_n T_{n-1} \dots T_1 \cdot M$$

$$\Rightarrow M = T_1^{-1} \dots T_{n-1}^{-1} T_n^{-1} = T'_1 \times \dots \times T'_n$$

avec T'_i des matrices de TELs

Extraction d'une famille
generatrice

Pb: $G = \{w_1, \dots, w_e\} \subset V$ $\dim V = d$

$$W = \text{Vect } G \subset V$$

On cherche une base de W

Soit B une base de V . On identifie
les elts de V avec des vecteurs lignes K^d

$$L_B: V \xrightarrow{\sim} K^d$$

$$L_i := L_B(w_i) \in K^d \quad i=1, \dots, l$$

Soit $M \in \text{Mat}_{l \times d}(K)$ former des

lignes

$$M = \begin{pmatrix} L_1 \\ L_2 \\ \vdots \\ L_l \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1d} \\ x_{21} & x_{22} & \dots & x_{2d} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{l1} & x_{l2} & \dots & x_{ld} \end{pmatrix}$$

Soit R la forme échelonnée réduite
de M

$$R = \begin{pmatrix} L'_1 \\ L'_2 \\ \vdots \\ L'_r \\ 0_d \\ \vdots \\ 0_d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L'_1 \\ \vdots \\ L'_r \\ 0_d \\ \vdots \\ 0_d \end{pmatrix}$$

$r \leq d$ le
nb de pivots de
 $R = \text{rg } R = \text{rg } M$
 $= \dim W$

alors les vecteurs correspondants

$$w'_1 = L_B^{-1}(L'_1)$$

$\vdots$

$w'_r = L_B^{-1}(L'_r)$ forment une base

de W .


Rmq: on peut compléter cette base

B'_W en une base de V en prenant

comme vecteurs complémentaires les

$$L_B^{-1}(e_j)$$

$e_j = e_j$ est la base
canonique de K^d
pour j qui n'est pas
un indice de pivot de R



PROPOSITION 9.9 (Description matricielle d'une base d'un SEV). Soit $M \in M_{l \times d}(K)$ la matrice dont les l lignes sont formées des vecteurs lignes L_i , $i \leq l$. Soit R la matrice échelonnée réduite associée à M et

$$L'_i = \text{Lig}_i(R), \quad i \leq l$$

l'ensemble des lignes de R alors si R possède r échelons on a

$$\dim W = r$$

et les vecteurs de V correspondants aux r premières lignes

$$\mathcal{B}_W = \{w'_i = \text{Lig}_{\mathcal{B}}^{-1}(L'_i), \quad i \leq r\}$$

forment une base de W (et les $l - r$ autres vecteurs sont nuls).

Rmq: (Complétion) Correct p 158

$$\mathbb{Q}^4: \quad w_1 = (1, 2, 3, 4) \quad w_2 = (2, 0, -1, 1)$$

$$w_3 = (-1, 2, 4, 3) \quad W = \text{Vect}(w_1, w_2, w_3)$$

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 0 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 4 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -4 & -7 & -7 \\ 0 & 4 & 7 & 7 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 7/4 & 7/4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} &\text{Base de } W \\ &= \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix} \right. \\ &\quad \left. \begin{pmatrix} 0 & 1 & 7/4 & 7/4 \end{pmatrix} \right\} \end{aligned}$$

Resolution de Systemes lineaires

$$\varphi: V \mapsto W$$

$w \in W$ on cherche

$$\text{Sol}_{\varphi}(w) = \{v \in V \text{ tq } \varphi(v) = w\}$$

Solutions du système linéaire
 $\varphi(v) = w$ où $v \in V$ est l'inconnue

- Si $w = 0_N$ on dit que le système linéaire est homogène ou sans second membre.

- En général (si $w \neq 0_N$) on dit que le système est non-homogène ou avec second membre.

$$\text{Si } w = 0_w \quad \text{Sol } \varphi(0_w) = \ker \varphi$$

Rmq: en fait l'équation $\varphi(v) = w$
 d'inconnue v

est un cas particulier du Pb suivant

Soient G, H des gpes et

$\varphi: G \rightarrow H$ un morphisme

étant donné $w \in H$ on cherche les

$v \in G$ tq $\varphi(v) = w$.

On cherche si $w \in \text{Im } \varphi$ et
si oui quels sont les antécédents.

THÉORÈME 9.4 (Resolution d'équations dans les espaces vectoriels). Soit $\varphi : V \mapsto W$ une application linéaire entre deux espaces vectoriels de dimension finie. Pour tout $w \in W$, on pose

$$\text{Sol}_\varphi(w) = \varphi^{-1}(\{w\}) = \{v \in V, \varphi(v) = w\} \subset V$$

la preimage de w par φ . En particulier $\text{Sol}_\varphi(\mathbf{0}_W) = \ker \varphi$. Alors $\text{Sol}_\varphi(w)$ est

- soit $w \notin \varphi(V)$ et $\text{Sol}_\varphi(w)$ est l'ensemble vide,
- soit $w \in \varphi(V)$ et il existe $v^0 \in V$ tel que $\varphi(v^0) = w$ et alors

$$\text{Sol}_\varphi(w) = v^0 + \text{Sol}_\varphi(\mathbf{0}_W) = v^0 + \ker \varphi = \{v^0 + k, k \in \ker \varphi\}.$$

Preuve: si $w \notin \varphi(V)$ $\text{Sol}_\varphi(w) = \emptyset$

– si $w \in \varphi(V)$ il existe v^0 tq $\varphi(v^0) = w$

soit $v \in \text{Sol}_\varphi(w)$ (ie $\varphi(v) = w$)

on a $\varphi(v - v^0) = \varphi(v) - \varphi(v^0)$

$$= w - w = 0_w$$


$$\Rightarrow v - v_0 \in \ker \varphi$$

$$v \in v_0 + \ker \varphi$$

$$\text{Sol}_{\varphi}(w) \subset v_0 + \ker \varphi$$

Reciproquement on mq

$$v_0 + \ker \varphi \subset \text{Sol}_{\varphi}(w)$$



COROLLAIRE 9.2. Avec les notations precedente, on a en particulier

- si $\dim \ker \varphi = 0$ (cad. $\ker \varphi = \{\mathbf{0}_V\}$ et φ est injective), $\text{Sol}_\varphi(w)$ possede 0 ou 1 element pour tout w .
- si $\text{rg} \varphi = \dim \varphi(V) = \dim(W)$ (cad. $\varphi(V) = W$ et φ est surjective) $\text{Sol}_\varphi(w)$ possede au moins un element pour tout w .
- Si $\dim V = \dim W$ et que φ est ou bien injective ou bien surjective, φ est bijective et pour tout w , $\text{Sol}_\varphi(w)$ possede exactement un element.

Traduction Matricielle

$$\varphi: V \longrightarrow W \quad \text{Sol}_\varphi(w) = ?$$

$$B \subset V \quad B' \subset W$$

$$M = \text{mat}_{B'B}(\varphi) \quad \text{si } v = \sum_{j=1}^d v_j e_j$$

$$w = \sum_{i=1}^d w_i f_i$$

le système $\varphi(v) = w$

est équivalent au système

$$M \cdot \text{Col}(v) = \begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} & \cdots & m_{1d} \\ m_{21} & m_{22} & \cdots & m_{2d} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ m_{d1} & m_{12} & \cdots & m_{d'd} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_{d'} \end{pmatrix} = \text{Col}(w)$$

$$\text{Col}(v) = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_d \end{pmatrix} \quad \text{Col}(w) = \begin{pmatrix} w_1 \\ \vdots \\ w_{d'} \end{pmatrix}$$

$$T_1 \begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} & \cdots & m_{1d} \\ m_{21} & m_{22} & \cdots & m_{2d} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ m_{d1} & m_{12} & \cdots & m_{d'd} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_d \end{pmatrix} = T_1 \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_{d'} \end{pmatrix}$$

$$T_2 T_1 \begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} & \cdots & m_{1d} \\ m_{21} & m_{22} & \cdots & m_{2d} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ m_{d1} & m_{12} & \cdots & m_{d'd} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_d \end{pmatrix} = T_2 T_1 \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_{d'} \end{pmatrix}$$

$$T_{n \times \dots \times T_1} \begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} & \cdots & m_{1d} \\ m_{21} & m_{22} & \cdots & m_{2d} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ m_{d1} & m_{12} & \cdots & m_{d'd} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_d \end{pmatrix} = T_{n \times \dots \times T_1} \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_{d'} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & * & 0 & 0 & * & * \\ 0 & 0 & 1 & 0 & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 1 & * & * \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \vdots \\ w'_r \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \Pi_n \cdot \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_{d'} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \vdots \\ w'_r \\ w'_{r+1} \\ \vdots \end{pmatrix}.$$

$d_1 \quad d_2 \quad d_3 \quad \widehat{R}$

à la fin on obtient une matrice réduite R

et un vecteur colonne $\begin{pmatrix} w'_1 \\ \vdots \\ w'_{d'} \end{pmatrix}$ ou les

w'_i sont des cl des $w_1, \dots, w_{d'}$

en particulier on obtient pour $i > r$

$$w_i' = 0 \quad i > r$$

Cet ensemble d'équation $w_i' = 0 \quad i = r+1, \dots, d'$
défini une représentation cartésienne
de $\text{Im } \varphi$. si le vecteur w choisi
ne vérifie pas $w_i' = 0 \quad i = r+1, \dots, d'$
alors $w \notin \text{Im } \varphi$ et $\text{Sol}_\varphi(w) = \emptyset$

DÉFINITION 9.7. Les inconnues v_{j_i} pour j_i , $1 \leq i \leq r$ étant un echelon sont appelées inconnues principales du système. Les inconnues v_j pour $j \leq d$ qui n'est pas un echelon sont appelées inconnues libres du système.

Pour résoudre le système (si tous les $w_i' = 0$
 $i = r+1 \dots d$)

il suffit de fixer arbitrairement les valeurs
des inconnues libres et de résoudre
le système suivant les inconnues principale,
reduit

en particulier si $w = 0_N$ cela va donner
tous les elt's du noyau.

Operations on the
Columns

DÉFINITION 9.8. *Les opérations élémentaires sur les colonnes d'une matrice sont les applications suivantes de $M_{d' \times d}(K)$ vers $M_{d' \times d}(K)$: pour $i, j \in \{1, \dots, d\}$ et $\lambda \in K^\times$ et $\mu \in K$*

(I) *Transposition: Echanger deux colonnes $i \neq j \leq d'$ de M :*

$$C_i \longleftrightarrow C_j$$

(II) *Dilatation: Multiplier la i -eme colonne par un scalaire $\lambda \neq 0$:*

$$C_i \rightarrow \lambda.C_i.$$

(III) *Combinaison Lineaire: Additionner a la colonne i un multiple scalaire de la la j -ieme colonne pour $i \neq j$: $\mu \in K$*

$$C_i \rightarrow C_i + \mu C_j$$

Ces transformations sont appelees transformations elementaires sur les colonnes d'une matrice.

PROPOSITION 9.10. *Une operation elementaire sur les colonnes d'une matrice M equivaut a une operation elementaire sur les lignes de $M' = {}^t M$.*

Une telle transformation est donnee par multiplication par la droite

$$M \mapsto M.{}^t T_l$$

par la transposee d'une matrice de transformation elementaire sur les lignes T_l en composant les operations suivantes

$$M \mapsto {}^t M \mapsto T_l.{}^t M \mapsto {}^t T_l.{}^t M = M.{}^t T_l = M.T_c.$$

Il en resulte que des transformations sont bijectives et lineaires.

DÉFINITION 9.9. On dit que N est colonne-equivalente à M ssi il existe une suite de transformations elementaires qui transforme M en N .

– De maniere equivalente, N est colonne-equivalente à M ssi il existe une suite finie de matrices de transformations elementaires (sur les colonnes) telle que N est obtenue à partir de M par multiplications à droite par cette suite de matrices.

PROPOSITION 9.11. La relation etre "colonne-equivalente" est une relation d'equivalence sur $M_{d' \times d}(K)$.

– De plus deux matrices M, N colonnes-equivalentes sont equivalentes au sens de la notion d'equivalence de deux matrices de la Definition 7.10. En particulier elles ont meme rang.

THE
MATRIX



Determinants

That object was to present the subject as a continuous chain of arguments, separated from all accessories of explanation or illustration, a form which I venture to think better suited for a treatise on exact science than the semi-colloquial semi-logical form often adopted by Mathematical writers.

Lewis Carroll (1867)

Prelude : $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$

$$\det M := ad - bc. \quad \det MN = \det M \times \det N$$

$$M \in GL_2(K) \text{ssi } \det M \neq 0_K$$

et alors

$$M^{-1} = \frac{1}{\det M} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

$$M \times \frac{1}{\det M} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = I_2$$

Formes multilinéaires

DÉFINITION 10.1. Soit V un K -espace vectoriel et $n \geq 1$ un entier. Une forme multilinéaire en n variables sur V est une application

$$\Lambda : \begin{array}{ccc} V^n & \mapsto & K \\ (v_1, \dots, v_n) & \mapsto & \Lambda(v_1, \dots, v_n) \end{array}$$

telle que pour tout $i = 1, \dots, n$ et tout choix de $n - 1$ vecteurs $v_j \in V$, $j \neq i$, l'application Λ "restreinte à la i -ième composante"

$$v_i \in V \mapsto \Lambda(v_1, \dots, v_i, \dots, v_n) \in K$$

est linéaire:

$$\Lambda(v_1, \dots, \lambda.v_i + v'_i, \dots, v_n) = \lambda.\Lambda(v_1, \dots, v_i, \dots, v_n) + \Lambda(v_1, \dots, v'_i, \dots, v_n).$$

L'ensemble des formes multilinéaires en n variables sur V est noté

$$\text{Mult}^{(n)}(V, K) \text{ ou bien } (V^*)^{\otimes n} (\text{notation "produit tensoriel"}).$$

Exemples: $n=1$ $\Lambda: v \mapsto \Lambda(v) \in K$
 Λ est une forme linéaire.

$n=2$: forme bilinéaire.

$V=K$. soit $\Lambda(x_1, x_2) = x_1 x_2$

$$\begin{aligned}\Lambda(\lambda x_1 + x'_1, x_2) &= (\lambda x_1 + x'_1) \cdot x_2 = \lambda x_1 x_2 + x'_1 x_2 \\ &= \lambda \Lambda(x_1, x_2) + \Lambda(x'_1, x_2)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Lambda(x_1, \lambda x_2 + x'_2) &= x_1 (\lambda x_2 + x'_2) = \lambda x_1 x_2 + x_1 x'_2 \\ &= \lambda \Lambda(x_1, x_2) + \Lambda(x_1, x'_2)\end{aligned}$$

$$n=2 \quad V = K^2$$

Produit scalaire euclidien

$$K^2 \times K^2 \longrightarrow K$$

$$((x_1, y_1), (x_2, y_2)) \longrightarrow (x_1, y_1) \cdot (x_2, y_2) := x_1 x_2 + y_1 y_2$$

$$\lambda \in K$$

$$\begin{aligned} & (\lambda x_1 + x'_1, \lambda y_1 + y'_1) \cdot (x_2, y_2) \\ & (\lambda (x_1, y_1) + (x'_1, y'_1)) \cdot (x_2, y_2) \\ & = (\lambda x_1 + x'_1) \cdot x_2 + (\lambda y_1 + y'_1) y_2 \end{aligned}$$

$$= \lambda x_1 x_2 + x_1' x_2 + \lambda y_1 y_2 + y_1' y_2$$

$$= \lambda (x_1, y_1) \cdot (x_2, y_2) + (x_1', y_1') \cdot (x_2, y_2)$$

Idem pour la variable (x_2, y_2)

Produit alterné: $\wedge$

$$K^2 \times K^2 \longrightarrow K$$

$$\begin{aligned} ((x_1, y_1), (x_2, y_2)) &\longrightarrow (x_1, y_1) \wedge (x_2, y_2) \\ &= x_1 y_2 - y_1 x_2 (= \\ &\quad \det \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{pmatrix}) \end{aligned}$$

On a que

$$\left(\lambda(x_1, y_1) + (x'_1, y'_1) \right) \wedge (x_2, y_2) =$$

$$\lambda(x_1, y_1) \wedge (x_2, y_2) + (x'_1, y'_1) \wedge (x_2, y_2)$$

$$\text{et } (x_1, y_1) \wedge \left(\lambda(x_2, y_2) + (x'_2, y'_2) \right) =$$

$$\lambda(x_1, y_1) \wedge (x_2, y_2) + (x_1, y_1) \wedge (x'_2, y'_2)$$

Exemple General: $n \geq 1$

$$l_1, \dots, l_n: V \rightarrow K$$

$$l_1 \otimes l_2 \otimes \dots \otimes l_n: V^n \rightarrow K$$
$$(v_1, \dots, v_n) \mapsto l_1(v_1) \times l_2(v_2) \times \dots \times l_n(v_n)$$

comme les l_i sont lineaire en la
variable v_i $l_1 \otimes \dots \otimes l_n$ est multilinaire.

W/ THE
WARNING

$$l_1 \otimes l_2 \otimes \dots \otimes l_n \neq l_1 \dots l_n$$

$$l_1 \dots l_n: v \longrightarrow l_1(v) l_2(v) \dots l_n(v)$$

$$l_1 \otimes l_2 \otimes \dots \otimes l_n \neq l_2 \otimes l_1 \otimes \dots \otimes l_n$$

$$l_1(v_1) l_2(v_2) \dots l_n(v_n) \neq l_2(v_1) l_1(v_2) l_3(v_3) \dots l_n(v_n)$$

THE WARNING

previous $n=2$

on peut considérer

la CL sur le K-ev V^2

$$\begin{aligned}\lambda(v_1, v_2) + (v'_1, v'_2) &= (\lambda v_1, \lambda v_2) + (v'_1, v'_2) \\ &= (\lambda v_1 + v'_1, \lambda v_2 + v'_2)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}l_1 \otimes l_2 (\lambda(v_1, v_2) + (v'_1, v'_2)) \\ = l_1 \otimes l_2 (\lambda v_1 + v'_1, \lambda v_2 + v'_2)\end{aligned}$$

$$= \ell_1(\lambda v_1 + v'_1) \ell_2(\lambda v_2 + v'_2)$$

$$= (\lambda \ell_1(v_1) + \ell_1(v'_1)) \times (\lambda \ell_2(v_2) + \ell_2(v'_2))$$

$$= \lambda^2 \ell_1(v_1) \ell_2(v_2) + \lambda \ell_1(v_1) \ell_2(v'_2)$$

$$+ \lambda \ell_1(v'_1) \ell_2(v_2) + \ell_1(v'_1) \ell_2(v'_2)$$

$$= \lambda^2 \ell_1 \otimes \ell_2(v_1, v_2) + \lambda \ell_1 \otimes \ell_2(v_1, v'_2)$$

$$+ \lambda \ell_1 \otimes \ell_2(v'_1, v_2) + \ell_1 \otimes \ell_2(v'_1, v'_2)$$

$$\neq \lambda l_1 \otimes l_2(v_1, v_2) + l_1 \otimes l_2(v'_1, v'_2)$$

$l_1 \otimes l_2$ n'est pas une forme linéaire
sur $l' \in V \quad V \times V$.

⚡ THE WARNING ⚡

$\wedge : V^n \rightarrow K$ multilinear

$$\wedge (\lambda_1 v_1 + \mu_1 v'_1, \dots, \lambda_n v_n + \mu_n v'_n) = ?$$

= somme de 2^n termes

$$= \sum_{I \sqcup J = \{1, \dots, n\}} \lambda_I \mu_J \wedge (v_I, v'_J)$$

où $I \cup J$ désigne une partition de
 $\{1, \dots, n\}$ en 2 sous-ensemble disjoints
 (il y a 2^n telles partitions)

$$\lambda_I = \prod_{i \in I} \lambda_i \quad \lambda_J = \prod_{j \in J} \mu_j$$

$$(v_I, v_J') = (v_1'', \dots, v_n'') \quad \begin{aligned} v_i'' &= v_i \text{ si } i \in I \\ &= v_i' \text{ si } i \in J \end{aligned}$$

$$\wedge(v_I, v_J') = \wedge(v_1'', \dots, v_n'')$$

Example $I \cup J = \{1\} \cup \{2, \dots, n\}$

$$(v_I, v_J) = (v_1, v_2', \dots, v_n')$$

$I \cup J = \{2, \dots, n\} \cup \{1\}$

$$(v_I, v_J) = (v_1', v_2, \dots, v_n)$$

PROPOSITION 10.1. L'ensemble $\text{Mult}^{(n)}(V, K) = (V^*)^{\otimes n}$ des formes multilinéaires en n variables est un K -espace vectoriel quand on le muni de l'addition et de la multiplication par les scalaires usuelle pour les fonctions à valeurs dans K : $\forall \Lambda, \Xi \in (V^*)^{\otimes n}$

$$(\lambda \Lambda + \Xi)(v_1, \dots, v_n) = \lambda \Lambda(v_1, \dots, v_n) + \Xi(v_1, \dots, v_n).$$

Preuve. $n=2$ $\Lambda, \Xi \in \text{Mult}^{(2)}(V, K)$

$$\Lambda: (v_1, v_2) \mapsto \Lambda(v_1, v_2) \quad \lambda \in K$$

$$\Xi: (v_1, v_2) \mapsto \Xi(v_1, v_2)$$

$$(\lambda \Lambda + \Xi): (v_1, v_2) \mapsto \lambda \Lambda(v_1, v_2) + \Xi(v_1, v_2)$$

On veut mq $\lambda \Lambda + \Xi$ est lineaire
en v_1 et en v_2

$$(\lambda \Lambda + \Xi)(\rho v_1 + v'_1, v_2)$$

$$= \lambda \Lambda(\rho v_1 + v'_1, v_2) + \Xi(\rho v_1 + v'_1, v_2)$$

$$= \lambda \rho \Lambda(v_1, v_2) + \lambda \Lambda(v'_1, v_2)$$

$$+ \rho \Xi(v_1, v_2) + \Xi(v'_1, v_2)$$

$$= \rho (\lambda \Lambda + \Xi)(v_1, v_2) + (\lambda \Lambda + \Xi)(v'_1, v_2)$$

Utilisant que Λ et Ξ sont linéaires en v_2 on montre que

$$(\lambda \Lambda + \Xi)(v_1, \rho v_2 + v'_2) = \rho (\lambda \Lambda + \Xi)(v_1, v_2) + (\lambda \Lambda + \Xi)(v_1, v'_2)$$

THÉORÈME 10.1 (Dimension et base de l'espace des formes multilinéaires). Soit $d = \dim V$, $\mathcal{B} = \{e_1, \dots, e_d\} \subset V$ une base et $\mathcal{B}^* = \{e_1^*, \dots, e_d^*\} \subset V^*$ la base duale. Alors $V^{*\otimes n}$ est de dimension finie égale à d^n ; une base de $V^{*\otimes n}$ est donnée par l'ensemble des formes multilinéaires de la forme

$$e_{j_1}^* \otimes \dots \otimes e_{j_n}^*, \text{ quand } j_1, \dots, j_n \text{ parcourent } \{1, \dots, d\}.$$

On note cette base

$$(\mathcal{B}^*)^{\otimes n} = \{e_{j_1}^* \otimes \dots \otimes e_{j_n}^*, (j_1, \dots, j_n) \in [1, d]^n\}.$$

Pour tout $\Lambda \in (V^*)^{\otimes n}$ on a la décomposition

$$\Lambda = \sum_{j_1, \dots, j_n \leq d} \Lambda(e_{j_1}, \dots, e_{j_n}) e_{j_1}^* \otimes \dots \otimes e_{j_n}^*$$

$$\text{Si } n=2 \quad (\mathcal{B}^*)^{\otimes 2} = \{e_1^* \otimes e_1^*, e_1^* \otimes e_2^*, e_2^* \otimes e_1^*, e_2^* \otimes e_2^*\}$$

Preuve: cas $n=2$ soit $\Lambda \in \text{Mult}^{(2)}(V, K)$

$$\Lambda: (v_1, v_2) \rightarrow \Lambda(v_1, v_2)$$

$$v_i = \sum_{j=1}^d x_{ij} e_j$$

$$\wedge \left(\sum_{j=1}^d x_{1j} e_j, \sum_{j'=1}^d x_{2j'} e_{j'} \right)$$

$$= \sum_{j=1}^d x_{1j} \wedge \left(e_j, \sum_{j'=1}^d x_{2j'} e_{j'} \right)$$

$$= \sum_{j=1}^d x_{1j} \sum_{j'=1}^d x_{2j'} \wedge (e_j, e_{j'})$$

$$= \sum_{j=1}^d \sum_{j'=1}^d x_{1,j} x_{2,j'} \wedge (e_j, e_{j'})$$

$$x_{1,j} x_{2,j'} = e_j^*(v_1) e_{j'}^*(v_2)$$

$$= e_j^* \otimes e_{j'}^*(v_1, v_2)$$

$$\wedge(v_1, v_2) = \sum_{j=1}^d \sum_{j'=1}^d \wedge(e_j, e_{j'}) e_j^* \otimes e_{j'}^*(v_1, v_2)$$

$$\Lambda = \sum_{d=1}^d \sum_{d'=1}^d \Lambda(e_d, e_{d'}) e_d^* \otimes e_{d'}^*$$

$\Rightarrow$ la famille de forme bilinéaire
 $\{ e_d^* \otimes e_{d'}^* \mid d, d' \leq d \}$ est génératrice
 de $(V^*)^{\otimes 2}$

Mq la famille est libre.

Soient $\lambda_{d,d'}$ $d, d' \leq d$ des
scalaires

$$\overset{tq}{\Lambda} = \sum_{d,d' \leq d} \lambda_{d,d'} e_d^* \otimes e_{d'}^* = \underline{0}$$

On veut mq ls $\lambda_{d,d'} = 0$

on a pour tout $i, i' \leq d$

$$\Lambda(e_i, e_{i'}) = \sum_{d, d' \leq d} \lambda_{dd'} e_d^*(e_i) e_{d'}^*(e_{i'}) \\ = 0$$

$$e_d^*(e_i) = \delta_{i=d}$$

$$0 = \lambda_{ii'} 1 \times 1 = \lambda_{ii'} \quad \forall i, i' \leq d.$$

la famille $\{e_d^* \otimes e_{d'}^*, d, d' \leq d\}$ est libre.

n general: on procede par recurrence
sur n .

On suppose que

$$(B^*)^{\otimes n} = \left\{ e_{d_1} \otimes e_{d_2} \otimes \dots \otimes e_{d_n} \mid (d_1, \dots, d_n) \in [1, d]^n \right\}$$

est une base de $(V^*)^{\otimes n}$ et on va
mq c'est vrai pour $(B^*)^{\otimes n+1} \subset (V^*)^{\otimes n+1}$

Generatrice: soit

$$\Lambda: (v_1, \dots, v_n, v_{n+1}) \rightarrow \Lambda(v_1, \dots, v_n, v_{n+1})$$

une forme multilin en $n+1$ variables

On fixe $v_{n+1} \in V$ et on considère

$$\Lambda_{v_{n+1}}: (v_1, \dots, v_n) \rightarrow \Lambda(v_1, \dots, v_n, v_{n+1})$$

C'est une forme multilin en n variables

On a vu que

$$\Lambda_{V_{n+1}} = \sum_{(j_1, \dots, j_n) \in [1, d]^n} \Lambda_{V_{n+1}}(e_{j_1}, \dots, e_{j_n}) \times \\ \cdot e_{j_1}^* \otimes \dots \otimes e_{j_n}^*$$

que vaut $\Lambda_{V_{n+1}}(e_{j_1}, \dots, e_{j_n})$?

$$= \Lambda(e_{j_1}, \dots, e_{j_n}, v_{n+1})$$

pour tout choix de $(j_1, \dots, j_n) \in [1, d]^n$

la fonction

$\Lambda(e_{j_1}, \dots, e_{j_n}, v_{n+1})$ est lineaire

en v_{n+1}

$$\Lambda(e_{j_1}, \dots, e_{j_n}, v_{n+1}) = \sum_{j_{n+1}=1}^d \Lambda(e_{j_1}, \dots, e_{j_n}, e_{j_{n+1}}) e_{j_{n+1}}^*(v_{n+1})$$

On a donc m q

$$\wedge = \sum_{(d_1, \dots, d_n) \in [1, d]^n} e_{d_1}^{\otimes 2} \otimes \dots \otimes e_{d_n}^{\otimes 2} \otimes$$

$$\sum_{d_{n+1}=1}^d \wedge(e_{d_1}, \dots, e_{d_n}, e_{d_{n+1}}) \cdot e_{d_{n+1}}^{\otimes 2}$$

$$= \sum_{(d_1, \dots, d_n, d_{n+1}) \in [1, d]^{n+1}} \wedge(e_{d_1}, \dots, e_{d_n}, e_{d_{n+1}}) e_{d_1}^{\otimes 2} \otimes \dots \otimes e_{d_n}^{\otimes 2} \otimes e_{d_{n+1}}^{\otimes 2}$$

On montre que la famille $(B^*)^{\otimes n+1}$
est libre : soient d^{n+1} scalaires

$$\lambda_{d_1, \dots, d_{n+1}} \text{ pour } (d_1, \dots, d_{n+1}) \in [d]^{n+1}$$

$$\Lambda := \sum_{(d_1, \dots, d_{n+1})} \lambda_{d_1, \dots, d_{n+1}} e_{d_1}^* \otimes \dots \otimes e_{d_{n+1}}^* = \underline{0}$$

on évalue Λ en $(e_{i_1}, \dots, e_{i_{n+1}})$


$$\Lambda(e_{i_1}, \dots, e_{i_{n+1}}) = \sum_{(j_1, \dots, j_{n+1})} \lambda_{j_1 \dots j_{n+1}}^*$$

||

$$e_{j_1}^* \otimes \dots \otimes e_{j_{n+1}}^* (e_{i_1}, \dots, e_{i_{n+1}})$$

$$= \delta_{j_1=i_1} \delta_{j_2=i_2} \dots \delta_{j_{n+1}=i_{n+1}}$$

$$0 = \lambda_{i_1 i_2 \dots i_{n+1}} \quad \forall (i_1, \dots, i_{n+1}) \in [d]^{n+1}$$



Formes Symétriques/
Alternées

$$V = K^2 \quad v_1 = (x_1, y_1) \quad v_2 = (x_2, y_2)$$

Produit Scalaire:

$$v_1 \cdot v_2 = x_1 x_2 + y_1 y_2 = x_2 x_1 + y_2 y_1$$

il est symétrique

$$v_1 \cdot v_2 = v_2 \cdot v_1$$

Produit Alterne : est alterne

$$v_1 \wedge v_2 = x_1 y_2 - y_1 x_2$$

$$= y_2 x_1 - x_2 y_1$$

$$= -(x_2 y_1 - y_2 x_1)$$

$$= -v_2 \wedge v_1$$

$$\Lambda \in \text{Mult}^{(n)}(V) \quad \forall j \in \{1, \dots, n\}$$

a partir de la fabrique une nouvelle
forme multilin

$$(ij). \Lambda : (v_1, \dots, \underset{i}{v_i}, \dots, \underset{j}{v_j}, \dots, v_n)$$

$$\rightarrow \Lambda(v_1, \dots, \underset{i}{v_j}, \dots, \underset{j}{v_i}, \dots, v_n)$$

On dit que Λ est symétrique si

$$\forall i \neq j \in \{1, \dots, n\}$$

$$(ij)\Lambda = \Lambda.$$

Alternée si

$$\forall i \neq j \in \{1, \dots, n\}$$

$$(ij)\Lambda = -\Lambda.$$