

Algèbre linéaire

Examen

Partie commune

Automne 2021

Réponses

Pour les questions à **choix multiple**, on comptera :

- +3 points si la réponse est correcte,
- 0 point si la question n'est pas répondue
- 1 point si la réponse est incorrecte.

Pour les questions de type **vrai-faux**, on comptera :

- +1 point si la réponse est correcte,
- 0 point si la question n'est pas répondue
- 1 point si la réponse est incorrecte.

Notation

- Pour une matrice A , a_{ij} désigne l'élément situé sur la ligne i et la colonne j de la matrice.
- Pour un vecteur $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$, x_i désigne la i -ème coordonnée de \vec{x} .
- I_m désigne la matrice identité de taille $m \times m$.
- \mathbb{P}_n désigne l'espace vectoriel des polynômes réels de degré inférieur ou égal à n .
- $\mathbb{R}^{m \times n}$ désigne l'espace vectoriel des matrices de taille $m \times n$ à coefficients réels.
- Pour $\vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n$, le produit scalaire est défini par $\vec{x} \cdot \vec{y} = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n$.

Première partie, questions à choix multiple

Pour chaque question marquer la case correspondante à la réponse correcte sans faire de ratures. Il n'y a qu'**une seule** réponse correcte par question.

Question 1 : La droite qui approxime le mieux au sens des moindres carrés les points $(-2, -4)$, $(0, 0)$, $(1, 4)$, $(2, 1)$, $(4, -1)$ est

$y = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}x$

$y = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}x$

$y = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}x$

$y = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}x$

Question 2 : L'inverse $B = A^{-1}$ de la matrice

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -2 \\ -3 & 4 & 7 \\ 4 & -2 & -7 \end{bmatrix}$$

est telle que

$b_{32} = -2$

$b_{32} = 2$

$b_{32} = 1$

$b_{32} = -1$

Question 3 : Soit A une matrice symétrique telle que

$$\vec{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \vec{v}_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{et} \quad \vec{v}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

sont des vecteurs propres de A associés, respectivement, aux trois valeurs propres -5 , 5 et 2 . Alors

$A = \begin{bmatrix} 5 & -4 & 0 \\ -4 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & -4 \\ 0 & 2 & 0 \\ -4 & 0 & -3 \end{bmatrix}$

$A = \begin{bmatrix} 3 & -4 & 0 \\ -4 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

$A = \begin{bmatrix} 5 & 0 & -4 \\ 0 & 2 & 0 \\ -4 & 0 & -5 \end{bmatrix}$

Question 4 : Soit a un paramètre réel. Le système

$$\begin{cases} x + ay + 3z = 0 \\ y - 2z = 3 \\ -x + 4y + 4z = a \\ (a+6)y + 3z = a^2 \end{cases}$$

admet au moins une solution si et seulement si $a \in \{-2, 3\}$

admet une infinité de solutions si et seulement si $a = -2$

n'admet pas de solution si et seulement si $a \in \{-2, 3\}$

admet une unique solution si et seulement si $a = 3$

Question 5 : Soit

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & 1 & 5 \\ 1 & 3 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 5 & 0 & 4 \end{bmatrix}.$$

Alors on a

- $\det(A) = 6$ $\det(A) = -24$ $\det(A) = 0$ $\det(A) = 48$

Question 6 : Soit R la forme échelonnée réduite de la matrice

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 1 & 5 & 2 & 5 \\ 3 & 3 & -6 & -2 \end{bmatrix}.$$

Alors on a

- $r_{13} = -4$ $r_{13} = 0$ $r_{13} = -2$ $r_{13} = -3$

Question 7 : Soit $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'application linéaire définie par $T(\vec{x}) = A\vec{x}$ pour tout $\vec{x} \in \mathbb{R}^4$, où

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 5 & 4 & 4 \\ 2 & 1 & 1 & 5 \\ 4 & 3 & -5 & 3 \end{bmatrix}.$$

Alors

- T est injective et surjective
 T est injective mais n'est pas surjective
 T est surjective mais n'est pas injective
 T n'est ni injective ni surjective

Question 8 : Soient \mathcal{E} la base canonique de \mathbb{R}^4 et $\mathcal{B} = (1+t^2, 2-t^3, t, 1-t^2)$ une base ordonnée de \mathbb{P}_3 . Soit $T : \mathbb{P}_3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ l'application linéaire définie par

$$T(a + bt + ct^2 + dt^3) = \begin{bmatrix} a-b \\ a-c \\ 2a+c \\ 2b+d \end{bmatrix}.$$

Soit A la matrice de T par rapport à la base \mathcal{B} de \mathbb{P}_3 et la base \mathcal{E} de \mathbb{R}^4 , telle que $[T(p)]_{\mathcal{E}} = A[p]_{\mathcal{B}}$ pour tout $p \in \mathbb{P}_3$. Alors on a

- $a_{34} = -1$ $a_{34} = 2$ $a_{34} = -2$ $a_{34} = 1$

Question 9 : Soient

$$\mathcal{B} = \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right) \quad \text{et} \quad \mathcal{C} = \left(\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} \right)$$

deux bases ordonnées de \mathbb{R}^3 . Alors la matrice de changement de base P de la base \mathcal{B} vers la base \mathcal{C} , telle que $[\vec{x}]_{\mathcal{C}} = P[\vec{x}]_{\mathcal{B}}$ pour tout $\vec{x} \in \mathbb{R}^3$, est

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ | <input type="checkbox"/> $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ |
| <input checked="" type="checkbox"/> $\begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & -3 & 5 \end{bmatrix}$ | <input type="checkbox"/> $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & -3 \\ -3 & 1 & 5 \end{bmatrix}$ |

Question 10 : Soient

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & -8 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \end{bmatrix} \quad \text{et} \quad \vec{b} = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

Une solution $\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3$ du système $A\vec{x} = \vec{b}$ a pour première composante

- $x_1 = -1$ $x_1 = 5$ $x_1 = 4$ $x_1 = -2$

Question 11 : Soit

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{et} \quad \vec{b} = \begin{bmatrix} 5 \\ 20 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Alors la solution au sens des moindres carrés $\hat{x} = \begin{bmatrix} \hat{x}_1 \\ \hat{x}_2 \end{bmatrix}$ de l'équation $A\vec{x} = \vec{b}$ satisfait

- $\hat{x}_1 = -3$ $\hat{x}_1 = -6$ $\hat{x}_1 = 6$ $\hat{x}_1 = 3$

Question 12 : Soit

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

L'ensemble des valeurs propres réelles de A est

- $\{0\}$ $\{-1, 0\}$ $\{0, 1\}$ $\{-1, 1\}$

Question 13 : L'algorithme de Gram-Schmidt appliqué aux colonnes de la matrice

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 1 & -1 & 6 \\ 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -6 \end{bmatrix}$$

fournit une base orthonormée de $\text{Im}(A)$ donnée par les vecteurs

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> $\frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \frac{1}{3} \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \frac{1}{\sqrt{42}} \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ -6 \end{bmatrix}$ | <input checked="" type="checkbox"/> $\frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \frac{1}{3} \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \frac{1}{\sqrt{18}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ -4 \end{bmatrix}$ |
| <input type="checkbox"/> $\frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}, \frac{1}{\sqrt{18}} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ -4 \end{bmatrix}$ | <input type="checkbox"/> $\frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}, \frac{1}{\sqrt{42}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \\ -6 \end{bmatrix}$ |

Question 14 : La projection orthogonale du vecteur $\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \\ 5 \end{bmatrix}$ sur le sous-espace vectoriel engendré par la première et la deuxième colonne de la matrice A de la Question 13 est le vecteur

- | | | | |
|--|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> $\begin{bmatrix} 21 \\ -15 \\ 3 \\ 9 \end{bmatrix}$ | <input type="checkbox"/> $\begin{bmatrix} 39 \\ -9 \\ 15 \\ 12 \end{bmatrix}$ | <input type="checkbox"/> $\begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ | <input checked="" type="checkbox"/> $\begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ |
|--|---|---|---|

Question 15 : La matrice A de la Question 13 possède une décomposition QR telle que

- $r_{33} = 3\sqrt{2}$ $r_{33} = 2\sqrt{3}$ $r_{33} = \sqrt{3}$ $r_{33} = \sqrt{2}$

Question 16 : Soient

$$\vec{w}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \\ -5 \end{bmatrix}, \quad \vec{w}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}$$

et $W = \text{Vect}\{\vec{w}_1, \vec{w}_2\} \subset \mathbb{R}^4$. Alors une base du complément orthogonal W^\perp est donnée par les vecteurs

$\begin{bmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} -6 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} -6 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

Deuxième partie, questions du type Vrai ou Faux

Pour chaque question, marquer (sans faire de ratures) la case VRAI si l'affirmation est **toujours vraie** ou la case FAUX si elle **n'est pas toujours vraie** (c'est-à-dire, si elle est parfois fausse).

Question 17 : Si $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_k\}$ est une famille de vecteurs linéairement indépendants d'un espace vectoriel V et si $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ sont des nombres réels arbitraires, alors $\{\alpha_1 \vec{v}_1, \alpha_2 \vec{v}_2, \dots, \alpha_k \vec{v}_k\}$ est aussi une famille de vecteurs linéairement indépendants de V .

VRAI FAUX

Question 18 : Les polynômes

$$p_1(t) = t^2, \quad p_2(t) = t^2 + t^3, \quad p_3(t) = t - t^3, \quad p_4(t) = 1 + t^3$$

forment une base de \mathbb{P}_3 .

VRAI FAUX

Question 19 : Si A est une matrice de taille 3×3 avec valeurs propres 1, 2 et 4, alors $\det(A) = 8$.

VRAI FAUX

Question 20 : Si A et B sont deux matrices inversibles de taille $n \times n$, alors AB est inversible et

$$(AB)^{-1} = A^{-1}B^{-1}.$$

VRAI FAUX

Question 21 : La matrice

$$A = \begin{bmatrix} 10 & -11 & 11 \\ 11 & 11 & -11 \\ -11 & 11 & 10 \end{bmatrix}$$

est diagonalisable à l'aide d'une base de vecteurs propres orthonormés.

VRAI FAUX

Question 22 : Soit A une matrice de taille 6×6 . Si le polynôme caractéristique de A est $p(\lambda) = (\lambda - 3)^2 \lambda^4$, alors la dimension de l'espace propre associé à $\lambda = 3$ est toujours égale à 2.

VRAI FAUX

Question 23 : Soit V un espace vectoriel tel que $\dim V = n$. Si S est un ensemble de vecteurs linéairement indépendants de V , alors S est une base de V .

VRAI FAUX

Question 24 : Soit A une matrice de taille 9×5 . Si $\dim(\text{Ker}(A)) = 5$, alors $\dim(\text{Im}(A)) = 0$.

VRAI FAUX

Question 25 : Soient

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 5 \\ 3 & 1 & 5 & -1 & -3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{et} \quad R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Sachant que R est la forme échelonnée réduite de la matrice A , alors les vecteurs

$$\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{et} \quad \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

forment une base de $\text{Ker}(A)$.

VRAI FAUX

Question 26 : Soit A la matrice de la Question 25. Alors les vecteurs

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

forment une base de $\text{Im}(A)$.

VRAI FAUX

Question 27 : Soient \vec{u} et \vec{v} deux vecteurs de \mathbb{R}^n . Si $\|\vec{u} + \vec{v}\| = \|\vec{u} - \vec{v}\|$, alors \vec{u} et \vec{v} sont orthogonaux.

VRAI FAUX

Question 28 : Soit \mathcal{B} la base ordonnée de \mathbb{P}_2 donnée par $\mathcal{B} = (1, 1+t, 1+t^2)$ et soit $p \in \mathbb{P}_2$ défini par $p(t) = 3 + 4t + 5t^2$. Alors la première coordonnée de p par rapport à la base \mathcal{B} est -6 .

VRAI FAUX

Question 29 : Si A est une matrice de taille $n \times n$, alors $\det(A^\top) = -\det(A)$.

VRAI FAUX

Question 30 : L'ensemble $\{p \in \mathbb{P}_4 \mid p(t) = at^4 \text{ pour un certain } a \in \mathbb{R}\}$ est un sous-espace vectoriel de \mathbb{P}_4 .

VRAI FAUX

Question 31 : Soient

$$\vec{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \vec{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \vec{y} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Alors $\vec{w} = \vec{u} + \vec{v}$ est l'élément de $W = \text{Vect}\{\vec{u}, \vec{v}\} \subset \mathbb{R}^3$ le plus proche de \vec{y} .

VRAI FAUX

Question 32 : Soient V et W deux espaces vectoriels et soit $T : V \rightarrow W$ une application linéaire. Si $\dim W < \dim V$, alors T n'est pas injective.

VRAI FAUX