

Série 11 (Corrigé)

Exercice 1

- a) Trouver un vecteur non nul orthogonal à $\mathbf{z} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Solution : $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ car $\mathbf{z} \cdot \mathbf{x} = 0$.

- b) Soient $\mathbf{u} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{w} = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix}$. Calculer

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}, \quad \mathbf{v} \cdot \mathbf{w}, \quad \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{w}}{\|\mathbf{v}\|}, \quad \frac{1}{\mathbf{w} \cdot \mathbf{w}} \mathbf{w}, \quad \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{w}}{\|\mathbf{v}\|} \mathbf{v}.$$

Solution : $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 7$, $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = 10$, $\frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{w}}{\|\mathbf{v}\|} = \frac{39}{\sqrt{5}}$, $\frac{1}{\mathbf{w} \cdot \mathbf{w}} \mathbf{w} = \frac{1}{61} \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{w}}{\|\mathbf{v}\|} \mathbf{v} = \frac{39}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

- c) Calculer la distance entre \mathbf{u} et \mathbf{v} et la distance entre \mathbf{u} et \mathbf{w} .

Solution : $\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\| = \sqrt{17}$, $\|\mathbf{u} - \mathbf{w}\| = 3$.

- d) Calculer les vecteurs unitaires correspondant à $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ (pointant dans la même direction que le vecteur original).

Solution : $\tilde{\mathbf{u}} = \frac{1}{\sqrt{26}} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\tilde{\mathbf{v}} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\tilde{\mathbf{w}} = \frac{1}{\sqrt{61}} \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Exercice 2

Soient $\mathbf{u}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{u}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$.

- a) Vérifier que \mathbf{u}_1 et \mathbf{u}_2 sont orthogonaux.

- b) Calculer la projection orthogonale $\mathbf{p}_W(\mathbf{v})$ de \mathbf{v} sur $W = \text{Span}\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$.

- c) Donner la décomposition $\mathbf{v} = \mathbf{z} + \mathbf{p}_W(\mathbf{v})$, où $\mathbf{z} \in W^\perp$.

Solution :

a) Un calcul direct donne $\mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{u}_2 = 1 \cdot (-1) + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 = 0$.

b)

$$\mathbf{p}_W(\mathbf{v}) = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}_1}{\mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{u}_1} \mathbf{u}_1 + \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}_2}{\mathbf{u}_2 \cdot \mathbf{u}_2} \mathbf{u}_2 = \frac{6}{3} \mathbf{u}_1 + \frac{-3}{2} \mathbf{u}_2 = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{3}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7/2 \\ 1/2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

c) $\mathbf{v} = \mathbf{z} + \mathbf{p}_W(\mathbf{v})$, où $\mathbf{p}_W(\mathbf{v})$ est calculé dans b),

$$\text{et } \mathbf{z} \text{ est donné par } \mathbf{z} = \mathbf{v} - \mathbf{p}_W(\mathbf{v}) = \begin{pmatrix} -1/2 \\ -1/2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Remarque : on peut vérifier que $\mathbf{z} \cdot \mathbf{u}_1 = \mathbf{z} \cdot \mathbf{u}_2 = 0$, c'est-à-dire $\mathbf{z} \in W^\perp$.

$$\text{Même question pour } \mathbf{u}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{u}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \mathbf{u}_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Solution :

a) Les vecteurs $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3$ sont orthogonaux : $\mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{u}_2 = \mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{u}_3 = \mathbf{u}_2 \cdot \mathbf{u}_3 = 0$.

b)

$$\mathbf{p}_W(\mathbf{v}) = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}_1}{\mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{u}_1} \mathbf{u}_1 + \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}_2}{\mathbf{u}_2 \cdot \mathbf{u}_2} \mathbf{u}_2 + \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}_3}{\mathbf{u}_3 \cdot \mathbf{u}_3} \mathbf{u}_3 = \mathbf{u}_1 + 2\mathbf{u}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

$$c) \mathbf{z} = \mathbf{v} - \mathbf{p}_W(\mathbf{v}) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Remarque : $\mathbf{v} = \mathbf{p}_W(\mathbf{v})$ équivaut à $\mathbf{v} \in W$.

$$\text{Même question pour } \mathbf{u}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \mathbf{u}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}, \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Solution :

a) Les vecteurs $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$ sont orthogonaux : $\mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{u}_2 = 0$.

b)

$$\mathbf{p}_W(\mathbf{v}) = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}_1}{\mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{u}_1} \mathbf{u}_1 + \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}_2}{\mathbf{u}_2 \cdot \mathbf{u}_2} \mathbf{u}_2 = \frac{2}{7} \mathbf{u}_1 = \begin{pmatrix} 2/7 \\ 4/7 \\ 6/7 \end{pmatrix}.$$

$$c) \mathbf{z} = \mathbf{v} - \mathbf{p}_W(\mathbf{v}) = \begin{pmatrix} 5/7 \\ -4/7 \\ 1/7 \end{pmatrix}.$$

Exercice 3

Soient $\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n\}$ et $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ deux bases orthonormales de \mathbb{R}^n . On définit les matrices de taille $n \times n$, $U = (\mathbf{u}_1 \dots \mathbf{u}_n)$ et $V = (\mathbf{v}_1 \dots \mathbf{v}_n)$. Montrer que $U^T U = I_n$, $V^T V = I_n$ et que UV est inversible.

Solution :

$$\begin{aligned} U^T U &= \begin{pmatrix} \mathbf{u}_1^T \\ \mathbf{u}_2^T \\ \vdots \\ \mathbf{u}_n^T \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{u}_1 & \mathbf{u}_2 & \cdots & \mathbf{u}_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{u}_1^T \mathbf{u}_1 & \mathbf{u}_1^T \mathbf{u}_2 & \cdots & \mathbf{u}_1^T \mathbf{u}_n \\ \mathbf{u}_2^T \mathbf{u}_1 & \mathbf{u}_2^T \mathbf{u}_2 & \cdots & \mathbf{u}_2^T \mathbf{u}_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{u}_n^T \mathbf{u}_1 & \mathbf{u}_n^T \mathbf{u}_2 & \cdots & \mathbf{u}_n^T \mathbf{u}_n \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} = I_n. \end{aligned}$$

Comme $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ vérifient les mêmes hypothèses, on a également $V^T V = I_n$. UV est inversible car $V^T U^T UV = V^T V = I_n$, d'où $(UV)^{-1} = V^T U^T$.

Exercice 4

Appliquer la méthode de Gram-Schmidt pour orthogonaliser les bases de sous-espaces vectoriels de \mathbb{R}^n suivantes.

a) $\{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2\}$ base d'un s.e.v. de \mathbb{R}^3 , avec $\mathbf{w}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{w}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Solution : La méthode de Gram-Schmidt donne $\mathbf{u}_1 = \mathbf{w}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$,

$$\mathbf{u}_2 = \mathbf{w}_2 - \frac{\mathbf{w}_2 \cdot \mathbf{u}_1}{\mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{u}_1} \mathbf{u}_1 = \begin{pmatrix} -1/3 \\ 2/3 \\ -1/3 \end{pmatrix}.$$

b) $\{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \mathbf{w}_3\}$ base d'un s.e.v. de \mathbb{R}^4 , avec $\mathbf{w}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{w}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\mathbf{w}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Solution : La méthode de Gram-Schmidt donne $\mathbf{u}_1 = \mathbf{w}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$,

$$\mathbf{u}_2 = \mathbf{w}_2 - \frac{\mathbf{w}_2 \cdot \mathbf{u}_1}{\mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{u}_1} \mathbf{u}_1 = \begin{pmatrix} -1/3 \\ 0 \\ 1/3 \\ -1/3 \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{u}_3 = \mathbf{w}_3 - \frac{\mathbf{w}_3 \cdot \mathbf{u}_1}{\mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{u}_1} \mathbf{u}_1 - \frac{\mathbf{w}_3 \cdot \mathbf{u}_2}{\mathbf{u}_2 \cdot \mathbf{u}_2} \mathbf{u}_2 = \begin{pmatrix} -1/5 \\ 2/5 \\ -2/5 \\ -1/5 \end{pmatrix}.$$

c) Donner une base orthonormale pour a) et b).

$$\textbf{Solution : Pour a)} : \mathbf{u}_1/\|\mathbf{u}_1\| = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \mathbf{u}_2/\|\mathbf{u}_2\| = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Pour b)} : \mathbf{u}_1/\|\mathbf{u}_1\| = \frac{1}{\sqrt{15}} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \mathbf{u}_2/\|\mathbf{u}_2\| = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \mathbf{u}_3/\|\mathbf{u}_3\| = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Exercice 5

Soit W un sous-espace vectoriel de \mathbb{R}^n . Soit $\{\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_q\}$ une base orthogonale de W . Soit $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r\}$ une base orthogonale de W^\perp .

Montrer que $\{\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_q, \mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r\}$ est orthogonale et prouver la relation

$$\dim W + \dim W^\perp = n.$$

Solution : Le vecteur \mathbf{w}_i et le vecteur \mathbf{v}_j sont orthogonaux pour tous $i = 1 \dots q$, $j = 1 \dots r$ car ils appartiennent aux espaces orthogonaux W et W^\perp . Les vecteurs \mathbf{w}_i sont orthogonaux entre eux car ils constituent une base orthogonale, de même pour les vecteurs \mathbf{v}_j . Ainsi, n'importe quels deux vecteurs dans la famille $\{\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_q, \mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r\}$ sont orthogonaux : c'est une famille orthogonale.

Montrons la relation $\dim W + \dim W^\perp = n$.

Méthode 1 : La famille $\{\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_q, \mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r\}$ est orthogonale donc linéairement indépendante. De plus tout vecteur $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ se décompose sous la forme $\mathbf{v} = \mathbf{z} + \mathbf{w}$ avec $\mathbf{z} \in W^\perp$ et $\mathbf{w} = \mathbf{p}_W(\mathbf{v}) \in W$. Or $\mathbf{z} \in W^\perp$ peut être décomposé dans la base $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r\}$ de W^\perp et $\mathbf{p}_W(\mathbf{v}) \in W$ peut être décomposé dans la base $\{\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_q\}$ de W . Ainsi, tout vecteur $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ peut se décomposer selon la famille linéairement indépendante $\{\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_q, \mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r\}$ qui est donc une base de \mathbb{R}^n . Par conséquent $q + r = n$.

Méthode 2 : Appliquons le théorème du rang à l'application linéaire \mathbf{p}_W :

$$\dim \text{Im } \mathbf{p}_W + \dim \text{Ker } \mathbf{p}_W = n.$$

Or la projection vérifie $\text{Ker } \mathbf{p}_W = W^\perp$ et $\text{Im } \mathbf{p}_W = W$, d'où le résultat.

Exercice 6

Déterminer la solution au sens des moindres carrés de $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$

a) en utilisant l'équation normale lorsque

$$\text{i) } A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -2 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix},$$

Solution : L'équation normale $A^T A \mathbf{x} = A^T \mathbf{b}$ est $\begin{pmatrix} 12 & 8 \\ 8 & 10 \end{pmatrix} \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 10 \\ 10 \end{pmatrix}$, elle a pour solution $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 5/14 \\ 5/7 \end{pmatrix}$.

ii) $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$,

Solution : $A^T A = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 11 \end{pmatrix}$, $A^T \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 6 \\ 14 \end{pmatrix}$, $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

iii) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 6 \\ 6 \end{pmatrix}$;

Solution : $A^T A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, $A^T \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 14 \\ -5 \end{pmatrix}$, $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1/3 \\ 14/3 \\ -5/3 \end{pmatrix}$.

b) en utilisant la méthode QR lorsque

i) $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 2 \\ 0 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$,

Solution : Les colonnes de la matrice A sont linéairement indépendantes, donc décomposer A selon $A = QR$ et résoudre $R\mathbf{x} = Q^T \mathbf{b}$ est équivalent à résoudre l'équation normale. La décomposition a été calculée à l'exercice 4 (question c)) et est donnée par

$$Q = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1/\sqrt{2} & 3/\sqrt{22} \\ 0 & -2/\sqrt{22} \\ -1/\sqrt{2} & 3/\sqrt{22} \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 0 & \sqrt{11/2} \end{pmatrix}.$$

L'approximation \mathbf{x} au sens des moindres carrés est la solution du système $R\mathbf{x} = Q^T \mathbf{b}$, où $Q^T \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ -2/\sqrt{22} \end{pmatrix}$. Ainsi, $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1/11 \\ -2/11 \end{pmatrix}$.

ii) $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Solution : Ici de même, les colonnes de la matrice A sont linéairement indépendantes, donc décomposer A selon $A = QR$ et résoudre $R\mathbf{x} = Q^T \mathbf{b}$ est équivalent à résoudre l'équation normale. La décomposition a également été calculée à l'exercice 4 (question a)) et est donnée par

$$Q = \begin{pmatrix} 2/3 & -1/3 \\ 2/3 & 2/3 \\ 1/3 & -2/3 \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

On trouve $Q^T \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1/3 \\ -2/3 \end{pmatrix}$, $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 11/9 \\ -2/3 \end{pmatrix}$.

Exercice 7

Soit A une matrice de taille $m \times n$.

- a) Montrer que $\text{Ker}A = \text{Ker}(A^T A)$.

Solution : Si $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$, alors $A^T A\mathbf{x} = \mathbf{0}$, ce qui montre $\text{Ker}A \subset \text{Ker}(A^T A)$. Soit maintenant \mathbf{x} tel que $A^T A\mathbf{x} = \mathbf{0}$, alors $\mathbf{x}^T A^T A\mathbf{x} = 0$. Or, $\mathbf{x}^T A^T A\mathbf{x} = (\mathbf{Ax})^T (\mathbf{Ax}) = \|\mathbf{Ax}\|^2$. Ainsi, $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$, et $\text{Ker}(A^T A) \subset \text{Ker}A$. D'où l'égalité.

- b) Montrer que $A^T A$ est inversible si et seulement si les colonnes de A sont linéairement indépendantes.

Solution : Les colonnes de $A = (\mathbf{a}_1 \dots \mathbf{a}_n)$ sont linéairement indépendantes

$$\iff (\beta_1 \mathbf{a}_1 + \dots + \beta_n \mathbf{a}_n = \mathbf{0} \Rightarrow \beta_1 = \dots = \beta_n = 0)$$

$$\iff \left(A \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix} = \mathbf{0} \Rightarrow \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix} = \mathbf{0} \right)$$

$$\iff \text{Ker}A = \{\mathbf{0}\}.$$

Ainsi, d'après a), les colonnes de A sont linéairement indépendantes si et seulement si $\text{Ker}(A^T A) = \{\mathbf{0}\}$, c'est-à-dire la matrice (carrée) $A^T A$ est inversible.

Exercice 8

Soit

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 4 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 12 \\ -13 \\ 10 \end{bmatrix}.$$

La solution au sens des moindres carrés $\hat{\mathbf{x}} = (\hat{x}_1, \hat{x}_2)$ du système $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ est telle que

$$\square \hat{x}_2 = -4$$

$$\square \hat{x}_2 = 3$$

$$\square \hat{x}_2 = -3$$

$$\square \hat{x}_2 = 4$$

Solution : On pose l'équation normale :

$$A^T A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 24 \end{pmatrix}; \quad A^T b = \begin{pmatrix} 9 \\ -96 \end{pmatrix}$$

On obtient $\hat{x}_2 = -4$.

Exercice 9

Soit $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$. Donner l'ensemble W des vecteurs orthogonaux à \mathbf{v} . Est-ce un espace vectoriel ? Si oui, trouver une base de W . Justifier les réponses.

Solution :

W est un sous-espace vectoriel de \mathbb{R}^3 : Vérification de la définition :

i) $\mathbf{0} \in W$: $\langle \mathbf{0}, \mathbf{v} \rangle = 0$ (en vérité, cela est vrai pour n'importe quel vecteur !), donc le vecteur nul est orthogonal à \mathbf{v} , c'est à dire dans W

ii) soient \mathbf{w}_1 et \mathbf{w}_2 dans W et $\lambda \in \mathbb{R}$. Est-ce que $\mathbf{w}_1 + \lambda \mathbf{w}_2$ est dans W , i.e orthogonal à \mathbf{v} ? On peut répondre par linéarité du produit scalaire :

$$\langle \mathbf{w}_1 + \lambda \mathbf{w}_2, \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{w}_1, \mathbf{v} \rangle \langle \lambda \mathbf{w}_2, \mathbf{v} \rangle = 0 + \lambda 0 = 0$$

Remarque : ici on ne peut pas utiliser directement le résultats du cours qui dit que l'orthogonal d'un sous-espace vectoriel est un sous-espace vectoriel car l'ensemble $\{\mathbf{v}\}$ n'est pas un sous-espace vectoriel

Pour trouver une base de W , il faut d'abord remarquer que l'ensemble des vecteurs \mathbf{x} orthogonaux à \mathbf{v} satifont l'équation linéaire $\mathbf{v}^T \mathbf{x} = 0$. En définissant $B = \mathbf{v}^T = (3 \ 2 \ 1)$ on constate donc que $W = \ker B$.

Ceci nous permet entre autre de conclure que W est en sous-espace vectoriel car le noyau d'une matrice en est un. Pour trouver $\ker B$ on écrit la matrice augmentée suivante

$$(3 \ 2 \ 1 \mid 0)$$

et on constate qu'il y a 2 variables libre, x_1 et x_2 . Pour trouver une base du noyau il faut faire les deux choix $x_1 = 1, x_2 = 0$ et $x_1 = 0, x_2 = 1$; une base de W est donc formé par les vecteurs

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} -\frac{2}{3} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ et } \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Exercice 10

Parmi les matrices suivantes, indiquer celles qui sont diagonalisables (toujours en justifiant), et le cas échéant, diagonaliser ces matrices et exhiber les vecteurs propres.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 3 \\ -4 & -6 & -3 \\ 3 & 3 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & -3 & 0 \\ -1 & -2 & 0 & -3 \end{pmatrix},$$

$$D = \begin{pmatrix} 4 & 0 & -2 \\ 2 & 5 & 4 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}, E = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Solution :

- A n'est pas diagonalisable. Ses valeurs propres sont : $-2, -2, 1$. La dimension de l'espace propre pour $\lambda = -2$ est seulement 1 alors que la multiplicité est 2.
- B est diagonalisable. En effet, les valeurs propres sont distinctes :

$$2, 1, \frac{1}{2}(7 + \sqrt{13}), \frac{1}{2}(7 - \sqrt{13}).$$

En général, les vecteurs propres sont tels que $(B - \lambda I)\mathbf{v} = \mathbf{0}$. On voit facilement que $\mathbf{v}_1 = (1 \ 0 \ 0 \ 0)^T$ et $\mathbf{v}_2 = (0 \ 1 \ 0 \ 0)^T$ sont des vecteurs propres associés aux valeurs propres $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 1$. Pour trouver les vecteurs propres \mathbf{v}_3 et \mathbf{v}_4 et pour $\lambda_3 = \frac{1}{2}(7 + \sqrt{13})$ et $\lambda_4 = \frac{1}{2}(7 - \sqrt{13})$ nous devons mettre les matrices $(B - \lambda_3 I)$ et $(B - \lambda_4 I)$ sous forme échelonnée réduite. En général on a

$$\begin{aligned} & \left(\begin{array}{cccc} 2-\lambda & 0 & 4 & 1 \\ 0 & 1-\lambda & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 4-\lambda & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 3-\lambda \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc} 2-\lambda & 0 & 4 & 1 \\ 0 & 1-\lambda & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 4-\lambda & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3-\lambda - \frac{3}{4-\lambda} \end{array} \right) \\ & \sim \left(\begin{array}{cccc} 1 & 0 & \frac{4}{2-\lambda} & \frac{1}{2-\lambda} \\ 0 & 1 & \frac{2}{1-\lambda} & \frac{3}{1-\lambda} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{(4-\lambda)} \\ 0 & 0 & 0 & (3-\lambda)(4-\lambda)-3 \end{array} \right) \end{aligned}$$

On peut voir que $(3-\lambda)(4-\lambda)-3=0$ pour $\lambda = \lambda_3$ et $\lambda = \lambda_4$. Il suffit de choisir la troisième composante égal à 1 et les autres composantes sont facilement dérivées :

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} -\frac{4-(4-\lambda)}{2-\lambda} \\ -\frac{2-3(4-\lambda)}{1-\lambda} \\ 1 \\ -(4-\lambda) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{\lambda}{2-\lambda} \\ \frac{10-3\lambda}{1-\lambda} \\ 1 \\ -4+\lambda \end{pmatrix}.$$

Donc, on obtient

$$\mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} -2 + \sqrt{13} \\ -17 + 7\sqrt{13} \\ 6 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_4 = \begin{pmatrix} -2 - \sqrt{13} \\ -17 - 7\sqrt{13} \\ 6 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Maintenant, si $\widetilde{D} = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4)$ et $P = (\mathbf{v}_1 \ \mathbf{v}_2 \ \mathbf{v}_3 \ \mathbf{v}_4)$, on a $B = P\widetilde{D}P^{-1}$.

- C est diagonalisable. Valeurs propres : $5, 5, -3, -3$. Vecteurs propres associés : $\mathbf{v}_1 = (-16 \ 4 \ 0 \ 1)^T, \mathbf{v}_2 = (-8 \ 4 \ 1 \ 0)^T, \mathbf{v}_3 = (0 \ 0 \ 1 \ 0)^T, \mathbf{v}_4 = (0 \ 0 \ 0 \ 1)^T$. Remarque : les vecteurs propres $(0 \ 0 \ 1 \ 0)^T, (0 \ 0 \ 0 \ 1)^T$ étaient faciles à deviner.

Maintenant, si $\widetilde{D} = \text{diag}(5, 5, -3, -3)$ et $P = (\mathbf{v}_1 \ \mathbf{v}_2 \ \mathbf{v}_3 \ \mathbf{v}_4)$, on a $C = P\widetilde{D}P^{-1}$.

- D est diagonalisable. Valeurs propres : 5, 5, 4.
Vecteurs propres associés : $\mathbf{v}_1 = (-2 \ 0 \ 1)^T$, $\mathbf{v}_2 = (0 \ 1 \ 0)^T$, $\mathbf{v}_3 = (-1 \ 2 \ 0)^T$.
Remarque : le vecteur propre $(0 \ 1 \ 0)^T$ était facile à deviner.
Maintenant, si $\tilde{D} = \text{diag}(5, 5, 4)$ et $P = (\mathbf{v}_1 \ \mathbf{v}_2 \ \mathbf{v}_3)$, on a $D = P\tilde{D}P^{-1}$.
- E n'est pas diagonalisable. Valeurs propres : 0, 0. La dimension de l'espace propre associé à $\lambda = 0$ est seulement 1 (voir exercice 5).

Exercice 11

Soient

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} i \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

et A une matrice 3×3 à coefficients réels telle que :

- $\lambda_1 = 4$ est une valeur propre associée au vecteur \mathbf{v}_1
 - $\lambda_2 = 2e^{i\pi/3}$ est une valeur propre associée au vecteur \mathbf{v}_2
- (a) Calculer le polynôme caractéristique de A dans \mathbb{R} et dans \mathbb{C} . Est-ce que A est diagonalisable dans \mathbb{R} ou dans \mathbb{C} ?
- (b) Calculer D et P tels que $A = PDP^{-1}$ avec D diagonale et P inversible.
- (c) Calculez P^{-1} .
- (d) Optionnel : calculez A

Rappel :

$$e^{i\pi/3} + e^{-i\pi/3} = 2 \frac{e^{i\pi/3} + e^{-i\pi/3}}{2} = 2 \cos(\pi/3) = 2 \frac{1}{2} = 1$$

$$-ie^{i\pi/3} + ie^{-i\pi/3} = -i2 \frac{e^{i\pi/3} - e^{-i\pi/3}}{2} = 2 \sin(\pi/3) = 2 \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$$

Solution :

Analyse du problème :

Puisque les coefficients de A sont réels, et λ_2 ne l'est pas, on peut trouver un couple de valeur et vecteur propre en prenant le complexe conjugué de l'égalité $A\mathbf{v}_2 = \lambda_2\mathbf{v}_2$:

$$\overline{A\mathbf{v}_2} = \overline{\lambda_2\mathbf{v}_2} \Leftrightarrow \overline{A}\overline{\mathbf{v}_2} = \overline{\lambda_2}\overline{\mathbf{v}_2} \Leftrightarrow A\overline{\mathbf{v}_2} = \overline{\lambda_2}\overline{\mathbf{v}_2}$$

Donc $\overline{\lambda_2}$ et $\overline{\mathbf{v}_2}$ sont une valeur et vecteur propre de A .

- (a) Puisque $\lambda_3 := \overline{\lambda_2} \neq \lambda_2$, nous avons trois valeurs propres de A , qui est donc diagonalisable dans \mathbb{C} :

- $\lambda_3 = 2e^{-i\pi/3}$ est une valeur propre associée au vecteur $\mathbf{v}_3 = \overline{\mathbf{v}_2} = \begin{pmatrix} -i \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

Le polynôme caractéristique de A est

$$c_A(t) = (\lambda_1 - t)(\lambda_2 - t)(\lambda_3 - t) = (\lambda_1 - 4)(\lambda_2 \lambda_3 - (\lambda_2 + \lambda_1)t - t^2) = (\lambda_1 - 4)(4 - 4 \cos \frac{\pi}{3}t - t^2)$$

Il n'y a qu'une valeur propre réelle, donc A n'est pas diagonalisable dans \mathbb{R} .

- (b) On la propriété suivante : $A = PDP^{-1}$ où D est diagonale et P inversible, avec les valeurs propres sur la diagonale de D et les vecteurs propres associés dans les colonnes de P (dans le même ordre, mais on a le choix, p.ex. "3,2,1").

$$D = \begin{pmatrix} 2e^{i\pi/3} & 0 & 0 \\ 0 & 2e^{-i\pi/3} & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \text{ et } P = \begin{pmatrix} i & -i & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- (c) L'inverse de P se calcule en calculant la forme échelonnée réduite de la matrice $(P|I_3)$:

$$\begin{array}{l} \left(\begin{array}{ccc|ccc} i & -i & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{-iL_1; L_2 - L_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & -i & -i & 0 & 0 \\ 0 & 2 & i & i & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{L_1 + iL_3; L_2 - iL_3} \\ \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & -i & 0 & i \\ 0 & 2 & 0 & i & 1 & -i \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\frac{1}{2}L_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & -i & 0 & i \\ 0 & 1 & 0 & i/2 & 1/2 & -i/2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{L_1 + L_2} \\ \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -i/2 & 1/2 & i/2 \\ 0 & 1 & 0 & i/2 & 1/2 & -i/2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \Rightarrow P^{-1} = \begin{pmatrix} -i/2 & 1/2 & i/2 \\ i/2 & 1/2 & -i/2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{array}$$

- (d) On peut donc calculer $A = PDP^{-1} =$

$$\begin{aligned} P \begin{pmatrix} 2e^{i\pi/3} & 0 & 0 \\ 0 & 2e^{-i\pi/3} & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -i/2 & 1/2 & i/2 \\ i/2 & 1/2 & -i/2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} i & -i & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -ie^{i\pi/3} & e^{i\pi/3} & ie^{i\pi/3} \\ ie^{-i\pi/3} & e^{-i\pi/3} & -ie^{-i\pi/3} \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} e^{i\pi/3} + e^{-i\pi/3} & ie^{i\pi/3} - ie^{-i\pi/3} & -e^{i\pi/3} - e^{-i\pi/3} + 4 \\ -ie^{i\pi/3} + ie^{-i\pi/3} & e^{i\pi/3} + e^{-i\pi/3} & ie^{i\pi/3} - ie^{-i\pi/3} \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -\sqrt{3} & 3 \\ \sqrt{3} & 1 & -\sqrt{3} \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Exercice 12

Considérons les matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 1 & 1 - \sqrt{3} & 1 + \sqrt{3} \\ 1 + \sqrt{3} & 1 & 1 - \sqrt{3} \\ 1 - \sqrt{3} & 1 + \sqrt{3} & 1 \end{pmatrix}.$$

- (a) Calculer les valeurs propres complexes de A et de B .

- (b) Calculer les vecteurs propres complexes de A et de B .

- (c) Soit P et Q les matrice dont les colonnes sont des vecteurs propres de A et de B , respectivement (associés à des valeurs propres différentes). Calculer $P^{-1}AP$ et $Q^{-1}BQ$ et interpréter le résultat.

Solution :

(a) Comme le polynôme caractéristique de A est donné par

$$P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_2) = \det \begin{pmatrix} 1 - \lambda & -1 \\ 1 & 1 - \lambda \end{pmatrix} = (1 - \lambda)^2 + 1 = \lambda^2 - 2\lambda + 2,$$

les racines (i.e. les valeurs propres complexes de A) sont $1 - i$ et $1 + i$.

De façon analogue, on calcule le polynôme caractéristique de B , qui est donné par

$$P_B(\lambda) = \det(B - \lambda I_3) = \begin{pmatrix} 1 - \lambda & 1 - \sqrt{3} & 1 + \sqrt{3} \\ 1 + \sqrt{3} & 1 - \lambda & 1 - \sqrt{3} \\ 1 - \sqrt{3} & 1 + \sqrt{3} & 1 - \lambda \end{pmatrix} = -\lambda^3 + 3\lambda^2 - 9\lambda + 27.$$

En regardant les diviseurs de 27, on voit que $\lambda = 3$ est une racine. Si l'on divise $P_B(\lambda)$ par $\lambda - 3$ on trouve

$$P_B(\lambda) = -\lambda^3 + 3\lambda^2 - 9\lambda + 27 = -(\lambda - 3)(\lambda^2 + 9).$$

En conséquence, les racines de $P_B(\lambda)$ (i.e. les valeurs propres complexes de B) sont 3 , $-3i$ et $3i$.

- (b) On va calculer les vecteurs propres associés aux valeurs propres $1 - i$ et $1 + i$ de A . Pour $\lambda = 1 \pm i$, l'espace propre est donné par le noyau des matrices ligne-équivalentes données par

$$A - (1 \pm i) I_2 = \begin{pmatrix} \mp i & -1 \\ 1 & \mp i \end{pmatrix} \xrightarrow{L_2 \leftrightarrow L_1} \begin{pmatrix} 1 & \mp i \\ \mp i & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 + iL_1} \begin{pmatrix} 1 & \mp i \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

ce qui nous dit que

$$\begin{aligned} E_{1\pm i} &= \text{Ker}(A - (1 \pm i) I_2) = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} : x_1 = \pm ix_2 \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} \pm ix_2 \\ x_2 \end{pmatrix} : x_2 \in \mathbb{C} \right\} \\ &= \left\{ x_2 \begin{pmatrix} \pm i \\ 1 \end{pmatrix} : x_2 \in \mathbb{C} \right\} = \text{Vect} \left\{ \begin{pmatrix} \pm i \\ 1 \end{pmatrix} \right\}. \end{aligned}$$

On va calculer les vecteurs propres associés aux valeurs propres 3 , $-3i$ et $3i$ de B .

Pour $\lambda = 3$, l'espace propre est donné par le noyau des matrices ligne-équivalentes données par

$$\begin{aligned} B - 3I_2 &= \begin{pmatrix} -2 & 1 - \sqrt{3} & 1 + \sqrt{3} \\ 1 + \sqrt{3} & -2 & 1 - \sqrt{3} \\ 1 - \sqrt{3} & 1 + \sqrt{3} & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow[L_1 \leftarrow -\frac{1}{2}L_1]{L_2 \leftarrow -\frac{1}{2}L_2} \begin{pmatrix} 1 & \frac{\sqrt{3}-1}{2} & -\frac{1+\sqrt{3}}{2} \\ 1 + \sqrt{3} & -2 & 1 - \sqrt{3} \\ 1 - \sqrt{3} & 1 + \sqrt{3} & -2 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow[L_2 \leftarrow L_2 - (1 + \sqrt{3})L_1]{L_3 \leftarrow L_3 - (1 - \sqrt{3})L_1} \begin{pmatrix} 1 & \frac{\sqrt{3}-1}{2} & -\frac{1+\sqrt{3}}{2} \\ 0 & -3 & 3 \\ 0 & 3 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 + L_2]{L_2 \leftarrow -\frac{1}{3}L_2} \begin{pmatrix} 1 & \frac{\sqrt{3}-1}{2} & -\frac{1+\sqrt{3}}{2} \\ 0 & -3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow[L_2 \leftarrow -\frac{1}{3}L_2]{L_1 \leftarrow L_1 - \frac{\sqrt{3}-1}{2}L_2} \begin{pmatrix} 1 & \frac{\sqrt{3}-1}{2} & -\frac{1+\sqrt{3}}{2} \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

ce qui nous dit que

$$\begin{aligned} E_3 &= \text{Ker}(B - 3\mathbf{I}_3) = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} : x_1 = x_2 = x_3 \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} x_3 \\ x_3 \\ x_3 \end{pmatrix} : x_3 \in \mathbb{C} \right\} \\ &= \left\{ x_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} : x_3 \in \mathbb{C} \right\} = \text{Vect} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}. \end{aligned}$$

Pour $\lambda = \pm 3i$, l'espace propre est donné par le noyau des matrices ligne-équivalentes données par

$$\begin{aligned} B - (\pm 3i)\mathbf{I}_3 &= \begin{pmatrix} 1 \mp 3i & 1 - \sqrt{3} & 1 + \sqrt{3} \\ 1 + \sqrt{3} & 1 \mp 3i & 1 - \sqrt{3} \\ 1 - \sqrt{3} & 1 + \sqrt{3} & 1 \mp 3i \end{pmatrix} \xrightarrow[L_1 \leftarrow \frac{1 \pm 3i}{10} L_1]{} \begin{pmatrix} 1 & (1 - \sqrt{3})\frac{1 \pm 3i}{10} & (1 + \sqrt{3})\frac{1 \pm 3i}{10} \\ 1 + \sqrt{3} & 1 \mp 3i & 1 - \sqrt{3} \\ 1 - \sqrt{3} & 1 + \sqrt{3} & 1 \mp 3i \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow[L_2 \leftarrow L_2 - (1 + \sqrt{3})L_1 \quad L_3 \leftarrow L_3 - (1 - \sqrt{3})L_1]{} \begin{pmatrix} 1 & (1 - \sqrt{3})\frac{1 \pm 3i}{10} & (1 + \sqrt{3})\frac{1 \pm 3i}{10} \\ 0 & \frac{6}{5}(1 \mp 2i) & \frac{3}{5}(1 \mp 2i)(1 \mp \sqrt{3}i) \\ 0 & \frac{3}{5}(1 \mp 2i)(1 \pm \sqrt{3}i) & \frac{6}{5}(1 \mp 2i) \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow[L_2 \leftarrow \frac{5}{6(1 \mp 2i)} L_2 \quad L_3 \leftarrow \frac{5}{3(1 \mp 2i)} L_3]{} \begin{pmatrix} 1 & (1 - \sqrt{3})\frac{1 \pm 3i}{10} & (1 + \sqrt{3})\frac{1 \pm 3i}{10} \\ 0 & 1 & \frac{1 \mp \sqrt{3}i}{2} \\ 0 & (1 \pm \sqrt{3}i) & 2 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow[L_1 \leftarrow L_1 - \frac{(1 - \sqrt{3})(1 \pm 3i)}{10} L_2 \quad L_3 \leftarrow L_3 - (1 \pm \sqrt{3}i)L_2]{} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{1 \pm \sqrt{3}i}{2} \\ 0 & 1 & \frac{1 \mp \sqrt{3}i}{2} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

ce qui nous dit que

$$\begin{aligned} E_{\pm 3i} &= \text{Ker}(B - (\pm 3i)\mathbf{I}_3) = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} : x_1 = \frac{-1 \mp \sqrt{3}i}{2}x_3, x_2 = \frac{-1 \pm \sqrt{3}i}{2}x_3 \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} \frac{-1 \mp \sqrt{3}i}{2}x_3 \\ \frac{-1 \pm \sqrt{3}i}{2}x_3 \\ x_3 \end{pmatrix} : x_3 \in \mathbb{C} \right\} \\ &= \left\{ x_3 \begin{pmatrix} \frac{-1 \mp \sqrt{3}i}{2} \\ \frac{-1 \pm \sqrt{3}i}{2} \\ 1 \end{pmatrix} : x_3 \in \mathbb{C} \right\} = \text{Vect} \left\{ \begin{pmatrix} \frac{-1 \mp \sqrt{3}i}{2} \\ \frac{-1 \pm \sqrt{3}i}{2} \\ 1 \end{pmatrix} \right\}. \end{aligned}$$

(c) D'après l'item précédent on a que

$$P = \begin{pmatrix} -i & i \\ 1 & 1 \end{pmatrix},$$

ce qui donne

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 - i & 0 \\ 0 & 1 + i \end{pmatrix},$$

et

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & \frac{-1+i\sqrt{3}}{2} & \frac{-1-i\sqrt{3}}{2} \\ 1 & \frac{-1-i\sqrt{3}}{2} & \frac{-1+i\sqrt{3}}{2} \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

ce qui donne

$$Q^{-1}AQ = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -3i & 0 \\ 0 & 0 & 3i \end{pmatrix}.$$

Partiellement en classe

(Ces exercices seront sur les slides.)

Exercice 131

Vrai/Faux : Soit A une matrice de taille $m \times n$, alors chaque ligne de A est orthogonale à tous les vecteurs dans $\ker(A)$ (par rapport au produit scalaire usuel de \mathbb{R}^n).

1. Vrai
2. Faux

Exercice 141

Vrai/Faux : Soit V un espace vectoriel et $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ un produit scalaire. Soient $u, v \in V$ deux vecteurs. Alors u et v sont orthogonaux si et seulement si la distance entre u et v est la même que la distance entre u et $-v$.

- A. Vrai
- B. Faux

Exercice 151

Vrai/faux : Une matrice de dimension $m \times n$ avec $m > n$ peut avoir des lignes orthogonales.

- A. Vrai
- B. Faux

Exercice 161

Si U est une matrice $m \times n$ avec des colonnes orthonormales, alors $U^T U = I_n$.

- A. Vrai
- B. Faux : $UU^T = I_m$
- C. Pas toujours, ça dépend

Exercice 171

Appliquer la méthode de Gram-Schmidt pour orthogonaliser la base $\{w_1, w_2\}$ du sous-espace vectoriel $V = \text{Vect}\{w_1, w_2\} \subset \mathbb{R}^3$, où $w_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$, $w_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

Exercice 181

Appliquer la méthode de Gram-Schmidt pour orthogonaliser la base $\{w_1, w_2\}$ du sous-espace vectoriel $V = \text{Vect}\{w_1, w_2, w_3\} \subset \mathbb{R}^4$, où

$$w_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, w_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, w_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Exercice 191

Vrai/Faux : Soit A une matrice $n \times n$ telle que les colonnes de A forment une base orthonormée de \mathbb{R}^n . Alors A est inversible.

- A. Vrai
- B. Faux

Exercice 201

Vrai/Faux : Soit A une matrice $n \times n$ telle que les colonnes de A forment une base orthonormée de \mathbb{R}^n . Alors les lignes de A forment une base orthonormée.

- A. Vrai
- B. Faux

Exercice 211

Soit B une matrice de taille $m \times n$ telle que $BB^T = I_m$. Alors

- A. Les colonnes de B forment un ensemble orthonormé
- B. Les lignes de B forment un ensemble orthonormé
- C. $B^T B = I_n$
- D. B est inversible

Exercice 221

Soient $x_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $x_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $x_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \\ 7 \end{pmatrix}$ et soit $W = \text{Vect}\{x_1, x_2, x_3\}$. Le procédé

d'orthogonalisation de Gram-Schmidt, sans normalisation et sans changer l'ordre, appliqué à la base $\{x_1, x_2, x_3\}$ de W nous fournit une base orthogonale $\{v_1, v_2, v_3\}$ de W , où

- A. $v_3 = x_3 - v_1 + v_2$

B. $v_3 = x_3 + 9v_1 - 9v_2$

C. $v_3 = x_3 + v_1 - v_2$

D. $v_3 = x_3$

Exercice 231

Soit W un sous-espace vectoriel de \mathbb{R}^n . Si v est dans W^\perp et dans W , alors $v = 0$.

A. Vrai

B. Faux

Exercice 241

Soit $W = \text{Vect} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$. Trouver une base de W^\perp .

Exercice 251

Vrai/faux : Soit W un sous-espace vectoriel de \mathbb{R}^n . Si $y \in W$, alors sa projection orthogonale sur W est $p_W(y) = y$.

A. Vrai

B. Faux

Exercice 261

Soient $u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $u_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $v = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$. Soit $W = \text{Vect}\{u_1, u_2\}$. Calculer la décomposition $v = z + p_W(v)$, où $z \in W^\perp$.

Exercice 271

Soient $v = \begin{pmatrix} 0 \\ 9 \\ 0 \\ -18 \end{pmatrix}$ et $W = \text{Vect} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ -4 \\ 6 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$.

Alors, le projeté orthogonal (par rapport au produit scalaire usuel) de v sur W est

A. $\begin{pmatrix} -3 \\ 3 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix} -12 \\ 12 \\ -6 \\ -6 \end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} 8 \\ 1 \\ 0 \\ -14 \end{pmatrix}$

D. $\begin{pmatrix} -8 \\ 8 \\ 0 \\ -4 \end{pmatrix}$

Exercice 281

Soient $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 5 \\ 5 & 4 \end{pmatrix}$ et $b = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}$. Alors la solution au sens des moindres carrés $\hat{x} = \begin{pmatrix} \hat{x}_1 \\ \hat{x}_2 \end{pmatrix}$ de l'équation $Ax = b$ satisfait

A. $\hat{x}_2 = 1/6$

B. $\hat{x}_2 = -35/6$

C. $\hat{x}_2 = 41/6$

D. $\hat{x}_2 = -5/6$

Exercice 291

Quelle affirmation est vraie pour toute matrice A de taille $n \times n$ et tout vecteur $b \in \mathbb{R}^n$?

A. L'équation $Ax = b$ a au plus une solution

B. L'équation $Ax = b$ a au plus une solution au sens des moindres carrées

C. L'équation $Ax = b$ a au moins une solution.

D. L'équation $Ax = b$ a au moins une solution au sens des moindres carrées.

Exercice 301

Soit u_1, \dots, u_p une base orthonormée d'un sous-espace $W \subset \mathbb{R}^n$ et $y \in \mathbb{R}^n$ et soit U la matrice $n \times p$ dont les colonnes sont les vecteurs u_1, \dots, u_p . Montrer que $p_W(y) = UU^T y$.

Copyright 2012 © Prof. Assyr Abdulle, Prof. Simone Deparis, Dr. Christian Urech.
Informations générales, séries et corrigés : cf.

<http://moodle.epfl.ch/course/view.php?id=15414>

Les exercices de type vrai ou faux proviennent du livre : D.C. Lay. *Algèbre linéaire : théorie, exercices et applications*. De Boeck, Bruxelles, 2005.