

# Introduction à l'Astrophysique

## Série 2: Enoncé

Laboratoire d'Astrophysique <http://lastro.epfl.ch>  
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne  
Semestre de printemps 2025

### Rappel théorique : problème à deux corps

Le *problème à deux corps* concerne l'étude du mouvement de deux points matériels de masse  $m_1$  et  $m_2$  en interaction gravitationnelle. Il possède une solution analytique. En effet, les équations du mouvement des deux masses :

$$\vec{F}_{12} = m_1 \ddot{\vec{x}}_1 \quad \text{et} \quad \vec{F}_{21} = m_2 \ddot{\vec{x}}_2 \quad (1)$$

peuvent se réécrire comme l'équation du mouvement du centre de masse et une équation décrivant le mouvement relatif entre les deux corps, de la façon :

$$(m_1 + m_2) \ddot{\vec{x}}_{CM} = 0 \quad \text{et} \quad \vec{F}(r) = \mu \ddot{\vec{r}} \quad (2)$$

avec  $\mu = (m_1 m_2) / (m_1 + m_2)$  et  $\vec{r} = \vec{x}_1 - \vec{x}_2$ . Cette dernière équation a donc la forme de l'équation du mouvement d'une masse  $\mu$  dans un potentiel gravitationnel stationnaire.

A partir des solutions de ces équations, on peut reconstuire les trajectoires individuelles de  $m_1$  et  $m_2$ .

### Exercice 1 : Ellipse et lois de Kepler

- a) On peut définir une ellipse comme le lieu des points dont la somme des distances à deux points fixes est constante (voir figure 1) :

$$r + r' = 2a, \quad (3)$$

où  $a$  est le demi-grand axe et  $r$  et  $r'$  les distances de l'ellipse aux deux points focaux. Posons la distance des points focaux au centre de l'ellipse est

$$OF = OF' = ea, \quad (4)$$

où  $e$  est appelé l'excentricité de l'ellipse ( $0 \leq e < 1$ ). Retrouvez la formule

$$r = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e \cos \theta}. \quad (5)$$

Indication : exprimez  $r'$  par le théorème de Pythagore.




FIGURE 1 – Définitions dans l'ellipse

- b)** Soit une masse  $m_1$  se déplaçant sur une orbite elliptique autour d'une masse  $m_2$ . Calculez l'expression générale de la vitesse radiale  $v_r$  et transverse  $v_\theta$  en fonction de la période  $P$ , de l'excentricité  $e$ , du demi grand axe  $a$  et de l'angle  $\theta$ .

Conseil :  $\vec{v} = \dot{r}\hat{r} + r\dot{\theta}\hat{\theta}$  ... Commencez par calculer la vitesse transverse, au moyen de la deuxième loi de Kepler :

$$\frac{dA}{dt} = \left\| \frac{1}{2} \left( \vec{r} \times \frac{d\vec{r}}{dt} \right) \right\| = \frac{\|\vec{L}\|}{2\mu} = \text{cste}, \quad (6)$$

dans laquelle l'élément d'aire balayée  $dA$  peut donc être exprimé en utilisant cette vitesse. Notez aussi que l'équation (6) peut être intégrée sur une période pour déterminer  $L$ , que  $r$  est connu par la relation (5), que l'aire d'une ellipse vaut  $A = \pi ab$ , et qu'on peut facilement montrer (n'est-ce pas ?), par le théorème de Pythagore, que  $e^2 = 1 - b^2/a^2$ .

- c)** Reprenant les expressions pour  $v_r$  et  $v_\theta$ , vérifiez l'équation

$$v^2 = G(m_1 + m_2) \left( \frac{2}{r} - \frac{1}{a} \right) \quad (7)$$

### Exercice 2 : Orbite de la comète de Halley

---

Les orbites des comètes ont une très grande excentricité qui peut dans certains cas être proche de l'unité. La comète de Halley a une période orbitale de 76 ans et une excentricité  $e = 0.9673$ .

- a)** Exprimez la troisième loi de Kepler

$$P^2 = \frac{4\pi^2 a^3}{G(m_1 + m_2)} \quad (8)$$

en unités astronomiques, masse solaire et année.

- b)** Calculez le demi-grand axe de l'orbite de la comète de Halley.  
**c)** Calculez la masse du Soleil à partir des caractéristiques orbitales de la comète.  
**d)** Quelle est la distance entre la comète de Halley et le Soleil au périhélie et à l'aphélie ?  
**e)** Quel est le rapport des énergies cinétiques de la comète au périhélie et à l'aphélie ?

Indication : utilisez les équations de l'exercice précédent sur les ellipses et lois de Kepler :

$$r = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e \cos \theta} \quad (9)$$

$$v^2 = G(m_1 + m_2) \left( \frac{2}{r} - \frac{1}{a} \right) \quad (10)$$