

Série 19

Exercice 1. Soit \mathcal{C} une conique dépendante d'un paramètre réel m .

$$\mathcal{C} : \frac{(x-1)^2}{m-1} + \frac{(y-m)^2}{(m-1)(m-2)} - 1 = 0.$$

- a. Déterminer m pour que la conique \mathcal{C} vérifie les deux conditions suivantes :
 - \mathcal{C} est une hyperbole d'axe réel vertical,
 - une des asymptotes de \mathcal{C} passe par l'origine O .
- b. On fixe $m = -1$. Déterminer l'équation cartésienne de l'ellipse \mathcal{E} vérifiant les deux conditions suivantes :
 - les axes de symétrie de \mathcal{E} et \mathcal{C} coïncident,
 - \mathcal{E} et \mathcal{C} se coupent orthogonalement en $M(0; 2)$.

Exercice 2. Dans le plan muni d'un repère orthonormé, on considère l'hyperbole \mathcal{H} d'équation $x^2 - y^2 - 9 = 0$.

Soient A et A' les deux sommets de \mathcal{H} , (A d'abscisse positive) et M un point courant de cette hyperbole.

On considère la tangente t à \mathcal{H} en M , la perpendiculaire n à t passant par A et la droite d passant par A' et M .

Soit P le point d'intersection des droites n et d .

Déterminer l'équation cartésienne du lieu de P lorsque le point M décrit l'hyperbole \mathcal{H} . Caractériser avec précision la nature géométrique de ce lieu.

Exercice 3. Dans le plan, on considère une droite d et un point A , $A \notin d$.

Un point D parcourt la droite d .

Soit M un point de la perpendiculaire à d passant par D tel que la distance de M à d soit égale à la distance de A à D .

- a. Choisir un repère orthonormé adapté au problème.
- b. Déterminer l'équation cartésienne, dans le repère choisi, du lieu de M lorsque D parcourt la droite d .
- c. Représenter sur un dessin soigné le lieu de M .

Exercice 4. Un segment AB de longueur constante $2d$ se déplace sur l'axe Ox . Des points A et B , on mène les tangentes au cercle γ d'équation : $x^2 + y^2 - 2Ry = 0$.

On considère le point M intersection des tangentes distinctes de l'axe Ox .

- a. Déterminer l'équation cartésienne du lieu des points M .
- b. Etudier la nature de ce lieu en fonction de d .

Indications :

- Choix des paramètres : a abscisse du point A et b abscisse du point B , liés par l'équation $|a-b| = 2d$.
- Elimination des paramètres : exprimer $a+b$ et ab en fonction de x et y , puis utiliser l'équation de liaison sous la forme $4d^2 = (a-b)^2 = (a+b)^2 - 4ab$.

Exercice 5. On donne un point du plan par ses coordonnées cartésiennes. Déterminer ses coordonnées homogènes.

$$A(3; 2), \quad B(-3; \frac{1}{2}), \quad C(0; 1), \quad D(\frac{2}{3}; -\frac{5}{4}).$$

Exercice 6. On donne un point à l'infini du plan par les composantes d'un de ses vecteurs directeurs ou par sa pente. Déterminer ses coordonnées homogènes.

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{c} = \begin{pmatrix} 4 \\ 8 \end{pmatrix},$$

$$m_D = 2, \quad m_E = -\frac{7}{3}, \quad m_F = 0.$$

Exercice 7. On donne des points du plan par leurs coordonnées homogènes. Déterminer les coordonnées cartésiennes de chaque point ou un vecteur directeur si le point est à l'infini.

$$A(-2; 1; -3) \quad B(2; 0; 0) \quad C(4; -2; 6) \quad D(6; 4; 0)$$

$$E(1; 0; 0) \quad F(2; -1; 3) \quad G(3; 2; 0) \quad H(-\frac{1}{3}; \frac{1}{6}; -\frac{1}{2})$$

Indiquer les points qui sont confondus.

Éléments de réponse :

Ex. 1 : a. $m = -2$, b. \mathcal{E} : $\frac{(x-1)^2}{4} + \frac{(y+1)^2}{12} - 1 = 0$.

Ex. 2 : Équation cartésienne du lieu des points P : $\frac{(x+1)^2}{4} + \frac{y^2}{12} - 1 = 0$.

Ex. 3 : a. L'origine O est confondue avec le point A et l'axe Ox est perpendiculaire à la droite d , b. Lieu de M : $\frac{(x-a)^2}{a^2} - \frac{y^2}{a^2} - 1 = 0$.

Ex. 4 : a. Équation cartésienne du lieu des points M :

$$R^2 x^2 + (R^2 - d^2) y^2 + 2R(2d^2 - R^2) y - 4R^2 d^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow R^2 x^2 + (R^2 - d^2) \left[y + \frac{R(2d^2 - R^2)}{R^2 - d^2} \right]^2 - \frac{R^6}{R^2 - d^2} = 0, \quad (R \neq d),$$

b.

- Si $d < R$, le lieu de M est une ellipse.
- Si $d = R$, le lieu de M est une parabole.
- Si $d > R$, le lieu de M est une hyperbole.

Ex. 5 : $A(3; 2; 1)$, $B(-6; 1; 2)$, $C(0; 1; 1)$, $D(8; -15; 12)$.

Ex. 6 : $A(1; 3; 0)$, $B(0; 1; 0)$, $C(1; 2; 0)$, $D(1; 2; 0)$, $E(3; -7; 0)$, $F(1; 0; 0)$.

Ex. 7 : $A \equiv C \equiv F \equiv H(\frac{2}{3}; -\frac{1}{3})$

$B \equiv E$: point à l'infini de vecteur directeur $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

$D \equiv G$: point à l'infini de vecteur directeur $\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$